

Repas qui s'éternise ou refus de manger

Le repas dure très longtemps ou la personne refuse de s'alimenter.

Comprendre

- Rechercher une douleur bucco-dentaire, une difficulté de déglutition ou une prothèse mal ajustée.
- Vérifier si un médicament ou une constipation peut couper l'appétit.
- Observer si le refus porte sur un aliment précis ou sur le repas en général.

Adapter l'environnement

- Réduire le bruit et les distractions pendant le repas.
- Proposer un repas fractionné en plusieurs petites prises si la durée pose problème.
- Adapter la texture et la présentation selon les capacités.

Accompagner

- Laisser le temps nécessaire sans presser verbalement.
- Manger à proximité pour donner un repère social et rassurant.
- Proposer les couverts adaptés et respecter l'autonomie restante.

Transmettre

- Signaler toute perte d'appétit ou de poids inhabituelle au professionnel compétent.

À NE JAMAIS FAIRE

- ✗ Forcer ou presser verbalement la personne à manger.
- ✗ Faire des remarques sur la lenteur ou le refus.
- ✗ Ignorer une perte de poids ou d'appétit qui persiste.

Apézeo — quelques pistes à adapter selon la personne, pas une marche à suivre. Consultez l'application pour le déroulement détaillé de chaque piste.

