

Refus de prendre ses médicaments

La personne refuse la prise d'un traitement.



Accès direct
depuis l'app

Comprendre

- Observer les circonstances précises du refus avant de recommencer une tentative.
- Rechercher une difficulté physique ou sensorielle (goût, déglutition, douleur).

Adapter le moment et l'approche

- Choisir un moment où la personne est disponible et calme.
- Réduire les stimulations environnementales avant de proposer la prise.
- Utiliser une communication simple et prévisible.

Redonner du contrôle

- Proposer un choix limité et réel dans la manière de procéder.
- Utiliser une personne-relais si la relation est tendue à ce moment précis.

Vigilance stricte

- Ne jamais modifier la forme du médicament (écraser, ouvrir, dissoudre) sans validation du prescripteur ou du pharmacien.
- Transmettre tout refus persistant ou toute difficulté de déglutition suspectée.

À NE JAMAIS FAIRE

- ✗ Modifier la forme d'un médicament de sa propre initiative.
- ✗ Insister jusqu'à obtenir la prise par lassitude de la personne.
- ✗ Ne pas transmettre un refus répété ou inhabituel.

Apézeo — quelques pistes à adapter selon la personne, pas une marche à suivre. Consultez l'application pour le déroulement détaillé de chaque piste.