

Anxiété marquée, inquiétude envahissante

La personne exprime une inquiétude importante ou diffuse.

Comprendre

- Rechercher ce qui précède l'inquiétude et ce que la personne semble redouter.
- Distinguer inquiétude ponctuelle et anxiété installée dans la durée.

Écouter et valider

- Laisser la personne exprimer son inquiétude sans la minimiser.
- Reconnaître l'émotion sans nécessairement confirmer une croyance erronée.

Apaiser concrètement

- Réduire les stimulations de l'environnement pendant le pic d'anxiété.
- Utiliser une communication courte, lente et prévisible.
- Proposer un repère concret et immédiat plutôt qu'une explication sur l'avenir.

Techniques complémentaires

- Musique familière, contact sensoriel ou activité physique douce selon ce qui est accessible à la personne.
- Respiration guidée très simple si la personne peut la suivre volontairement.

Vigilance

- Une anxiété nouvelle, intense ou persistante doit être transmise pour évaluation.
- Vérifier l'absence de douleur ou de cause physique sous-jacente.

À NE JAMAIS FAIRE

- ✗ Répondre uniquement « ne vous inquiétez pas ».
- ✗ Multiplier les réassurances verbales sans jamais varier l'approche.
- ✗ Ignorer une anxiété en aggravation constante.

Apézeo — quelques pistes à adapter selon la personne, pas une marche à suivre. Consultez l'application pour le déroulement détaillé de chaque piste.