

ACETATO CIS 3 HEXENILA

Molécula Isolada (Éster)

Nome Científico: *cis-3-Hexenyl acetate* (Verde de Folha / Acetato de Folha)

1. Identificação Geral



Tipo de Matéria-Prima: Sintética ou Natural (Éster Alifático linear amplamente utilizado como aromaquímico isolado).

Família Olfativa Principal: Verde / Frutada.

Aparência Visual: Líquido fluido, totalmente límpido e incolor.

2. Comportamento Físico na Fórmula



Volatilidade / Posição na Pirâmide: Topo (Nota de Saída / Cabeça de altíssima volatilidade).

Tenacidade na Fita Olfativa: Muito Baixa. Permanece na fita olfativa por apenas 1 a 2 horas (Dados TGSC). Evapora com extrema rapidez, gerando o 'sopro' inicial.

Poder de Impacto / Intensidade: Extremo (Escala: 9/10). Possui um poder de impacto inicial avassalador que corta e eleva toda a saída da fórmula.

Diluição de Trabalho Recomendada: Altamente recomendado trabalhar a 10% ou 1% em DPG para evitar que ele cegue o olfato ou domine totalmente os ensaios de bancada.

3. Perfil Olfativo Sensorial



Descritores Principais: Verde grama cortada, Frutado maçã verde, Penetrante, Agudo, Fresco aquoso.

Facetas Secundárias / Nuances: Diferente do Álcool Cis-3-Hexenílico (que é mais cru e amargo), o Acetato traz o aroma realista e crocante de grama recém-aparada e folhas verdes esmagadas, mas envelopado por uma deliciosa faceta frutada doce e succulenta que remete à casca de maçã verde, pera madura e banana verde.

Evolução no Tempo

0 min Impacto verde agudo, elétrico e intensamente fresco, evocando instantaneamente grama cortada sob o orvalho com toques de frutas ácidas.

15 min A pungência ríspida diminui, revelando um aspecto frutado aquoso muito limpo, natural, texturizado e succulento.

1 hora Esvaece quase por completo da fita olfativa, deixando apenas um vestígio vegetal limpo e transparente antes de sumir.

4. Aplicação Prática e Comportamento de Bancada



Função Principal: Doador de impacto, frescor natural e efeito 'orvalho'. É o aromaquímico definitivo para introduzir naturalidade botânica a florais modernos, conferir efervescência a saídas cítricas e criar o acorde crocante de frutas verdes e frescas.

Sinergias Clássicas: Funciona em perfeita simbiose com o Salicilato de Amila, Triplal, Linalol, e notas florais transparentes como o Hedione e o Álcool Feniletílico.

Riscos de Formulação: O uso excessivo ou sem diluição adequada destrói a elegância da fragrância, deixando-a ríspida, estridente, puramente química ou com cheiro linear de solvente de tinta e cosméticos industriais baratos.

5. Dados de Segurança e Regulamentação



ATENÇÃO CRÍTICA DE BANCADA

Molécula muito estável na maioria dos meios, mas que pode sofrer hidrólise parcial em pHs extremos, liberando o álcool correspondente.

Restrição IFRA (Categoria 4 - Perfumaria Fina): Não possui restrições quantitativas severas ou limites proibitivos diretos estabelecidos pela IFRA para a Categoria 4 (Perfumaria Fina). Opera livremente sob as Boas Práticas de Fabricação.

Solução de Bancada: Dosar em frações milimétricas (geralmente entre 0.1% a 1.5% do concentrado puro) para atuar puramente como um modificador de topo que ilumina e abre as notas florais e cítricas.

Anotações:
