

# ALDEÍDO C16

## Molécula Isolada (Glicidato / Éster Epóxi)

Nome Científico: *Ethyl methylphenylglycidate* (Nome comercial histórico: *Aldehyde C-16 Strawberry*)

### 1. Identificação Geral



**Tipo de Matéria-Prima:** Sintética (Historicamente classificado como aldeído, quimicamente trata-se de um éster epóxi aromático).

**Família Olfativa Principal:** Frutada / Gourmand.

**Aparência Visual:** Líquido viscoso, límpido e incolor a levemente amarelado pálido.

### 2. Comportamento Físico na Fórmula



**Volatilidade / Posição na Pirâmide:** Meio / Fundo (Nota de Corpo Frutada de excelente substantividade de cauda).

**Tenacidade na Fita Olfativa:** Alta. Permanece perceptível na fita olfativa por mais de 200 horas (cerca de 8 dias, dados TGSC). Agente fixador frutado muito estável.

**Poder de Impacto / Intensidade:** Alto (Escala: 7/10). Possui perfil muito adocicado, penetrante e de preenchimento encorpado.

**Diluição de Trabalho Recomendada:** Pura (100%) para estruturação de blocos gourmands pesados ou a 10% para calibração fina de florais doces.

### 3. Perfil Olfativo Sensorial



**Descritores Principais:** Morango doce, Geleia de frutas vermelhas, Caramelo/Gourmand, Ceroso denso, Licoroso.

**Facetas Secundárias / Nuances:** Representa o aroma clássico, doce e fantasioso de morangos em calda. Exibe uma doçura frutada densa e penetrante que remete a chicletes de frutas vermelhas e geleias caseiras quentes, acompanhada por nuances ligeiramente cerosas, melosas e com uma sutil faceta licorosa de maçã cozida.

#### Evolução no Tempo

**0 min** Impacto intensamente doce, xaroposo e frutado de morango artificial, com uma textura densa de calda.

**2 horas** O dulçor inicial assenta, mesclando-se de forma atraente em um coração frutado de frutas vermelhas aveludadas e caramelizadas.

**24 horas+** Fundo de fixação marcante, deixando um rastro gourmand doce, macio, abaunilhado e muito convidativo.

## 4. Aplicação Prática e Comportamento de Bancada



**Função Principal:** Doador de dulçor frutado, efeito morango e modificador gourmand. É a molécula mestre para estruturar acordes de frutas vermelhas (morango, framboesa, amora), sendo essencial para inflar e adocicar fragrâncias femininas adolescentes, criações gourmands modernas e xampus de apelo comercial marcante.

**Sinergias Clássicas:** Excelente sinergia com a Vanilina, Etil Vanilina, Maltol, Maltol de Etila, Iononas e notas florais como o Jasmim e a Rosa.

**Riscos de Formulação:** O uso excessivo ou sem o devido contrapeso de notas amadeiradas ou cítricas ríspidas satura a fórmula rapidamente, deixando o perfume extremamente enjoativo, infantilizado, ou com cheiro linear de bala mastigável barata.

## 5. Dados de Segurança e Regulamentação



### ATENÇÃO CRÍTICA DE BANCADA

Molécula quimicamente muito estável, resistente à descoloração em bases cosméticas alcoólicas comuns.

**Restrição IFRA (Categoria 4 - Perfumaria Fina):** Regulado e monitorado pelas diretrizes da IFRA (Categoria 4 - Perfumaria Fina), que estabelece limites máximos de uso seguros no produto final aplicado na pele para evitar sensibilização.

**Solução de Bancada:** Calcular rigorosamente a dosagem na essência (geralmente empregado entre 0.2% a 3% do concentrado) para manter a conformidade regulatória e garantir o refinamento estético.

Anotações:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---