Clase práctica 19 de abril

- 1. Sea Z una variable aleatoria con distribución normal estándar. Hallar una función h, tal que la variable aleatoria h(Z) tenga distribución Binomial de parámetros n=2 y p=1/2. Luego, usando R, a partir de Nrep=1000 observaciones de una variable con distribución normal estandar, simular 1000 valores de una variable con distribución binomial de parámetros n=2 y p=1/2. Realizar un gráfico de barras, observar e interpretar los resultados.
- 2. El tiempo en años hasta que ocurre la primera falla es una heladera es una variable aleatoria con función de intensidad de fallas

$$\lambda(t) = \begin{cases} \frac{1}{18}\sqrt{t} & \text{si } t > 0, \\ 0 & \text{si } t \le 0. \end{cases}$$

Usando los números aleatorios 0.54, 0.94, 0.11 simular tres valores del tiempo de funcionamiento de una heladera hasta que ocurre la primera falla. Luego, usando R, a partir de Nrep=1000 observaciones de una variable con distribución uniforme, simular 1000 valores del tiempo de funcionamiento de una heladera hasta que ocurre la primera falla, graficar la función empírica y la función histograma. ¿Que observa?

- 3. Una catacumba se mantiene iluminada por una antorcha cuya duración (en horas) es una variable aleatoria con función de densidad $f(t) = \frac{2}{t^2} \mathbf{1}\{t > 2\}$. La antorcha se enciende a las 0:00 del 1 de enero. A partir del número aleatorio 0.118 simular el tiempo durante el cual la catacumba se mantendrá iluminada. Luego, usando R, a partir de Nrep=1000 observaciones de una variable con distribución uniforme, simular 1000 valores del tiempo durante el cual la catacumba se mantendrá iluminada. A partir de esas simulaciones graficar la función histograma y superponer la verdadera función de densidad de T.
- 4. El tiempo (en años) de funcionamiento sin fallas de una pieza mecánica es una variable aleatoria T con función de intensidad de fallas $\lambda(t) = t^{-1/2} \mathbf{1}\{t > 0\}$. Hallar la función de densidad del tiempo de funcionamiento sin fallas de una pieza, sabiendo que funcionó por más de dos años.
- 5. Sea X una variable aleatoria con función de distribución

$$F_X(x) = \frac{x}{5} \mathbf{1} \{ 1 \le x < 2 \} + \frac{3}{5} \mathbf{1} \{ 2 \le x < 3 \} + \frac{x+1}{5} \mathbf{1} \{ 3 \le x < 4 \} + \mathbf{1} \{ 4 \le x \}.$$

Hallar $F_{X|X>2}(x)$.