

**TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO. PARA COLOCAÇÃO DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL**

Eu declaro que o/a Dr(a) \_\_\_\_\_ CRM/SP nº \_\_\_\_\_ me informou que tendo em vista o DESEJO DE CONTRACEPÇÃO COM MÉTODO DE LONGA DURAÇÃO, ser indicado o uso de implante contraceptivo subdérmico de etonogestrel.

Esclareceu-me que:

1. O Implante subdérmico(SD) de etonogestrel é um método contraceptivo de longa duração e reversível.
2. O implante SD de etonogestrel deve ser inserido sob a pele na face medial do braço não dominante (que você não escreve), sob anestesia local.
3. O índice de falha é de 0.05% ao ano (5 gravidezes em 10.000 mulheres que usem o implante).
4. Uma pequena quantidade de progestagênio etonogestrel (um tipo de hormônio feminino) é liberada continuamente, passando do implante para o corpo, resultando em um efeito anticoncepcional por um período de 03 anos.
5. Em alguns casos o procedimento de inserção e/ou retirada pode haver formação de cicatriz no local do implante.
6. A inserção ou remoção do implante pode causar irritação leve, dor e coceira no local. Pode ocorrer também hematoma no local da inserção.
7. O contraceptivo pode ser removido a qualquer momento, mas deve ser removido após o período de 03 anos de uso. Esse procedimento necessita uso de anestesia local.
8. Como em todos os contraceptivos apenas com progesterona, o implante SD de etonogestrel pode mudar o padrão do sangramento vaginal. O padrão menstrual que poderá ocorrer com o uso do implante varia de mulher para mulher sendo de difícil previsão, mas em média, em 52% dos casos ocorrem amenorreia (ausência de sangramento) ou sangramento infrequente, em 20% dos casos não ocorre alteração do fluxo menstrual (sangramento normal), em 17,7% ocorre um aumento no menstrual (sangramentos prolongados) e em 6,7% sangramentos frequentes.
9. Segundo os dados dos estudos realizados com o implante SD de etonogestrel, das mulheres que apresentavam acne, no momento da inserção, a maioria delas (cerca de 59%), teve melhora no quadro. Em cerca de 14% a acne ocorreu sem história prévia e 10% pioraram a condição anterior.
10. Em raros casos podem ocorrer alguns efeitos adversos tais como aumento de peso, cefaleia, dor nas mamas.
11. Algumas medicações podem interferir no perfeito funcionamento do implante como antiepiléticos e remédios para tratamento da tuberculose.
12. O Implante SD de etonogestrel não previne contra infecção por HIV ou qualquer outra doença sexualmente transmissível.
13. Em caso de dor fui orientada a fazer uso de medicação analgésica.
14. Fui orientada a retornar à consulta de forma breve em caso de dor local intensa, hematoma extenso, febre, saída de secreção purulenta local ou quaisquer outras intercorrências.
15. Declaro ter recebido comprovante contendo data de inserção, data máxima de retirada e número do lote do produto.

Entendi as explicações que foram prestadas em linguagem clara e simples, esclarecendo-me todas as dúvidas que me ocorreram. Também entendi que a qualquer momento prévio a inserção e sem necessidade de dar nenhuma explicação poderei revogar o consentimento que agora presto.

Assim, declaro agora que estou satisfeita com a informação recebida e que compreendo o alcance e riscos do tratamento. Por esta razão e nestas condições, consinto que realize a inserção do implante contraceptivo proposto.

Campinas, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Nome: \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Em caso de incapacidade, assina este documento, o representante legal da paciente.

Nome: \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_