

Orientações Pós - Cirúrgica

- Morder Gaze sem mastigá-la por 20 minutos
- Lavar as mãos e retirá-la.
- Se continuar sangrando, morder outra por mais 20 minutos até parar.
- Se o sangramento persistir ou tiver dor no dia seguinte, procurar atendimento.
- NÃO FAZER BOCHECHO NEM CUSPIR, (engolir a Saliva) por 24 horas.
- Não conversar muito por 24 horas.
- NÃO Fumar por 24 horas.
- Não sugar Canudo por 24 horas.
- Não realizar exercício físico, NEM LAVAR ROUPA – 24 horas
- Dormir com a cabeça mais alta (travesseiro alto) e do lado contrário da extração.
- Dieta: Alimento FRIO, pastoso ou líquido por 24 horas (ex: sorvete, gelatina, leite, se tomar sopa deve estar em temperatura ambiente, passada no liquidificador).
- Higiene oral: realizar limpeza dos dentes tomando o cuidado de não ferir o local: Nos dentes próximos da extração somente remover resíduos de alimento com um cotonete.

Após 24 hs da cirurgia fazer bochecho com clorexidina (Periogard sem álcool ou Noplak Max) - 2 vezes por dia (manhã e noite) por 7 dias.

- Bolsa de gelo em intervalos de 15 em 15 minutos.
- Analgésico, se dor.
- Retirar ponto em :

Campinas, de de 20 .