


ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS

INTRODUÇÃO ALIMENTAR

CRIANÇAS QUE NÃO ESTÃO SENDO AMAMENTADAS EXCLUSIVAMENTE NO PEITO



Há diversas situações, condições e escolhas que ocorrem no período da amamentação e podem fazer com que a criança menor de 6 meses não receba somente leite de peito. Nesse caso, há necessidade de cuidados adicionais no acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento.

Quando a criança não estiver em amamentação exclusiva no peito, as recomendações sobre a alimentação dependem da idade da criança, bem como dos alimentos que estão sendo ofertados (outros leites/ fórmula infantil). A seguir estão orientações para as dúvidas mais frequentes, mas é importante seguir recomendações individualizadas de um profissional de saúde.

Antes de iniciar as recomendações, vale lembrar que o serviço de saúde pode apoiar você a continuar a amamentar e até mesmo retomar a amamentação exclusiva no peito até a criança completar 6 meses de idade. O aleitamento materno exclusivo protege os bebês contra doenças infecciosas (diarreia, pneumonia e otite), alergias, obesidade, alguns tipos de câncer infantil e, ainda, diabetes tipo 2 na vida adulta.

PARA CRIANÇAS MENORES DE 4 MESES

Leite materno
+
Fórmula infantil
(se possível)
OU
Leite de vaca diluído
(em último caso)

PARA CRIANÇAS DE 4 A 6 MESES

Leite materno
+
Fórmula infantil (se possível)
OU
Leite de vaca diluído (em último caso)
E/OU
Frutas, Almoço ou Jantar (depende da
avaliação do profissional)


Em alguns casos, de acordo com a avaliação do profissional de saúde, a introdução de alimentos pode ser iniciada antes dos 6 meses de idade, desde que a criança apresente os sinais de prontidão (ser capaz de assumir posição sentada e cabeça firme, mostrar coordenação entre os olhos, as mãos e a boca, mastigar e engolir sem engasgar).

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES!

- ✓ Se a mãe precisar ficar longe da criança, recomenda-se retirar o leite do peito e guardá-lo na geladeira, freezer ou congelador. Oferecer o leite em copo, xícara ou colher. Não é aconselhável usar mamadeira ou chuquinha, para que a criança não tenha dificuldade em pegar o peito depois.
- ✓ Não deve ser ofertada água para o bebê que mama no peito e consome apenas fórmula infantil antes dos 6 meses de idade, desde que esta seja preparada conforme recomendação do fabricante.
- ✓ A água somente é oferecida, antes dos 6 meses de idade, para bebês que consomem leite de vaca e/ou alimentos. Assim como o leite, ofereça água sempre em copo, xícara ou colher. Quando oferecer água, a criança deve estar sentada, com a cabeça e pescoço firmes e alinhados. Se a criança recusar a água, ofereça-a em outros momentos até ela se acostumar. A água deve ser filtrada ou fervida. Água de coco, chá e outras bebidas não substituem a água.
- ✓ A consistência da alimentação deve evoluir aos poucos, conforme o desenvolvimento da criança. Iniciar com comida amassada com garfo (não liquidifique ou triture os alimentos no mixer), evolua para os alimentos picados em pedaços pequenos, raspados ou desfiados ou ainda alimentos macios em pedaços grandes (para que a criança pegue com a mão e leve à boca). Evolua até chegar à consistência da comida da família.

- ✓ Prefira sempre oferecer a fruta in natura ao invés do suco.
- ✓ Açúcares não devem ser ofertados para crianças menores de 2 anos.
- ✓ Monte um prato colorido, separando os alimentos no prato para que a criança conheça o sabor de cada um deles.
- ✓ Para cozinhar, utilize óleo vegetal ou azeite em pouca quantidade.
- ✓ Use sal em pequena quantidade. Utilize somente temperos naturais para dar sabor aos alimentos (cebola, alho, salsa, coentro, tomilho).
- ✓ Se a refeição estiver bem seca, adicione um pouco do caldo do cozimento dos legumes, feijão ou carne.
- ✓ Coloque a criança para comer junto com a família (sentada, em um ambiente tranquilo), com um prato só dela. Interaja com a criança sempre dizendo o nome do alimento que ela está comendo. Deixe TV, tablet ou celular desligados.
- ✓ Frutas, verduras e legumes da época são sempre ótimas opções.

EXEMPLO - ALMOÇO OU JANTAR



Para mais informações, consulte o **Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos** (Ministério da Saúde, 2019).



O leite materno pode ser oferecido sempre que a criança quiser	AOS 06 MESES DE IDADE
	Café da manhã — leite materno preferencialmente
	Lanche da manhã — fruta e leite materno preferencialmente
	Almoço (conforme figura ao lado). Junto à refeição, pode ser dado um pedaço pequeno de fruta. Quantidade aproximada* — 2 a 3 colheres de sopa no total
	Lanche da tarde — fruta e leite materno preferencialmente
	Jantar — leite materno
	Antes de dormir — leite materno preferencialmente
	ENTRE 07 E 11 MESES DE IDADE
	Café da manhã — leite materno preferencialmente
	Lanche da manhã — fruta e leite materno preferencialmente
	Almoço (conforme figura ao lado). Junto à refeição, pode ser dado um pedaço pequeno de fruta. Quantidade aproximada*: Entre 07 e 08 meses — 3 a 4 colheres de sopa no total Entre 09 e 11 meses — 4 a 5 colheres de sopa no total
	Lanche da tarde — fruta e leite materno preferencialmente
	Jantar — semelhante ao almoço
	Antes de dormir — leite materno preferencialmente
	ENTRE 1 E 2 ANOS DE IDADE
	Café da manhã — leite materno preferencialmente e fruta ou cereal (pães caseiros, aveia, cuscuz de milho) ou raízes e tubérculos (mandioca, batata-doce, inhame)
	Lanche da manhã — fruta e leite materno preferencialmente
	Almoço (conforme figura ao lado). Junto à refeição, pode ser dado um pedaço pequeno de fruta. Quantidade aproximada* — 5 a 6 colheres de sopa no total.
	Lanche da tarde — semelhante ao café da manhã
	Jantar — semelhante ao almoço
	Antes de dormir — leite materno preferencialmente

*Essa quantidade serve apenas para a família ter alguma referência e não deve ser seguida de forma rígida. Algumas crianças vão aceitar mais, outras vão aceitar menos.

Elaboração: Nutricionistas do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Primária à Saúde / Saúde da Família – 2020.

Organização e Revisão: Maria Alice Franzini Codarin e Maria Camila Abramides Prada.