



# Лекция 4

## Поле комплексных чисел

### Содержание лекции:

В данной лекции мы коротко рассмотрим поле комплексных чисел, которое возникает как алгебраическое замыкание поля  $\mathbb{R}$ . Обсуждая алгебраические операции с комплексными числами мы заложим основы для использования этих чисел в различных областях математики и ее приложений.

### Ключевые слова:

Комплексное число, поле комплексных чисел, алгебраическая форма КЧ, комплексно сопряженное число, тригонометрическая форма КЧ, формула Муавра, показательная форма КЧ.

### Авторы курса:

Трифанов А.И.

Москаленко М.А.

### Ссылка на ресурсы:

[mathdep.ifmo.ru/geolin](http://mathdep.ifmo.ru/geolin)

## 4.1 Алгебраическая форма комплексного числа

**Комплексным числом** называется элемент  $z$  декартова произведения  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ :

$$z = (a, b), \quad a, b \in \mathbb{R},$$

снабженного двумя бинарными операциями, *индуцированными* из  $\mathbb{R}$ :

- $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$ ;
- $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 a_2 - b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1)$ ;

**Nota bene** Для множества комплексных чисел имеется специальное обозначение:

$$\mathbb{R} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

**Nota bene** Имеет место свойство

$$z_1 = z_2 \Leftrightarrow a_1 = a_2, \quad b_1 = b_2.$$

**Теорема 4.1.** Множество  $\mathbb{C}$  имеет алгебраическую структуру поля.



Сначала проверим свойства операции  $+$ :

1. ассоциативность очевидна в силу ассоциативности  $+$  на множестве  $\mathbb{R}$ ;
2. нейтральный элемент  $0_{\mathbb{C}} = (0, 0)$ , действительно:

$$\forall z \in \mathbb{C} \quad z + 0_{\mathbb{C}} = z = 0_{\mathbb{C}} + z;$$

3. обратным элементом для  $z = (a, b)$  является  $(-z) = (-a, -b)$ ;

Далее, проверим свойства операции  $\cdot$ :

1. ассоциативность проверяется непосредственно:

$$((a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2)) \cdot (a_3, c_3) = (a_1, b_1) \cdot ((a_2, b_2) \cdot (a_3, c_3)).$$

2. нейтральный элемент  $1_{\mathbb{C}} = (1, 0)$ :

$$1_{\mathbb{C}} \cdot z = (1, 0) \cdot (a, b) = (a, b).$$

3. обратным элементом для  $z = (a, b) \neq (0, 0) = 0_{\mathbb{C}}$  является

$$z^{-1} = \left( \frac{a}{N(z)}, -\frac{b}{N(z)} \right), \quad N(z) = a^2 + b^2.$$

Осталось проверить дистрибутивность введенных операций слева и справа, что проводится непосредственным вычислением:

$$z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3.$$



**Лемма 4.1.** Отображение  $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ , заданное формулой  $\sigma(a) = (a, 0)$  является вложением  $\mathbb{R}$  в  $\mathbb{C}$ .



Покажем, что  $\sigma$  - гомоморфизм:

$$\begin{aligned}\sigma(a+b) &= (a+b, 0) = (a, 0) + (b, 0) = \sigma(a) + \sigma(b), \\ \sigma(ab) &= (ab, 0) = (a, 0) \cdot (b, 0) = \sigma(a) \cdot \sigma(b).\end{aligned}$$

Далее  $\sigma$  инъективно:

$$\sigma(a) = \sigma(b) \Rightarrow \sigma(a-b) = (0, 0) \Rightarrow a-b=0.$$

Следовательно  $\sigma$  - вложение.



**Алгебраической формой** комплексного числа  $z = (a, b) \in \mathbb{C}$  называется представление его в следующем виде:

$$z = a + ib,$$

где символ  $i$  называется **мнимой единицей** и обладает свойством  $i^2 = -1 \in \mathbb{R}$ .

**Лемма 4.2.** Отображение  $(a, b) \mapsto a + ib$  является кольцевым изоморфизмом.

**Nota bene** Заметим, что  $i' = -i$  также является мнимой единицей, что приводит к автоморфизму  $z \mapsto \bar{z}$  поля  $\mathbb{C}$ , который называется **комплексным сопряжением**.

Пусть  $z = a + ib \in \mathbb{C}$  - комплексное число, тогда

- $\Re z \triangleq a$  называется **вещественной частью** числа  $z$ ;
- $\Im z \triangleq b$  называется **мнимой частью** числа  $z$ ;
- $\bar{z} = a - ib$  называется числом, **комплексно сопряженным** к  $z$ ;
- $N(z) \triangleq z\bar{z} = a^2 + b^2$  называется **нормой** комплексного числа  $z$ ;
- $|z| = \sqrt{N(z)} = \sqrt{a^2 + b^2}$  называется **модулем** комплексного числа.

## 4.2 Тригонометрическая форма комплексного числа

**Nota bene** Пару вещественных чисел  $(a, b)$ , определяющих комплексное число  $z$ , можно интерпретировать как координаты некоторой точки на плоскости, которая называется *комплексной плоскостью*. Координаты на рассматриваемой плоскости - это *вещественная*  $\Re$  и *мнимая*  $\Im$  оси.

**Аргументом** комплексного числа  $z$  (обозначается  $\arg(z)$ ) называется направленный угол от оси  $\Re$  до луча  $Oz$ , откладываемый против часовой стрелки с величиной, берущейся по модулю  $2\pi k$ .

**Nota bene** Альтернативно паре  $(a, b)$  можно использовать пару  $(\rho, \psi)$ , определяемую следующим образом:

$$\begin{aligned} a &= \rho \cos \psi, & b &= \rho \sin \psi, \\ \rho &= \sqrt{a^2 + b^2} = |z|, & \cos \psi &= a/|z|, & \sin \psi &= b/|z|. \end{aligned}$$

Пара  $(\rho, \psi)$  отвечает координатам точки  $z$  в *полярной системе координат*.

**Тригонометрической формой** комплексного числа  $z \in \mathbb{C}$  называется представление его в следующем виде:

$$z = (\rho \cos \psi, \rho \sin \psi) = \rho(\cos \psi, \sin \psi).$$

**Лемма 4.3.** *Имеют место свойства:*

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \quad \arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2).$$



Прямой проверкой убеждаемся, что

$$\rho_1(\cos \psi_1, \sin \psi_1) \cdot \rho_2(\cos \psi_2, \sin \psi_2) = \rho_1 \rho_2 (\cos(\psi_1 + \psi_2), \sin(\psi_1 + \psi_2)).$$



**Теорема 4.2.** (Формула Муавра) Пусть  $z \in \mathbb{C}$  и  $n \in \mathbb{N}$ , тогда

$$|z^n| = |z|^n, \quad \arg(z^n) = n \cdot \arg(z).$$



Доказательство проводится индукцией по  $n$ .




---

**Пример 4.1.** Найдем решение уравнения

$$z^n = \omega, \quad z, \omega \in \mathbb{C}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Из формулы Муавра следует

$$|z|^n \cdot (\cos(n\psi), \sin(n\psi)) = |\omega| \cdot (\cos \chi, \sin \chi),$$

откуда получаем

$$|z| = \sqrt[n]{|\omega|}, \quad n\psi = \chi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

И значит

$$z = \sqrt[n]{|\omega|} \left( \cos \frac{\chi + 2\pi k}{n}, \sin \frac{\chi + 2\pi k}{n} \right)$$


---

## ПОЛЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ

**Nota bene** Из примера видно, что все решения уравнения лежат на окружности радиуса  $r = \sqrt[n]{|\omega|}$  в вершинах правильного  $n$  - угольника.

**Лемма 4.4.** Множество корней уравнения  $z^n = 1$  образует мультипликативную абелеву группу.



Пусть  $S$  - множество решений данного уравнения. Покажем, что  $S$  замкнуто:

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in S \Rightarrow \varepsilon_1^n = 1, \quad \varepsilon_2^n = 1 \Rightarrow (\varepsilon_1 \varepsilon_2)^n = 1 \Rightarrow \varepsilon_1 \varepsilon_2 \in S.$$

Нейтральным элементом является  $\varepsilon_0 = 1_{\mathbb{C}}$ .

Обратный элемент к  $\varepsilon \in S$  имеет вид  $\varepsilon^{-1} = \varepsilon^{n-1}$ .



**Nota bene** Альтернативная форма записи комплексного числа в тригонометрической форме имеет вид:

$$z = \rho \cdot (\cos \psi + i \sin \psi).$$

|| **Показательная форма** комплексного числа имеет вид

$$z = \rho \cdot e^{i\psi}, \quad \rho = |z|, \quad \psi = \arg(z), \quad i^2 = -1.$$

**Nota bene** (формулы Эйлера)

$$\cos \psi = \frac{e^{i\psi} + e^{-i\psi}}{2}, \quad \sin \psi = \frac{e^{i\psi} - e^{-i\psi}}{2i}.$$