



# Лекция 7

## Квадратичные формы в линейном пространстве

### Содержание лекции:

В настоящей лекции мы обсудим квадратичные формы и основные задачи, связанные с ними. Квадратичные формы играют особую роль ввиду того, что могут определять геометрию пространства, над которым они заданы наподобие того как скалярное произведение задает геометрию в евклидовом пространстве. Мы изучим общие аспекты исследования квадратичных форм и коротко затронем вопросы геометрической интерпретации полученных результатов.

### Ключевые слова:

Билинейная форма, квадратичная форма, канонический вид КФ, приведение к главным осям, индексы инерции КФ, сигнатура КФ, положительно определенные КФ, теорема Лагранжа.

### Авторы курса:

Трифанов А. И.

Москаленко М. А.

### Ссылка на ресурсы:

[mathdep.ifmo.ru/geolin](http://mathdep.ifmo.ru/geolin)

### 7.0.1 Определение квадратичной формы

**Nota bene** Напомним, что билинейной формой над вещественным линейным пространством  $X(\mathbb{R})$  называется отображение  $b : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ , удовлетворяющее следующим свойствам:

$$\begin{aligned} b(x_1 + x_2, y) &= b(x_1, y) + b(x_2, y), & b(\lambda x, y) &= \lambda b(x, y), \\ b(x, y_1 + y_2) &= b(x, y_1) + b(x, y_2), & b(x, \lambda y) &= \lambda b(x, y). \end{aligned}$$

**Nota bene** Билинейная форма является тензором второго ранга и типа  $(2, 0)$ :

$$b \in \Omega_0^2(\mathbb{R}).$$

**Nota bene** Пусть  $\{e_j\}_{j=1}^n$  базис  $X$ , тогда

$$b \leftrightarrow b_{ij}, \quad x \leftrightarrow \xi^i, \quad y \leftrightarrow \eta^j$$

тогда

$$b(x, y) = \sum_{i,j=1}^n \xi^i \eta^j b_{ij} = \xi^T B \eta,$$

где  $B$  - матрица квадратичной формы  $b$ .

**Пример 7.1.** Пример квадратичной формы в  $\mathbb{R}^2$  и соответствующей ей матрицы:

$$b(x, y) = a_{11}x^1y^1 + a_{12}x^1y^2 + a_{21}x^2y^1 + a_{22}x^2y^2 \Rightarrow B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

**Квадратичной формой**, соответствующей билинейной форме  $b$  называется отображение  $q : X \rightarrow \mathbb{R}$ , такое что:

$$q(x) = b(x, x), \quad \forall x \in X.$$

**Nota bene** В базисе  $\{e_j\}_{j=1}^n$  пространства  $X(\mathbb{R})$  квадратичная форма имеет вид

$$q(x) = \sum_{i,j=1}^n \xi^i \xi^j q_{ij} = \xi^T Q \xi,$$

где  $Q$  - матрица квадратичной формы.

**Пример 7.2.** Метрика Минковского:

$$\mu(x) = (x^0)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2.$$

**Лемма 7.1.** Закон преобразования коэффициентов билинейной формы при переходе к новому базису при помощи матрицы  $T$  имеет вид:

$$\tilde{Q} = T^T Q T.$$

**Лемма 7.2.** Матрица квадратичной формы  $q$  симметрична в любом базисе:

$$Q^T = Q.$$

## Диагонализация матрицы квадратичной формы

Говорят, что квадратичная форма **диагональна** в некотором базисе линейного пространства  $X(\mathbb{R})$ , если диагональна ее матрица в этом базисе:

$$Q = \text{diag} \{ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \}.$$

Если при этом  $\alpha_j \in \{0, \pm 1\} \quad \forall j$ , то говорят, что квадратичная форма  $q$  имеет в соответствующем базисе **канонический** вид.

Процедура нахождения базиса, в котором данная квадратичная форма является диагональной, называется **приведением к главным осям**.

**Nota bene** Пусть квадратичная форма приведена к диагональному виду, тогда

$$q(x) = \sum_{i=1}^p \alpha_i |\xi^i|^2 + \sum_{j=1}^q \beta_j |\xi^{p+j}|^2,$$

где  $\alpha_i > 0$ ,  $\beta_j < 0$  и  $n - p - q = z$ .

Числа  $p$ ,  $q$  и  $z$  называются соответственно **положительным**, **отрицательным** и **нулевым индексами инерции** квадратичной формы  $q$ .

**Теорема 7.1.** (об индексах инерции КФ) Индексы инерции квадратичной формы не зависят от способа ее приведения к главным осям:

$$p' = p, \quad q' = q, \quad p + q \leq n.$$



Докажем от противного. Пусть  $p > p'$  и рассмотрим соответствующий базис  $X(\mathbb{R})$ :

$$\{e_j\}_{j=1}^n = \{e_1, e_2, \dots, e_p; e_{p+1}, e_{p+2}, \dots, e_{p+q}; e_{p+q+1}, \dots, e_n\},$$

и линейные оболочки

$$L = \langle e_1, e_2, \dots, e_p \rangle_{\mathbb{R}}, \quad L' = \langle \tilde{e}_{p'+1}, \tilde{e}_{p'+2}, \dots, \tilde{e}_n \rangle_{\mathbb{R}}.$$

Заметим, что

$$\dim L + \dim L' = p + (n - p') = n + (p - p') > 0,$$

и тогда

$$\dim(L \cap L') = \dim L + \dim L' - \dim(L + L').$$

Значит  $\dim_{\mathbb{R}} L \cap L' > 0$  и  $L \cap L' \neq \{0\}$ . Пусть теперь  $z \in L \cap L', z \neq 0$  тогда

$$q(z) = \sum_{i=1}^p \alpha_i |\zeta^i|^2 > 0, \quad q(z) = \sum_{i=p'+1}^n \alpha_i |\tilde{\zeta}^i|^2 \leq 0.$$

Значит предположение  $p > p'$  неверно и, следовательно,  $p \leq p'$ . Аналогично можно доказать, что  $p' \leq p$  и тогда  $p = p'$  и  $q' = q$ .



|| Тройка  $(n_+, n_-, n_0) \triangleq (p, q, z)$  называется **сигнатурой** квадратичной формы.

**Пример 7.3.** Алгебраические поверхности второго порядка в  $\mathbb{R}^3$ :

- эллипсоид  $(3, 0, 0)$ :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1;$$

- однополостный гиперболоид  $(2, 1, 0)$ :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

- двуполостных гиперболоид  $(1, 2, 0)$ :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

- эллиптический цилиндр  $(2, 0, 1)$ :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

|| Квадратичная форма  $q$  называется **положительно определенной**, если:

$$n_+ = n = \dim_{\mathbb{R}} X \quad \Rightarrow \quad \forall x \in X \quad q(x) \geq 0, \quad q(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0.$$

**Теорема 7.2.** (Лагранжа) Квадратичная форма в линейном пространстве может быть приведена к диагональному виду методом выделения полных квадратов.



Пусть в некотором базисе пространства  $E$  квадратичная форма имеет вид

$$q(x) = \sum_{i,j=1}^n q_{ij} \xi^i \xi^j.$$

Если  $q_1 = 0$ , то перенумеруем элементы так, чтобы  $q_{11} \neq 0$ . Если все  $q_{ii} = 0$ , то воспользуемся заменой (при условии что  $q_{1k} \neq 0$ )

$$\tilde{\xi}^1 = \xi^1 - \xi^k, \quad \tilde{\xi}^k = \xi^1 + \xi^k, \quad \tilde{\xi}^i = \xi^i.$$

Далее будем полагать, что  $q_{11} \neq 0$  и выделим следующую группу слагаемых:

$$q(x) = q_{11} |\xi^1|^2 + 2q_{12}\xi^1\xi^2 + \dots + 2q_{1n}\xi^1\xi^n + \sum_{i,j=2}^n q_{ij}\xi^i\xi^j.$$

Преобразуем группу следующим образом:

$$\begin{aligned} & q_{11} |\xi^1|^2 + 2q_{12}\xi^1\xi^2 + \dots + 2q_{1n}\xi^1\xi^n = \\ & = q_{11} \left( \xi^1 + \frac{q_{12}}{q_{11}}\xi^2 + \frac{q_{13}}{q_{11}}\xi^3 + \dots + \frac{q_{1n}}{q_{11}}\xi^n \right)^2 - \frac{q_{12}^2}{q_{11}} |\xi^2|^2 - \dots - \frac{q_{1n}^2}{q_{11}} |\xi^n|^2 - \\ & \quad - 2\frac{q_{12}q_{13}}{q_{11}}\xi^2\xi^3 - \dots - \frac{q_{1,n-1}q_{1n}}{q_{11}}\xi^{n-1}\xi^n. \end{aligned}$$

Значит выражение для  $q$  может быть переписано так:

$$q(x) = q_{11} \left( \xi^1 + \frac{q_{12}}{q_{11}}\xi^2 + \frac{q_{13}}{q_{11}}\xi^3 + \dots + \frac{q_{1n}}{q_{11}}\xi^n \right)^2 + \sum_{i,j=2}^n \tilde{q}_{ij}\xi^i\xi^j,$$

где  $\tilde{q}_{ij}$  - коэффициенты, полученные после преобразования. Пусть далее

$$\begin{aligned} \eta^1 &= \xi^1 + \frac{q_{12}}{q_{11}}\xi^2 + \frac{q_{13}}{q_{11}}\xi^3 + \dots + \frac{q_{1n}}{q_{11}}\xi^n, \\ \eta^2 &= \xi^2, \quad \dots, \quad \eta^n = \xi^n. \end{aligned}$$

Тогда в новых координатах форма примет вид

$$q(x) = q_{11} |\eta^1|^2 + \sum_{i,j=2}^n \tilde{q}_{ij}\eta^i\eta^j$$

Если форма  $\sum_{i,j=2}^n \tilde{q}_{ij}\eta^i\eta^j$  тождественно равна нулю, то вопрос о ее диагонализации решен, в противном случае повторяем описанный выше алгоритм не меняя координату  $\eta^1$ . Очевидно, все приведенные преобразования являлись невырожденными.

◀