


Formula Integral de Cauchy


Sea la siguiente integral: $\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz$

Si $f(z)$ es analítica en la curva cerrada C , así como en su región interior.

Si además z_0 pertenece a dicha región interior, entonces $z-z_0 \neq 0$; ya que, $z \in C$. Por tal motivo, el integrando $\frac{f(z)}{z-z_0}$ es bien definida en la curva cerrada C , donde $z \neq z_0$. Sin embargo, en la región interior, donde z puede ser $z=z_0$, el integrando será analítico sólo cuando $f(z_0) = 0$ (esto se demostrará en breve)



Como sabemos, podemos deformar el camino cerrado a otro sin alterar el valor de la integral. Tomemos una circunferencia centrada en z_0 :



Tenemos $z - z_0 = R e^{i\theta}$
 $dz = i R e^{i\theta} d\theta$

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \int \frac{f(z_0 + R e^{i\theta})}{R e^{i\theta}} i R e^{i\theta} d\theta$$

$$= \int f(z_0 + R e^{i\theta}) i d\theta$$

Para $R \ll 1$: $f(z_0 + R e^{i\theta}) \approx f(z_0) + f'(z_0) R e^{i\theta}$

Cuando tomamos el límite $R \rightarrow 0$ (ya que podemos deformar la curva):
 $f(z) \approx f(z_0)$

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = f(z_0) i \int d\theta = 2\pi i f(z_0)$$

Notamos que cuando $f(z_0) = 0$ la integral es $= 0$, por lo tanto el integrando $\frac{f(z)}{z-z_0}$ será analítico en S .

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 2\pi i f(z_0) = 0$$

Lo cual es lógico debido al teorema integral de Cauchy.
Si $f(z_0) \neq 0$, entonces:

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 2\pi i f(z_0) \neq 0$$

Por lo tanto, el integrando $\frac{f(z)}{z-z_0}$ no es analítico en S .

Si z_0 se encuentra en la región exterior a la encerrada por C , el integrando siempre será analítico. Por lo tanto, de todo lo visto inferimos:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz = \begin{cases} f(z_0) ; & z_0 \text{ en la región } S \\ \rightarrow \text{Puede ser } = 0 \text{ cuando } \frac{f(z)}{z-z_0} \text{ sea analítica en } S. \\ 0 ; & z_0 \text{ fuera de la región } S \end{cases}$$

Derivadas:

$$\text{de } f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz$$

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$$