





Para resolver estos ejercicios debe tener en cuenta las propiedades de los límites; además debe tener presente que si al resolver directamente se obtiene indeterminación, ésta debe solucionarse mediante factorización.

Nombre:	Curso:	Fecha:
11011101101	C dirbo:	1 00110.

Para recordar:

## Casos de factorización

- Diferencia de cuadrados:  $a^2 b^2 = (a b)(a + b)$
- Trinomios
  - i)  $x^2 + 3x 10$ .

En este caso debemos buscar dos números que multiplicados den el tercer término -10 y sumados den el coeficiente del segundo término 3, los cuales son 5 y -2. De tal forma que la factorización es:

$$x^2 + 3x - 10 = (x - 2)(x + 5)$$

ii)  $6x^2 + 7x - 20$ 

Se puede resolver este caso de forma similar al anterior, multiplicando y dividiendo por el coeficiente del primer término 6. Así:

$$6x^{2} + 7x - 20 = \frac{6(6x^{2}) + 7x(6) - 20(6)}{6}$$

$$= \frac{36x^{2} + 7(6x) - 120}{6}$$

$$= \frac{(6x + 15)(6x - 8)}{6}$$

$$= \frac{3(2x + 5)2(3x - 4)}{6}$$

$$= (2x + 5)(3x - 4)$$

Buscamos dos números que sumados

den 7 y multiplicados -120

Cancelamos los factores 3 y 2 con el 6 del denominador

1. Sabiendo que

$$\lim_{x\to a} f(x) = 7, \quad \lim_{x\to a} g(x) = 8 \quad \text{ y } \quad \lim_{x\to a} h(x) = 0$$

y teniendo en cuenta el álgebra de límites, resuelva si existen o no existen, justificar:

$$a)\ \lim_{x\to a}[f(x)+g(x)]=$$


$$b)\ \lim_{x\to a}[h(x)-g(x)]=$$

$$c) \ \lim_{x \to a} \frac{h(x))}{g(x)} =$$

$$d) \lim_{x \to a} \frac{f(x)}{h(x)} =$$

$$e) \lim_{x \to a} [f(x) \cdot g(x)] =$$

2. Con base en las siguientes gráficas de las funciones f y g, determine:



$$a) \lim_{x \to -2} [f(x) + g(x)] =$$

$$b) \ \lim_{x\to -1} [f(x)-g(x)] =$$

$$c) \ \lim_{x \to 1} [f(x) \cdot g(x)] =$$

$$d) \lim_{x \to -2} \frac{f(x)}{g(x)} =$$

3. Evalúe los siguientes límites:

a) 
$$\lim_{x \to 3} x^2 - 4x + 6 =$$

b) 
$$\lim_{x\to 7} \frac{x^2-49}{x-7} =$$

c) 
$$\lim_{x\to 5} \frac{x^2 + 3x - 40}{x - 5} =$$

d) 
$$\lim_{x\to 3} \frac{2x^2 - x - 15}{x - 3} =$$