



# Taller 08, Diferencia de cuadrados y cubos Álgebra 8°



Germán Avendaño Ramírez, Lic. U.D., M.Sc. U.N.

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

## Guía

A continuación se explican dos casos de factorización a abordar en este taller.

### Diferencia de cuadrados

Se presenta como su nombre lo indica cuando existe una diferencia entre dos cantidades o expresiones que son cuadrados perfectos y se factoriza según el siguiente patrón:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Siempre que se tenga una diferencia de cuadrados perfectos, se factoriza como una suma por una diferencia de sus raíces.

#### Ejemplo 1

Factorizar  $x^2 - 16$

Se observa que tanto  $x^2$  como 16 son cuadrados perfectos, ya que  $x^2$  es el cuadrado de  $x$  y 16 es el cuadrado de 4. Luego factorizamos así:

$$\begin{aligned} x^2 - 16 &= x^2 - 4^2 \\ &= (x - 4)(x + 4) \end{aligned}$$

Diferencia de cuadrados  
suma por diferencia

#### Ejemplo 2:

Factorizar  $4x^2 - 9y^2$



Nuevamente observamos que tanto 4 como  $x^2$  son cuadrados perfectos, así como 9 y  $y^2$ . Más específicamente podemos asumir que  $4x^2$  es el cuadrado de  $2x$  y que  $9y^2$  es el cuadrado de  $3y$ . Así que factorizamos así:

$$\begin{aligned} 4x^2 - 9y^2 &= 2^2x^2 - 3^2y^2 && \text{Cada término es cuadrado perfecto} \\ &= (2x)^2 - (3y)^2 && \text{Se expresa como Diferencia de cuadrados} \\ &= (2x - 3y)(2x + 3y) && \text{Se factoriza} \end{aligned}$$

A veces se debe factorizar completamente porque uno de los factores es a su vez una diferencia de cuadrados, como en los siguientes ejemplos

### Ejemplo 3:

$$16x^4 - 81y^4$$

Se procede a factorizar como ya sabemos:

$$\begin{aligned} 16x^4 - 81y^4 &= 4^2(x^2)^2 - 9^2(y^2)^2 && \text{Los términos son C. P.} \\ &= (4x^2)^2 - (9y^2)^2 && \text{Se expresa como diferencia de C.P.} \\ &= (4x^2 - 9y^2)(4x^2 + 9y^2) && \text{El primer factor es una Dif. de C.P.} \\ &= [(2x)^2 - (3y)^2](4x^2 + 9y^2) && \text{Se expresa el primer factor como una D. de C.P.} \\ &= (2x - 3y)(2x + 3y)(4x^2 + 9y^2) \end{aligned}$$

## Quiz conceptual

Para los siguientes enunciados escriba V o F según corresponda.

- Un binomio que tiene dos cuadrados perfectos que se restan es una diferencia de cuadrados.
- La suma de dos cuadrados es factorizable usando enteros.
- La suma de dos cubos se puede factorizar usando enteros.
- La diferencia de dos cuadrados es factorizable.
- La diferencia de dos cubos es factorizable
- Para factorizar es aconsejable inspeccionar que se pueda aplicar factor común en primera instancia.
- El polinomio  $4x^2 + y^2$  se factoriza como  $(2x + y)(2x + y)$

- h. La factorización completa de  $y^4 - 81$  es  $(y^2 + 9)(y^2 - 9)$
- i. La ecuación  $x^2 = -9$  no tiene soluciones reales.
- j. La ecuación  $abc = 0$  si y sólo si  $a = 0$

## Ejercicios

Factorice usando el caso diferencia de cuadrados.

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. $x^2 - 9$         | 6. $25 - 49n^2$             |
| 2. $4x^2 - 49$       | 7. $(3x + 5y)^2 - y^2$      |
| 3. $x^2 - 64y^2$     | 8. $x^2 - (y - 5)^2$        |
| 4. $x^2y^2 - a^2b^2$ | 9. $16s^2 - (3t + 1)^2$     |
| 5. $x^6 - 9y^2$      | 10. $(x - 1)^2 - (x - 8)^2$ |

Factorice cada uno de los siguientes polinomios completamente. Indique cuáles no son factorizables usando coeficientes enteros. No olvide los casos vistos antes, como "factor común"

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 11. $8x^2 - 72$     | 17. $20x^3 + 45x$    |
| 12. $7x^2 + 28$     | 18. $12x^3 - 27xy^2$ |
| 13. $5y^2 - 80$     | 19. $1 - 16x^4$      |
| 14. $x^3y^2 - xy^2$ | 20. $20x - 5x^3$     |
| 15. $x^4 - 16$      | 21. $9x^2 - 81y^2$   |
| 16. $4x^2 + 9$      | 22. $2x^5 - 162x$    |

Para los siguientes ejercicios, use la suma o diferencia de cubos para factorizar.

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 23. $a^3 - 27$     | 26. $1 - 8x^3$       |
| 24. $x^3 + 8$      | 27. $125x^3 + 27y^3$ |
| 25. $8x^3 + 27y^3$ | 28. $x^6 + y^6$      |

Para los problemas siguientes, encuentre todos los números reales que son solución de cada ecuación.



29.  $x^2 - 1 = 0$

33.  $54 - 6x^2 = 0$

30.  $4y^2 = 25$

34.  $x^5 - x = 0$

31.  $3x^2 - 108 = 0$

32.  $4x^3 = 64x$

35.  $4x^3 + 12x = 0$

Para los problemas siguientes, plantee una ecuación y soluciónela para resolver el problema.

36. El cubo de un número es igual a su cuadrado. Encuentre el número

37. La suma de las áreas de dos cuadrados es  $26 m^2$ . El lado del cuadrado grande es cinco veces el lado del cuadrado pequeño. Encuentre las dimensiones de cada cuadrado.

38. Suponga que el largo de un rectángulo es  $1\frac{1}{3}$  veces su ancho. El área del rectángulo es  $48 cm^2$ . Encuentre el largo y ancho del rectángulo.

39. La superficie total de un cono circular recto es  $108\pi cm^2$ . Si la altura del cono es dos veces la longitud del radio de la base, encuentre la longitud del radio.

40. La altura de un triángulo es  $\frac{1}{3}$  la longitud del lado sobre el que se dibuja la altura. Si el área del triángulo es  $6 cm^2$ , encuentre su altura.