


Métabolisme primaire (par opposition à métabolisme secondaire) nécessaire à la survie d'une cellule.

Structure d'un chloroplaste



La photosynthèse est composée de deux phases :

- Photochimique. Elle doit permettre de produire de l'énergie par l'utilisation de la lumière de l'eau sous forme de NADPH et de l'ATP pour les besoins de la plante et notamment la fixation du carbone.
- Le cycle de fixation du carbone ou de fabrication des glucides appelé aussi cycle de Calvin. Il a lieu dans le stroma.

Rmq : NADP ressemble au NAD avec un groupement phosphate.

Il existe deux types de photosynthèses en présence ou de l'absence d'oxygène :

photosynthèse oxygénique	photosynthèse anoxygénique
$2H_2O + CO_2 \rightarrow O_2 + H_2O + CH_2O$	

Phytochimique

La phase photochimique permet de produire à partir de la lumière :

- Dans un premier temps un gradient H^+ dans la lumière des thylakoïdes qui sera utilisé pour fabriquer de l'ATP. Elle débute au niveau du photosystème II
- Un second temps du $NADP^+$ en NADPH. Son pouvoir réducteur en fait une molécule utilisée pour les réactions anaboliques. Le début est initialisé par le photosystème I.

Les produits serviront notamment à produire des sucres, un des quatre principaux constituants du vivant.

Les photosystèmes sont formés :

- D'un complexe du centre réactionnel. Il est constitué de deux molécules de chlorophylles de type a sans magnésium. Elles transfèrent et réduisent un accepteur primaire d'électrons c'est-à-dire un lui transmette un électron de haute énergie.
- De plusieurs complexes collecteurs de lumière constitués d'environ 200 à 300 pigments. Ils élargissent le spectre et la surface de collecte de la lumière du centre réactionnel.

Les pigments sont des molécules spécialisées pour capter la lumière

Les pigments

Le spectre de lumière exploitée lors de la photosynthèse est contraint par l'utilisation de longueurs d'ondes :

- Supérieur à 380nm. En dessous de cette longueur d'onde, la lumière est filtrée par l'atmosphère et est néfaste pour les cellules.
- Inférieur à 750nm. Au-dessus, les ondes sont absorbées par l'eau, un constituant présent en grande quantité dans les organismes.

Radiation photosynthétique active ensemble des longueurs d'ondes utilisées par la plante.

Fonctionnement des pigments

La photosynthèse débute lorsqu'un pigment absorbe un photon. Un de ses électrons passe sur une orbitale avec une énergie potentielle plus élevée. Pour être absorbé, les photons doivent apporter l'énergie équivalente à la différence d'énergie entre l'état fondamental et excité.

Rmq : l'énergie d'un photon est sa longueur d'onde. Les photons verts ne sont pas absorbés car leur énergie ne correspond pas à la différence.

Rmq : Chaque molécule n'est capable que d'absorber des longueurs d'onde précises.

L'état excité est un état instable. Les électrons reviennent à l'état fondamental en libérant le surplus d'énergie sous forme :

- De chaleur.
- Lumière. Par exemple, un concentré de chlorophylle émet de la lumière rouge avec une longueur d'onde plus grande que le photon reçu (fluorescence).

Les pigments sont regroupés au sein de structure appelée antenne collectrice. Il existe deux grandes familles de pigments :

Chlorophylle	Caroténoïde
--------------	-------------

Les algues utilisent des pigments supplémentaires pour réaliser la photosynthèse car le milieu aquatique modifie les propriétés de la lumière. Ils sont formés de complexe protéines et pigments associés à des phycobiliprotéines appelé phycobiline.

Les caroténoïdes

Les caroténoïdes sont des pigments additionnels qui aident à capter :

- L'énergie lumineuse.

- À la photoprotection en dissipant le surplus d'énergie. Elle évite l'interaction entre les photons et l'oxygène qui peuvent former des molécules oxydantes dangereuses.

Les caroténoïdes sont des molécules lipophiles présentes dans les membranes des thylakoïdes. Elles sont fabriquées dans les plastes à partir de terpène. Leur pic d'absorption se situe à 450 nm. Leur structure est apparentée aux pigments présent dans notre œil.

Les chlorophylles

Les pigments chlorophylliens sont composés :

- Un noyau porphyrine hydrophile qui enserme un ion magnésium (Mg^{2+}) dans le stroma.
- Une queue phytol hydrophobe qui est ancrée dans la membrane des thylakoïdes.

Il existe quatre types de chlorophylle :

Type de chlorophylle (pics d'abs)	Présence
A (430 nm et 662 nm)	Universelle
B (454 nm)	Plantes et algues vertes
C1 et c2	Algues brunes
D	Algues rouges

Les différences de comportement des types de chlorophylle face à la lumière dépendent des groupements situés autour du noyau. Par exemple, pour les deux types de chlorophylles les plus présentes c'est à dire a et b, la différence de pics d'absorption s'explique par la substitution d'un groupement $-CH_3$ par un CHO .

Un changement de l'état énergétique se produit dans la molécule de chlorophylle entre en contact avec un photon bleu ou rouge. Si le photon est de couleur bleu, elle libère le surplus d'énergie sous forme de chaleur pour se ramener à un photon rouge.

Il existe trois possibilités pour revenir à l'état initial c'est-à-dire pour dissiper l'énergie et revenir à une configuration stable :

- Fluorescence c'est-à-dire par l'émission d'un photon de plus faible énergie que celui reçu.
- Par résonance. L'énergie est transférée à la molécule suivante.
- Photochimie cède un électron.

C'est parce que la chlorophylle est associée à d'autres protéines dans la cellule qu'elle n'émet pas de lumière.

Fonctionnement de la phase photochimique

La photosynthèse se déroule :

Dans le photosystème II

1. Excitation des pigments par la lumière. L'énergie se propage vers le complexe du centre d'excitation. L'électron excité transmet son état à un électron de la molécule voisine et retrouve son état fondamental.
2. P680 transfère un électron à l'accepteur primaire. Il devient alors $P680^+$.
3. Une enzyme construite autour de ions Mn (Manganèse) transfère les électrons de l'eau un par un vers $P680^+$ ($H_2O \rightarrow \frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^-$) pour combler la charge manquante. Rmq : $P680^+$ est l'oxydant biologique le plus fort. 1 centre qui accepte successivement 4 électrons pour l'oxyder l' O_2
4. L'accepteur primaire du photosystème cède son électron à la chaîne de transport constituée d'une succession de plastoquinones (Pq), complexe de cytochromes et d'une plastocyanine (Pc), une molécule mobile.
5. Durant leur trajet les électrons font fonctionner des pompes à protons au niveau des cytochromes. Elles concentrent les H^+ du

stroma dans la lumière du thylakoïde. Le gradient de H^+ créé servira à la chimiosmose pour produire de l'ATP grâce aux ATP synthases.

Dans le photosystème I

6. L'énergie lumineuse active PSI de la même façon que PSII. L'accepteur primaire est la ferrédoxine (Fd) qui transmet l'électron à une chaîne de transport. Il n'y a pas de production de gradient H^+ . Ferrédoxine réduction NADP en NADPH.
7. La chaîne conduit la ferrédoxine à la NADP⁺ réductase qui catalyse le NADP⁺ en NADPH. Cela contribue à une baisse de la concentration de H^+ dans le stroma.

Photolyse de l'eau dissociation d'une molécule d'eau par la lumière.

Dans la photosynthèse oxygénique, le CO_2 joue le rôle d'accepteur d'électrons. Il est possible de réaliser la photosynthèse sans CO_2 en utilisant un autre réducteur comme Fe^{3+} .

Structure des photosystèmes


La phase photochimique a lieu en deux étapes. Elles sont commencées par un photosystème qui agissent successivement et qui sont le lieu de la conversion de l'énergie lumineuse en chimique en réalisant une réduction :

Le photosystème II (P680)	Le photosystème I (P700)
---------------------------	--------------------------

Rmq : les herbicides sont des inhibiteurs de la chaîne de transport des électrons.

Photosystème II

Le photosystème II réalise la réaction :



La longueur d'onde pour réaliser une oxydation de l'eau est comprise entre 660 et 680 nm. Il est composé de trois parties :


- Une antenne collectrice de photons. libre qui navigue dans la membrane des thylakoïdes et peut aller sur le complexe I. Il est composé de :
 - Des pigments associés grâce à des protéines d'amarrage.
 - De protéines périphériques (ou distale).
- Un centre réactionnel composé de deux sous unités dimère D1 et D2.
- Un complexe d'oxydation de l'eau situé dans la lumière des thylakoïdes associé à un atome de manganèse (Mn).

Le fonction du site réactionnel

1. Chlorophylle reçoit la lumière cède électron.
2. PSII $2H_2O \rightarrow$ oxydé cède un électron à $O_2 + H^+ + 4e^-$
3. Retiré les électron complexe d'oxydation vient compenser la perte
4. Quatre électrons de l'oxydation de l'eau viennent t1 à 1 produit 3 émissions de photons pour l'étape est lieu.

Photosystème I

Le photosystème I réalise la réaction :



Il est constitué de :

- Une antenne collectrice
- Un centre réactionnel constitué d'un dimère de chlorophylle

Coordination de l'activité entre les photosystèmes I et II

Le deux photosystèmes fonctionnent successivement et à vitesse similaire. Leur activité est coordonnée par l'intermédiaire de la concentration de plastoquinone (PQH_2) qui est le produit et le substrat des deux réactions.

Le transport cyclique du photosystème I

Le transport cyclique est PSI le transport cyclique (circuit fermé)

Ferrédoxine cède son électron au cytochrome puis vers PSI avant de revenir à la ferrédoxine. Génère de l'ATP.

L'apparition du transport cyclique semble précéder celui de

Le transport cyclique semble être apparu en premier au cours de l'évolution. Certaines Bactéries possède uniquement le PSI pour synthétiser l'ATP dont elles ont besoin.

Les plantes dépourvues de ce système poussent sous faible lumière mais Il semble que le transport cyclique est un rôle de photoprotecteur servant à dissiper le surplus d'énergie de la photosynthèse.

Il existe des ressemblances entre les mitochondries et les chloroplastes même si le principe de création du gradient est différent :

- $NADPH + H^+$ et l'ATP sont produits dans le stroma où a lieu le cycle de la synthèse des glucides (Calvin).
- Les réactions se déroulent dans la membrane.

Produit des molécules à 3 atomes de carbones 3 phosphoglycéraldéhyde (PGAL) 3moles de CO_2

1. Le CO_2 est ajouté à la ribulose di phosphate (5C)
2. Enzyme ribulose di phosphate carboxylase/oxygénase. Elle catalyse la réaction mais ne distingue pas le CO_2 du O_2 . Dans.
3. C'est l'enzyme la plus abondante sur Terre.

Synthèse d'ATP

L'acidification du lumen est utilisée pour synthétiser de l'ATP. Les protons servent à créer à activer des ATP synthase, une machine moléculaire. Elle possède deux domaines :

Intra membranaire	Extra membranaire (dans le stroma)
-------------------	------------------------------------

La structure diffère légèrement entre les espèces mais le principe reste le même. Le rotor poussé par les protons modifie successivement des trois sites de catalyse en changeant leur conformation. Il passe d'ouvert, à relâché, puis à fermer.

Les protons font tourner le rotor qui entraîne le stator là où trois sites de catalyse de l'ATP. Un tour nécessite 10 protons et produit une molécule d'ATP. Une ATP synthase tourne 130 fois par seconde.

Efficacité de la photosynthèse

L'efficacité de la photosynthèse dépend de :

La lumière	La concentration de CO ₂
------------	-------------------------------------

Rmq : Le facteur limitant dans l'activité de photosynthèse est le CO₂ qui ne constitue que 3% de l'air.

Photosynthèse net production d'oxygène moins sa consommation par la respiration cellulaire.

Rmq : La photosynthèse net se mesure en suivant l'évolution de la concentration de CO₂ ou celle d'O₂.

Point de compensation seuil à partir duquel la photosynthèse net devient positive.

Les plantes ne sont pas toutes efficaces pour réaliser la photosynthèse. Cela dépend notamment de leur mode de vie. On distingue les plantes

D'ombre	De lumière
---------	------------

Rmq : Les plantes d'ombre ont un point de compensation inférieur à celle de lumière mais la valeur maximale est inférieure.

Certaines plantes ont développé des adaptations pour pallier le manque de CO₂.

Métabolisme secondaire

Métabolite molécule produite par le métabolisme.

Les végétaux disposent d'un métabolisme non essentiel à leur survie appelé métabolisme secondaire par opposition au métabolisme primaire qui est vital. D'importantes différences existent entre les espèces.

Plus de 200 000 métabolites liés au métabolisme secondaire ont été recensés.

Ils servent principalement à :

- Repousser les prédateurs ou les organismes nuisibles et se défendre contre les agressions.
- Compétition entre avec les autres plantes.
- Favoriser la symbiose avec d'autres organismes (bactéries, champignons, pollinisateurs...)

Il existe trois types de métabolites secondaires :

- Composés phénoliques ou les polyphénols issus de la voie de l'acide shikimique et acétate/malonate).
- Les alcaloïdes ou les composés azotés qui dérivent des acides aminés.
- Les terpènes dérivés de l'isopentényl pyrophosphate (IPP), une molécule à 5C.
- Les glycosides qui contiennent une molécule de sucres

Composés phénoliques Synthétiser en réponse au stress


Terpènes nature volatile et une forte odeur photo protection.

Alcaloïdes toxiques

Le métabolisme carboné

La phase biochimique d'assimilation du CO₂ (ou cycle de Calvin)

La phase biochimique d'assimilation du CO₂ a lieu dans le stroma. Elle permet de récupérer le carbone d'une molécule de CO₂ pour la fabriquer une molécule organique. forme un cycle càd qu'une partie du produit est réutilisé pour renouveler la réaction.



La phase est composée de trois parties :

1. Carboxylation. La fixation du CO₂ sur une molécule organique.
2. Réduction. 1/6 du produit quitte du cycle sous forme de sucre et 5/6 est utilisée pour régénérer le substrat.

La carboxylation

La carboxylation est réalisée par la lumière par l'intermédiaire de la Rubisco dont l'activité dépend :

- Du pH
- Du flux de Mg⁺ lumière créé un flux de Mg⁺
- De la concentration de CO₂ augmente active
- La fixation d'une protéine activatrice, la rubisco activase, sur la RubiCo qui transforme le groupement NH₃⁺ d'une lysine en N-COO⁻ lorsque le milieu est basique. Sans elle, la rubisco ne fonction pas.

La réduction

La réduction se :

1. **APG → ABPG** Le transfert d'un groupement phosphate d'ATP vers APG.
2. **APG → 2 aldose PG** La réduction de NADPH

La régulation du cycle de Calvin se fait par

MGG

Inhibiteur : DCMU et DTT utilisé en laboratoire qui bloque la chaîne de transfert d'électrons.

Photorespiration : le cycle du C₂ du glycolate (photorespiration)

La rubisco est l'enzyme la plus présente sur Terre, elle représente 50% de la proportion des molécules foliaires. Son nom vient de 1,5 rubilose bi phosphate carboxylase/oxygénase abrégé en RubisCo. Elle est bifonctionnelle. Elle fixe sur un ribose bi phosphate soit :

CO ₂	O ₂
-----------------	----------------

L'enzyme a beaucoup plus d'affinité pour le CO₂ que pour le O₂. La probabilité de liaison avec le substrat dépend de la concentration en CO₂. Ainsi on considère qu'en condition standard qu'un 1/3 du temps elle fixe le O₂. On estime que ce métabolisme réduit jusqu'à 50% l'activité photosynthétique en région tempérée.

Point de compensation rapport entre la concentration de O₂ et CO₂ produite.

Photorespiration processus qui produit du CO₂ et qui dépend de la lumière.

La concentration du CO₂ et d'O₂ dans les feuilles de la solubilité des gaz qui dépend de :

La température. Elle diminue plus vite pour le CO₂

Différence entre la photorespiration et la

CO ₂	2 APG	
O ₂	1APG+1 (2-polycolate)	

C'est le polycolate qui est exploité dans la respiration cellulaire. Il est d'abord :

1. Dans les chloroplaste enlever le phosphate.

2. Dans les péroxysomes, transformer un glycine par un oxydation (perte de $2e^-$ et $2H^+$).
3. Dans les mitochondries, à partir de deux glycines est produit une sérine accompagné d'une décarboxylation (production de CO_2).
4. Dans les péroxysomes, la sérine est retransformée en glycérade.

La respiration constitue pour la plante à la fois :

Un coût énergétique	Une perte de carbone
---------------------	----------------------

Les raisons qui expliquent la présence de ce mécanisme :

- un héritage de l'évolution. Lorsque la photosynthèse est apparue, l'atmosphère était dépourvue en O_2 . Il n'était pas nécessaire que la RubisCo distingue O_2 et CO_2 . Or la photosynthèse a changé la composition atmosphérique faisant passer la quantité d'oxygène d'une valeur négligeable à 21% et 0,3% de CO_2 . Ainsi le problème serait apparu après.
- Photoprotection. Lors de fortes chaleurs ou en condition de manque d'eau les stomates sont fermés pour limiter l'évaporation. La lumière continue de faire fonctionner les systèmes photosynthétiques lorsque la concentration d' e^- devient trop faible CO_2 , c'est le O_2 qui réduit générant du O_2^- , une molécule très réactive pouvant altérer les molécules voisines. La respiration servirait à maintenir du CO_2 dans la plante éviter la formation de O_2^-

Plantes au métabolisme C4

Le métabolisme C4 concerne 1500 espèces principalement tropicales ou subtropical et monocotylédones (par exemple, le maïs, la canne à sucre...).

Il permet d'augmenter la quantité de CO_2 disponible pour la plante. Ce métabolisme est apparu indépendamment chez plusieurs espèces avec des différences dans la molécule de transport. Accompagner de spécialisations morphologiques :

- Les cellules de la gaine périvasculaire spécialisées dans le cycle de Calvin. Les chloroplastes possèdent des thylakoïdes lisses.
- Les cellules du mésophylle avec des chloroplastes avec beaucoup de granum qui concentrent de nombreux photosystèmes II permettant de produire de l'ATP et du NADPH.

Permet d'obtenir une concentration en CO_2 entre 5 à 10 supérieur à celle des autres parties de la plante :

1. 1^{er} produit formé CO_2 fixé sur phosphénol pyruvate (PEP) pour former sur oxaloacétate (une molécule à 4 carbones d'où le métabolisme qualifié de C4) ce qui empêche le CO_2 de ressortir.
2. Acheminement vers les chloroplastes de la gaine périvasculaire où il oxaloacétate est décarboxylé pour libérer le CO_2 et régénérer le substrat PEP.

Le métabolisme C4 ajoute un coût de 2ATP au cycle de Calvin qui utilise déjà 3ATP.