Biologie

Le chloroplaste

Vitamine E trouve dans les protoglobule antioxydant

Vitamine non produite par le corps humain sauf D grâce au soleil

Fluorescent produit de la lumière.

Phosphorescence restitue l'énergie lumineuse sous dans une fréquence visible.

Espèce collection d'individus suffisamment proche pour se reproduire et avoir une descendance féconde.

Étiole plante qui pousse en absence de lumière.

Plasmolyse état d'une cellule dans lequel la paroi est décollée de la membrane par le retrait de l'eau.

Unité en biologie

F W Fresh Weight poids frais/Dry Weight

Convention de nommage des cellules

Cellule différenciée	Cellule juvénile
Fonction-cyte	Fonction-blaste

Germinative adjectif pour indiquer une activité de division cellulaire.

Autosome (gonosome) un chromosome non-sexuel par opposition au gonosome qui en est un (chromosomes X et Y chez l'homme par exemple).

Chimie

Entropie

Entropie un système évolue vers l'état de chaos maximum. Les molécules d'eau vont regrouper lipides sous la forme une « bulle » (comme l'huile).

Oxydoréduction

Caractériser une réaction chimique où un ou plusieurs atomes d'oxygènes s'associent à une molécule.

Couple oxydoréduction: X + X2 -> X + X2 Réducteur Oxydant


Polymère molécule constituée par la répétition de sous unité (morceaux).

Autoprotolyse

Dans une même molécule le transfert d'un proton d'une molécule a une autre.

Pour l'eau, à 25 degrés : $[H_3O^+] = [HO^-] = 10^{-7}$ mol/l

pH acide base



NB acide/base n'ont rien à voir avec une solution acide/basique qui la quantité de proton présent dans une solution.

	Un acide est dit dissocié	Une base est dite associée
Un acide ou une base sont dits forts s'ils réagissent totalement avec l'eau.		

Autoprotolyse de l'eau	Constante d'équilibre
------------------------	-----------------------

$[H_3O^+] = [HO^-] = 10^7$	κ - [.	H_3O^+]. [AH]	$[H0^{-}].[AH_{2}^{+}]$
	κ_a – –	[A ⁻]	$K_b = {[AH]}$
$K_e = K_a \times K_b = [H_3 O^+] \times [HO^-]$			

Les atomes du corps humain

97.5% structure	1.75%	0.75 % oligo-éléments associé à une fonction
65 % oxygène (O) 18 % carbone (C) 10 % hydrogène (H) 3 % azote (N) 1,5 % calcium (Ca)	1,75 % du poids 1 % phosphore (P) 0,2 % potassium (K) 0,25 % soufre (S) 0,15 % sodium (Na) 0,15 % chlore (Cl)	magnésium (Mg)-fluor (F)-fer (Fe)-silicium (Si)-zinc (Zn)cuivre (Cu)-iode (I)-étain (Sn)-sélénium (Se)-vanadium (V)manganèse (Mn)-molybdène (Mo)-chrome (Cr)-cobalt (Co)-nickel (Ni)

K potassium	P phosphate	N azote
Électricité dans la	Energie	ADN et protéines
cellule		

Liaison éther



Mesurer l'activité d'une ensyme

Comparer la concentration au départ et à la fin soit du :

Résultat de la réaction	substrat
-------------------------	----------