

Les Virus

Les Virus sont une forme de cellules rudimentaire incapable de produire et de réaliser des activités métaboliques seul. Ils ont besoins de détourner une cellule pour se répliquer. Un virus isolé est inerte.

Les virus seraient apparus après les cellules les premières cellules à partir des débris cellulaires qui se seraient combinés de manière fortuite.

C'est par l'intermédiaire des virus que d'importantes découvertes ont été faites sur la compréhension des mécanismes moléculaires et sur la synthèse des protéines et ils ont permis la mise au point de technologie application médicale.

Physiologie des Virus

Les Virus sont généralement constitués d'une ou plusieurs séquences d'acide nucléique (ARN ou ADN) entouré d'une coque protéine et parfois recouverte d'une membrane.

Capside structure de protéines qui entoure et protège le génome viral.

Cpasone protéines qui constituent la capsid. Chaque virus n'en possède qu'un nombre de types très limité.

Prions protéines infectieuse.

Rmq. Les plus petits virus découverts mesurent 20 nm plus petite qu'un ribosome.

On classe les virus en fonction :

Du type d'acide nucléique	ARN, ADN
Du nombre de brins	bicaténaire, monocaténaire
De la forme des brins	Linéaire, circulaire

Rmq. les Virus qui contaminent les animaux sont souvent de l'ARN entouré d'une capsid, elle-même entourée d'une enveloppe virale dotée de glycoprotéines qui facilitent la liaison avec les cellules de l'hôte.

Bactériophage virus qui infectent bactérien.

Spectre d'hôtes ensemble des cellules qu'un virus est capable d'infecter.

L'activité virale

Pour se répliquer, un virus procède en deux phases :

1 - infection	2 - réplication
---------------	-----------------

L'infection

L'infection correspond au moment où le génome viral pénètre dans la cellule. Le virus peut entrer dans la cellule par :

Endocytose	Injection	Fusion des membranes
------------	-----------	----------------------

L'infection peut être facilité grâce à la présence de glycoprotéines qui vont se lier aux récepteurs membranaires de la cellule hôte.

La réplication

Une fois que le virus est entré dans la cellule, il détourne les composants de la cellule hôte pour synthétiser les siens. Il libère son génome dans le cytosol où débute généralement sa réplication qui sera soit :

Transcrit en protéines virales	Qui deviendra le génome de nouveau virus.
--------------------------------	---

Certains virus sont capables d'insérer leur ADN dans le génome de la cellule hôte qui modifie l'utilisation générale des gènes par la bactérie. Lorsque la cellule se divisera, l'ADN viral sera alors transmis aux cellules filles. Ce phénomène peut conduire le et sera présent dans un grand nombre cellules.

Prophage séquence d'ADN viral insérée dans le génome d'une cellule bactérienne par un virus.

Dans certains cas, le virus apporte une partie des composants dont il a besoin pour se répliquer notamment de l'ADN ou l'ARN polymérase pour pouvoir répliquer le génome viral directement dans le cytosol.

Les rétrovirus à ARN sont capables de réaliser une transcription inverse c'est qu'ils traduire leur ARN en ADN.

Plasmide ADN circulaire qui peut se répliquer indépendamment de la cellule et dans certains cas, passer d'une à une autre.

Transposon segment mobile du génome mobile.

La sortie de la cellule hôte

Une fois produit, les composants viraux s'assemblent spontanément et sorte de la cellule par bourgeonnement parfois en conservant l'enveloppe plasmique pour faciliter l'infection d'un futur cellulaire. C'est au moment de la sortie des virus que la cellule peut être endommagée.

Chez les Virus à ADN bicaténaire, il existe principalement deux mécanismes :

Lytique qui conduit à la lyse de la cellule hôte (c'est-à-dire sa mort)	Lysogénique (sans destruction de la cellule hôte)
---	---

Virus tempéré virus a la fois lytique et lysogénique en des conditions particulières.

La toxicité des virus

La toxicité d'un virus pour l'organisme infecté peut être dû à :

- À la fabrication par le génome viral d'enzymes qui libère les enzymes hydrolytiques contenus dans les lysosomes.
- La synthèse de molécules toxiques
- La toxicité des composants viraux comme l'enveloppe protéique.

Les dégâts à long terme de l'infection d'un virus dépendent du type de cellules infectées. Par exemple, les cellules nerveuses qui persiste durant

toute la vie de l'individu ne sont pas ne seront pas remplacé. Les conséquences de l'infection virale peuvent être irréversible.

Protection et remède curatif contre les virus

Les êtres vivants ont développé des mécanismes de protection pour lutter contre l'infection virale. Les bactéries fabriquent des enzymes de restriction qui identifient et détruisent l'ADN viral.

Chez les végétaux, les virus profitent de la présence des plasmodesmes pour se propager rapidement dans l'ensemble de la plante.

Évolution des virus

Le phénomène de coévolution entre les virus et les êtres vivants sont extrêmement forts car dès qu'un mutant résistant apparaît, il sera favorisé par le phénomène de sélection naturel. Ors inversement, si le génome viral possède un taux de mutation exceptionnellement élevé à cause de l'absence de mécanismes de vérification.

Les activités humaines à travers la mondialisation ont aussi facilité la circulation des virus :

- Multiplié les brassages de population.
- Popularisé certaines pratiques qui favorisent les cas de transmission (l'utilisation de seringues pour s'injecter de la drogue, de pratiques sexuelles).
- À augmenter les rencontres entre les virus et ainsi les risques de recombinaison virale.

Soigner une infection virale

Une fois qu'un organisme est infecté, il est difficile de le soigner. Il existe des solutions comme l'utilisation de faux nucléosides qui limite la réplication du virus mais qui ne sont pas exempter d'effets indésirables.