

Vocabulaire

Norme de réaction ensemble de phénotypes observés en faisant varier les conditions environnementales pour un génotype.

Plasticité phénotypique capacité d'un organisme à exprimer différents phénotypes à partir d'un génotype donné selon l'environnement.

Locus (pluriel loci) position fixe, localisation d'un gène ou d'un marqueur génétique.

Cline évolution graduelle d'un caractère en fonction de l'axe géographique. Il y a une corrélation entre la latitude et la fréquence de l'allèle.

Population groupe d'individus d'une même espèce qui vivent et se reproduisent dans la même zone géographique, qui se reproduisent et engendrent une descendance féconde. Les individus d'une population sont fortement apparentés.

Patrimoine génétique (ou pool génétique ou fond génétique) composition génétique d'une population.

Lorsqu'un seul allèle est présent dans une population on dit que l'allèle est fixé.

Attention il n'existe pas de hiérarchies entre les allèles mais entre les phénotypes. Ainsi, on dira qu'un phénotype [A] est dominant sur [a].

Formule mathématique à connaître

Nombre de combinaisons : Soit un ensemble E de n éléments. On souhaite connaître le nombre de combinaison de k éléments possible. On ne tient pas compte de l'ordre des éléments.

Répétition	Avec (gamma)	Sans
------------	--------------	------

Formule	$\Gamma_n^k = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$	$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
---------	--	--

Objectifs

La génétique des populations s'intéresse à l'histoire des populations. En comprenant leur dynamique passée, on peut prévoir leur évolution future.

Par exemple, c'est utile pour anticiper les pertes de diversité génétique et prévenir les risques liés à la consanguinité en organisant par exemple des réintroductions pour maintenir un certain niveau de diversité génétique dans une population.

Estimation de la fréquence des différents allèles présent dans la population

La reproduction asexuée la variation génétique entre les individus d'une population est brassage génétique

Crossover	Assortiment des chromosomes	Fécondation
Entre les séquences de	Entre les chromosomes	La rencontre entre les deux parents

La population correspond à l'ensemble des allèles.

Ens. des allèles d'un gène	A	a		Total
Fréquence à t	P_n	Q_n		100%

Zygotes formés	AA	Aa	aa	
Fréquence des	P_n^2	$2P_nQ_n$	Q_n^2	100%
Allèles	A	a		
Fréq t+1	$P_n^2 + P_nQ_n = P_n(P_n + Q_n)$	$Q_n^2 + P_nQ_n$		100%

Attention pour une population N d'individus diploïdes, l'ensemble des allèles 2N.

Population allélique = fréquence allélique.

Exemple : pour une population avec N individus de phénotype et avec comme allèle possible A et B, la fréquence allélique de A : $f(A)$

Point méthode : calcul des fréquences alléliques				
Génotype	AA	AB	BB	TOTAL
Eff	35	40	25	100

Calcul des fréquences alléliques :

$$Freq(A) = \frac{2n_{AA} + n_{AB}}{2N} = \frac{2 \times 35 + 40}{200} = 0,55$$

L'équilibre

L'équilibre est stable si l'état des paramètres n'évolue plus. Les fréquences alléliques sont constantes. à chaque génération on retrouve les fréquences de départ des allèles, ce qui correspond mathématiquement à : $\Delta P = P_{n+1} - P_n = 0$

Rmq : généralement une population est à l'équilibre uniquement sur certains gènes précis.

Cela stipule qu'une recombinaison allélique et la ségrégation mendélienne est indépendante. Un allèle a une chance identique d'être présent à la génération suivante.

Dans la réalité, il existe de multiples causes qui peuvent modifier les fréquences alléliques d'une génération à l'autre :

- Les mutations dans les cellules germinales (gamètes).
- La dérive génétique. Cela correspond au « tirage au sort » lors de la formation des gamètes qui peut ne pas être représentatif de la population.
- Lorsque la rencontre entre les deux gamètes n'est pas aléatoire.
- Des différences de taux de survie et de fécondité en fonction des allèles. C'est ce que l'on appelle la valeur sélective.
- Les migrations avec des fréquences alléliques différentes de la population étudiée.

Distorsion de ségrégation miotique : groupe de gènes souvent situé sur le même chromosome, est transmis et confère un

Par exemple, l'absence de ce groupe entraîne la mortalité du gamète.

Hypothèse de

Dans le cas où le phénotype intermédiaire n'existe pas, on peut faire calculer les fréquences alléliques en faisant l'hypothèse que la population est à l'équilibre. Ainsi,

Vérifier si une population est à l'équilibre

- Calculer les effectifs théoriques
- Comparer les résultats attendus avec les fréquences réelles.

$$\chi^2 = \sum \frac{(eff\ théor. - eff\ obser)^2}{eff\ théor}$$

- Pour cela on utilise un test statistique :
- H_0 : les résultats théoriques sont conformes à ce obtenu.
- H_1 : les résultats théoriques ne sont pas conformes à ce obtenu.

Utilisation du test du Khi-2 :

- Le degré de liberté : nombre de paramètres indépendants.
- α le taux d'erreur accepté : probabilité de rejeter H_0 alors que c'est vrai.
- β probabilité d'accepter H_0 alors que c'est faux.

Si $\chi^2 < \chi^2(\alpha)$, on dira alors que l'on ne rejette pas H_0 . La population est à l'équilibre.

Rmq : Généralement, on calcule à partir des fréquences alléliques observées les phénotypes théoriques à obtenir si la population est à l'équilibre. On vérifie ensuite que la conformité des résultats en utilisant le test du Khi-2.

Mutation

On parle notamment du taux de mutation par gamète et par génération.

Pour un allèle A de fréquence P_n avec un taux de mutation U, sa fréquence à la génération suivante est : $P_{n+1} = P_n - uP_n$

Les mutations récurrentes influencent peu les fréquences alléliques seul mais comme ils sont toujours combiner avec d'autres facteurs évolutifs (environnement...) et créer la variabilité initiale.

Taux mutation reverse taux de mutation qui annule la mutation.

Le taux de mutation chez les Végétaux et les Animaux est d'environ 1 pour 100 000 gènes.

La dérive génétique

L'évolution aléatoire des fréquences alléliques au cours du temps fluctue aléatoirement et n'est pas prédictible.

Dérive génétique fluctuation aléatoire imprévisible des fréquences alléliques d'une génération à une autre.

Les effets de la dérive génétique sont particulièrement importants sur les populations avec de petits effectifs. Les effets fondateurs un petit groupe d'individus qui fonde une nouvelle population. L'effet de la dérive peut produire

Effet Goulot une catastrophe réduit radicalement la taille de la population.

Provoquer l'accumulation d'allèles néfaste pour la survie de la population.

Ces changements de fréquences ont un impact important sur les populations de faibles effectifs et particulièrement vulnérables à l'apparition de mutants même si elles sont rares.

Modèle stochastiques (tirage aléatoire)

Modélisé par la loi Binomiale de paramètre p et 2N

Bernoulli probabilité d'obtenir le nombre de succès k pour une expérience à deux issues (gagné et perdu) répété n fois de manière identique et indépendante.

$$P(x = i) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

La théorie neutraliste

La probabilité de substitution d'un allèle

On cherche à déterminer pour un individu quelqu'une à quelle fréquence il y a de posséder chaque type d'allèle.

- Déterminer les génotypes possibles.
- Dédurre les fréquences des allèles en utilisant le phénotype double récessif et les identités remarquables.

La dérive génétique entraine une diminution des allèles et donc de la variabilité génétique

Elle est d'autant plus rapide pour les populations de faibles effectifs.

Note des passages de goulots d'étranglement par exemple lors d'une catastrophe naturelle provoque une période avec une population avec un faible effectif.

Les rencontres non aléatoires entre les gamètes

On parlera de pangamie lorsque les gamètes se rencontrent au hasard (et de panmixie pour les rencontres entre les individus).

Les causes de croisements non-panmixie peuvent être dû à :

- Autofécondation
- Consanguinité (de choix, de position ou dû au faible effectif)

- Homogamie (et hétérogamie) c'est lorsqu'un individu a tendance à se reproduire avec un partenaire avec qui il partage le même phénotype.

L'autofécondation

À l'équilibre, on aura uniquement des homozygotes car même si l'individu est hétérozygote (Aa), ces descendants auront 50% de chances de conserver l'hétérozygote : $1 = \frac{1}{4}AA + \frac{1}{2}Aa + \frac{1}{4}aa$

La probabilité d'hétérozygote diminue de moitié à chaque génération : $H_{n+1} = 0,5.H_n$

Pour une population,

La perte des hétérozygotes est extrêmement rapide et tout le génome est concerné c'est-à-dire une modification des fréquences génotypiques.

$A_n = A_0 + H_0(1 - 0,5^n).0,5$	<p>A_0 fréq d'homozygote AA dans la population</p> <p>H_0 fréq d'hétérozygote Aa dans la population</p>
----------------------------------	---

Ainsi, sur le long terme (c'est-à-dire quand n tend vers l'infini), les fréquences alléliques ne changent pas.

Dans la Nature et notamment chez les plantes, il existe des mécanismes d'auto-incompatibilité qui permettent de prévenir en partie l'autofécondation.

Consanguinité

Les principales causes de consanguinité sont :

- Des facteurs culturels pour les hommes.
- L'absence de choix de partenaires les populations avec peu d'individus.

Un individu est autozygote s'il possède pour un gène deux allèles identiques issue d'un unique ancêtre.

Coefficient de parenté

Coefficient de consanguinité noté f_i issue d'un croisement de deux individus apparentés. C'est le pourcentage de gènes autozygote pour un individu.

Coefficient de parenté entre deux individus correspond au nombre de
À chaque génération, la 0,5

La sélection

- nombres moyens de descendants viables et fertiles.
 - Un taux de survie des reproducteurs qui varie en fonction du génotype.
 - Un taux de fécondité différent entre les génotypes.

Valeur sélective nombre moyen de descendants viables et fertiles laissés par cet individu.

Par convention, la valeur sélective maximale est 1.

$$\text{valeur sélective absolue} = \frac{\text{Nbre de descendants}}{\text{Fertilité}}$$

$$\text{valeur sélective relative} = \frac{\text{valeur sélective absolue}}{\text{valeur sélective absolue maximum}}$$

Altruisme et sélection parentèle

Migration

Flux génétique échange d'allèle entre les populations

Les flux génétiques peuvent empêcher les populations de s'adapter pleinement à un environnement en empêchant la sélection naturelle de s'exercer pleinement. L'arrivée d'allèles de populations étrangères peut empêcher la diminution de la fréquence allélique d'allèles désavantageux. Cela peut également être l'inverse, les flux génétiques peuvent permettre à des allèles de se répandre rapidement.

Les activités humaines ont rendu le flux génétique plus présent et courant qu'il ne l'était.

Le flux génétique tend à diminuer les différences génétiques entre les populations.

Valeur adaptative contribution d'un individu à la génération suivante en nombre de descendants. C'est le phénotype qui est soumis à la sélection et indirectement le génotype.

Trois types de sélection naturelle

Directionnelle favorise un extrême

Divergente ou disruptive favorise les extrêmes et désavantage le phénotype intermédiaire.

Stabilisante ou normalisant favorise le phénotype intermédiaire et empêche toute déviation de celui-ci désavantage toute variation.

Sélection sexuelle

Elle peut donner notamment à un dimorphisme

Intrasexuelle entre les individus du même sexe. Un mâle dispose d'un groupe de femelle. Parade lutte entre les sexes

Sélection intersexuelle sélection par un des sexes sur l'autre généralement la femelle.

Femelle préférence portait sur les caractères indicateurs de bons gènes.