

Homework 1 of Machine Learning

B01902032 江東峻

1. answer: a

(i) 和 (iii) 有明確的定義。

(v) 只要搜集足夠多的資料，也許可以找出最適合的年紀，或根本沒有關係。沒有關係。

2. answer: b

銷售數字上升或下降不一定代表推薦的好壞，但是銷售得好對於賣書來說算是一件好事，所以算是一種獎勵。

3. answer: c

用對老鼠實驗時，有很多變因被控制，對於某個要素去找出結果，因為老鼠數量不多，所以不能使用大量藥物來獲取大量的資料，所以是策略性的學習。

4. answer: d

沒有給定主題，只有分成幾堆。

5. answer: a

用以往的資料判斷有某些特質的人在借貸超過多少錢的狀況會不還錢，再把這些資料餵給演算法。

6. answer: d

假設4種情況帶入 $E_{OTS}(g,f)$ ：

N, L all even, $E_{OTS}=1/2$

N even, L odd, $E_{OTS}=(L-1)/2L$

N odd, L even, $E_{OTS}=1/2$

N, L all odd, $E_{OTS}=(L+1)/2L$

將4種情況帶入(a)(b)(c)(d)式，選擇結果與上述相符的。

7. answer: c

存在另一個 f' 可以"generate" D , 這個 f 在 $X_1 \sim X_N$ 裡都符合 $f'(X)=y_n = f(X)$, 但在 $X_{N+1} \sim X_{N+L}$ 裡就沒有限制，所以有 2^L 種可能。

8. answer: a c e

(a)(b): $E_{OTS} = k/L$ 意思是在 $X_{N+1} \sim X_{N+L}$ 裡，有 k 個 X 使得 $f(X) \neq g(X)$ ，有 $C(L, k)$ 種組合，在 $X_1 \sim X_N$ 裡， $f(X)$ 為 noiseless，所以只有 1 種組合， f 共有 $C(L, k)$ 種組合。

(c)(d): $E_{OTS}(g, f)$ 的期望值， $X_1 \sim X_N$ 都不影響 E_{OTS} (期望值=0)，在 $X_{N+1} \sim X_{N+L}$ 裡，每個 X 都有 $1/2$ 的機率使得 $f(X) \neq g(X)$ ，有 L 個 $X, f(X) \neq g(X)$ 的期望值 = $L/2$ ， E_{OTS} 的期望值 = $1/2$ 。

(e): A_1 產生 g_1 ， A_2 產生 g_2 ，對於每個 g 來說，因為 g 有任何可能，所以 $f(X) \neq g_1(X)$ 和 $f(X) \neq g_2(X)$ 的機率是一樣的，所以 $E_{OTS}(g, f)$ 的期望值都一樣。

9. answer: a

因為 $u = 0.5$ ， $v = u$ 的狀況發生在取樣取到剛好 5 個的狀況，
 $C(10, 5) * (1/2)^{10} = 0.246$

10. answer: b

因為 $u = 0.9$ ， $v = u$ 的狀況發生在取樣取到剛好 9 個的狀況，
 $C(10, 9) * (0.9)^9 * (0.1)^1 = 0.387$

11. answer: d

因為 $u = 0.9$ ， $v \leq 0.1$ 的狀況發生在取樣取到 1 個或 0 個的狀況，
 $C(10, 1) * (0.9)^1 * (0.1)^9 + C(10, 0) * (0.9)^0 * (0.1)^{10} = 9.1E-9$

12. answer: b

以 $\epsilon = 0.8$ ， $N = 10$ 代入 Hoeffding's Inequality
得 $P(v \leq 0.1) \leq 5.521E-6$ ， $(0.8+0.9 \leq v)$ 的狀況不存在

13. answer: b

4 種骰子中，只有 2 種有橘色的 1，所以每次拿到有橘色 1 的骰子的機率為 $1/2$ ，而骰子數量很多，所以每次拿到橘色 1 的機率都一樣，
為 $(1/2)^5 = 1/32$

14. answer: c

其中要有一個數字是同色的狀況只有 4 種組合，
(A,C) (B,C) (A,D) (B,D)

$(4 \text{ (4種只有單一種骰子的狀況)} + C(5, 1) + C(5, 2) + C(5, 3) + C(5, 4) \text{ (同時有兩種骰子的狀況)})$
 $* (1/4 \text{ (每個骰子有4種)})^5 = 124/1024 = 31/256$

15. answer: c
 16. answer: c
 17. answer: c
 18. answer: a
 19. answer: b
 20. answer: a

21. answer: No

根據lecture 2的第15, 16頁可知道：

A. linear separable $D \Rightarrow \exists w_f$ such that $\forall x_n \in X, y_n = \text{sign}(w_f^T x_n)$

$$\Rightarrow y_n(t) w_f^T x_n(t) \geq \min y_n w_f^T x_n > 0$$

$$\Rightarrow w_f^T w_{t+1} \geq w_f^T w_t + \min y_n w_f^T x_n > w_f^T w_t + 0$$

B. w_t changed only when mistake

$$\Rightarrow \text{sign}(w_t^T x_n(t)) \neq y_n(t) \Leftrightarrow y_n(t) w_t^T x_n(t) \leq 0$$

$$\Rightarrow \|w_{t+1}\|^2 \leq \|w_t\|^2 + \max \|x_n\|^2$$

用連加消去以及 $w_0 = 0$ 的條件可以得出：

$$C. w_f^T w_T \geq T * \min y_n w_f^T x_n > 0 \text{ (linear separable D)}$$

$$D. 0 \text{ (絕對值)} \leq \|w_T\|^2 \leq T * \max \|x_n\|^2 \Rightarrow 0 \leq \|w_T\| \leq \sqrt{T} * \max \|x_n\|$$

C/D 可得(當D不為0的狀況)：

$$w_f^T w_T / \|w_T\| \geq \sqrt{T} * \min y_n w_f^T x_n / \max \|x_n\|$$

(根據C, $w_T = 0 \Rightarrow \min y_n w_f^T x_n = 0$ 且 $w_f^T w_T = 0$, 符合上式 “=” 發生的情況)

同除 $\|w_f\|$ (D不為0)：

$$1_{(\text{向量內積})} \geq w_f^T w_T / (\|w_T\| * \|w_f\|) \geq \sqrt{T} * \min y_n w_f^T x_n / (\max \|x_n\| * \|w_f\|)$$

又 $R = \max \|x_n\|$, $\rho = \min y_n w_f^T x_n / \|w_f\|$

$$T \leq R^2 / \rho^2$$

當 x_n 變為 $1/10$ 時, R, ρ 都變為 $1/10$

$\Rightarrow T$ 的upper bound不變

實驗：

拿Problem 15的測資來跑，輸入測資後再將測資/10，結果總共更新了777次，是變慢。(閾值的影響力變大)

