

内科大全 病棟編 索引

英数字

- A-DROP 298
ACE阻害薬 389
AKI 497
AKIの危険 218
AKIの重症度 (KDIGO) 184
ALT 463
ALT/LDH比 <1.5 215
ARNI 382
aSSKINg 60
Blast (芽球) 167
B型肝炎の予防 545
B型肝炎の再活性化 518
B型肝炎の既往感染 135
B線 237
Ca 205
Caの測り方 205
Ca・Mg・Pの異常 205
CDI 243
CDIの検査 267
CDIの治療 (10日間) 268
CDI (初発・重症) 347
Child-Pugh分類 470
CKD患者の入院管理 429
CK上昇と横紋筋融解症 218
CK上昇の見方 218
COPD増悪 405
COVID-19 73、310、538
CO₂ナルコーシス 110
CRE 76
Crより先に変わる 271
CT 424
C型肝炎と梅毒 547
DAPTの期間 387
DESIGN-R®2020 63
DICの治療 180
DICの診断 179
DKA・HHS 477
DOACとワルファリン 146
DOACの用量 145
DVT 243、398
DVT用のWellsスコア 398
ERCP後膵炎 466
ESA 429
ESBL産生菌のリスク 317
FN 241
G-CSF 376、518
GBS ≤1点 447
GFR区分と蛋白尿区分 429
GLP-1受容体作動薬 34
Grade 1 523
Grade 2 523
Grade 3 522
Grade 4 523
H. pylori 446
HFimpEF 382
HFmrEF・HFrEF 383
HFrEF 381
HFrEFの基本薬 382
HIF-PH阻害薬 429
HIT 174
HITの疑い 177
HITの監視 46
HIVの予防内服 545
Hy's law 216
I-ROAD 305
IPC 43
Kとインスリン 479
Lightの基準 417
lung sliding 238
MASCCスコア 373
MCVによる貧血の分け方 168
MCVの目安 170

MCV・MCH・MCHC 167
MIC $\geq 16 \mu\text{g/mL}$ 319
MRSA 358
MSSA 360
MWSTとFTの採点 67
N95マスク 73
Na 354、477
Na/K比 >1 475
NEWS2 10、241
NPPV 405
NPPVの適応 110
NSAIDs 124、446、452
NSAIDsと β 遮断薬 413
NSAIDsと同等に効いた 507
NSAIDs・抗血栓薬 450
Oaklandスコア 453
OHスケール 61
P2Y12阻害薬 386
Paduaスコア 43
PCI後の主な合併症 388
PCI後の帰室時 387
pH・糖 417
PPI 348、447
PR間隔 366
PTH関連蛋白 502
PT・APTTのパターン 178
qSOFA 339
QTの測り方 231
QT延長 158
RDW 167
Ret (網赤血球) 167
Rockallスコア 447
ROXインデックス 108
SABA 411
SGLT2阻害薬 34、379、478
SOFAスコア 338
SRH 454
SSKIN 60
ST合剤 560
S状結腸憩室炎 (膿瘍合併) 530

S状結腸軸捻転 457
TG 463
TLSの診断規準 497
TMA (TTPなど) 176
VALUE 87
VTEのリスク 44
VTEの治療に使う抗凝固薬 400
VTE予防 46
VTE予防と尿道カテーテル 492
WPW症候群 230
 α -グルコシダーゼ阻害薬 29
 β ラクタムアレルギー 121
 β 遮断薬 379、389

あ行

うつ・せん妄 106
アクセス 434
アシクロビル 560
アスピリン 385
アセトアミノフェン 124、465
アセリオ 23
アドレナリン 412
アナフィラキシーの治療 291
アニオンギャップ 210
アミノグリコシド系 119、430
アミノフィリン 413
アミラーゼよりリパーゼ 463
アモキシシリン 559
アモキシシリン・クラブラン酸 560
アルコール多飲や低栄養 30、277
アルコール性 467
アルブミン 470
アルブミン製剤 141、442
アルブミン負荷 474
アンピシリン 559
アンピシリン・スルバクタム 559
イコデキストリン 439
イリノテカンの下痢 522
インスリン 477
インスリンの調整 15

インスリンの量と量り方 202
インスリンの開始量 113
インスリン後の低血糖 202
インフルエンザ 73、310、538
インフルエンザの抗ウイルス薬 311
インフルエンザ陽性 299
ウイルス 215
エコー 416、423
エダラボン 493
エプレレノンと腎機能 383
エリスロマイシン 447
オキサリプラチン 520
オセルタミビル 560
オピオイド 124、459、510
オピオイドと送風 510
オピオイドの副作用 127
オランザピン 520

か行

きざみ食 15、68
けいれん 492
カテーテルの閉塞 271
カテーテル関連 316
カテーテル関連と急性前立腺炎 319
カテーテル関連血流感染症 358
カルシウムの量 202
カルテ記載例 (PCI後) 387
カルテ記載例 (TLS予防) 499
カルテ記載例 (入院時) 300、307、
318、323、334、342、354、375、
381、408、413、448、455、461、
467、475、492
カルテ記載例 (退院時) 450
カルテ記載例 (麻薬の破損) 554
カルペリチド (ハンパ) 380
カンジダ 226
カンジダ血症 362
ガドリニウム造影剤 (MRI) 155
キノロン 317
キノロン系 298

クリップ 454
クレアチニン上昇と急性腎障害 183
クロザピン 36
グラム陰性桿菌 226
グラム陽性桿菌 228
グラム陽性球菌 (房状) 226
ゲンタマイシン 368
コードステータス 85

さ行

すぐ撮る 280
すぐ診に行くサイン 241、249、255、
266、271、276
せん妄 124、255、495
せん妄の予防 52
せん妄の予防策 53
せん妄の評価 54
せん妄の評価ツール 54
せん妄・不穏 255
せん妄予防 55
その他 469
サイトメガロウイルス 525
シスプラチン 520
シックデイ 478、489
シャントの感染 438
シャントの瘤 438
シャントの閉塞 438
シャント肢 435
ショック 372
ショック指数 453
ショック指数とHb 456
ジゴキシン 393
スタチン 387、492
ステップアップ・アプローチ 468
ステロイド 134、299、484、500
ステロイドと抗菌薬 409
ステロイドの長期投与 138
ステロイドカード 489
ステロイド誘発性 488
ステロイド開始時のチェック 135

ステロイド静注と効果の判定 526
ステントと放射線治療 501
ストレス潰瘍の予防 48
ストレス潰瘍予防 49
ストレス量の目安 487
スルホニル尿素 (SU) 薬 30
セファゾリン 559
セファレキシン 560
セフェピム 559
セフトジジム 559
セフメタゾール 559
セロトニン症候群 132

た行

たこつば症候群 386
とろみの3段階 69
タゾバクタム・ピペラシリン 559
ダイビング 428
ダプトマイシン 559
テイコプラニン 122
ディーブサルカスサイン 235
デキサメタゾン 310、351、500、520
デバイスの選び方 109
トラネキサム酸 181、448、455
トラマドールやりネゾリド 132
トルバプタン (サムスカ) 191
ドレナージ 332
ドレナージチューブ 335
ドレーンの管理 426
ドレーン管理と指示の記載例 420

な行

ニューモシスチス肺炎 444
ネフローゼ症候群 440

は行

ほかの感染症 308
ほかの薬 413
ほぼ同じ 265
バイタルサインの測定頻度 10

バラシクロビル 560
バルプロ酸 36
バンコマイシン 117、346、374
パターンの決め方 215
パターン別の主な原因 215
パルス療法 136
ヒドロコルチゾン 341、485
ビスホスホネート 70
ビタミンB1 15、102
ビタミンB12 167
ビタミンB12欠乏・葉酸欠乏 170
ビタミンK欠乏 178
ビブリオ・バルニフィカス 326
フェニトイン 36
フェノバルビタール 36
フェブキソスタット 498
フェンタニル 466
フルコナゾール 560
フロセミド 202
ブドウ球菌 365
ブドウ糖 479
ブルガダ症候群 232
ブレオマイシン 520
ブレードンスケール 61
プロバイオティクス 349
ヘパリン 385
ヘパリンの持続静注 147
ベズロトクスマブ 349
ベッドサイドのスクリーニング 67
ベッドサイドの超音波 237
ベッド上 69
ベンゾジアゼピン系 130、255
ベンゾジアゼピン系薬 512
ベンゾジアゼピン系 (長期) 35

ま行

まず確かめる 267
マクロライド系の併用 299
マグネシウム 196、479
メトトレキサート 34

メトホルミンとヨード造影剤 39
メトロニダゾール 346
メロペネム 559
モニター 392

や行

やめる 353
やめ方 133
よくある落とし穴 239
ヨード造影剤 154

ら行

ライン・チューブのトラブル 285
ラクツロース 473
ラスブリカーゼ 498
リスク因子の確認 52
リスク比1.10 260
リスク評価と外来治療の可否 373
リチウム 34
リファキシミン 474
リフィーディング症候群 102
リン 477
ループ利尿薬 442
ループ利尿薬に加える薬 381
レジオネラ 297
レボチロキシシン 37
レボドパの点滴 37
レボフロキサシン 559
レンサ球菌 365
ロケルマ 201
ロケルマの飲み合わせ 202

わ行

ワルファリン 36、146

漢字

>10万/ μ L 167
>13 mEq/gCr 198
 ≤ 0.1 g/kg/時 104
 ≤ 8 点 453

≥ 3 cmH₂O 110
 ≥ 3 点 158
 ≥ 6 点 218
一般病床と精神病床の違い 83
上大静脈症候群 497
上部消化管出血 446
下げる速さ 194、482
下剤と浣腸 459
下剤の使い分け 27
下大静脈 237
下大静脈フィルター 403
下気道の検体 311
下痢 28、266
下痢と口内炎 522
下肢 398
下肢の深部静脈血栓症 239
下腹部の痛みと膨満 272
下部消化管出血 452
不眠 22、261
不眠（環境による入眠困難） 264
不眠（睡眠薬の見直し） 133
不穏・せん妄 25
不穏時に使う抗精神病薬 26
不足の見きわめ 100
不顕性誤嚥 66
中央値84日と82日 422
中心静脈カテーテル 285
中止後の再発熱 376
中等症II以上 312
主なステロイドの換算 134
主な所見 234
主な輸血副反応と対応 142
主治医意見書 163
主要な抗菌薬 118
乳酸 210、338
予定の再内視鏡 449
予後因子 464
予想される経過 515
予測 459
予防の対象 48

予防の方法 155
予防の期間 45
予防投与 376、472
予防法の選び方 43
予防的な全量の抗凝固 443
予防策 57
予防量の未分画ヘパリン 313
二次予防の薬 389
二次性の検索 441
二相性反応 292
人生会議 86
介助 68
介護保険 161
付ける理由と外す条件 17
仙骨部褥瘡 65
代償の予測 210
代謝性アシドーシス 210、432
代謝性アルカローシス 210
伝える 92
低Ca血症 220、497
低K血症 196、526
低Mg血症 523
低Na血症 188、470
低Na血症と栄養 474
低カリウム血症 196
低カルシウム血症 207
低ナトリウム血症 188
低マグネシウム血症 207
低リン血症 169、208
低栄養 102
低活動型せん妄 54
低血糖 25、484
低血糖の治療 276
低血糖・高血糖 276
体位 82、513
体位変換とずれの予防 61
体圧分散マットレスの選び方 61
体液再分布型 378
体液貯留型 378
体液量と血圧 183
体液量の評価 273
体温・酸素 491
体重 378
体重と尿量 379、430
併用 360
併用禁忌 263、547
使い方 459
使い残し 553
使う 141
使う前 130
使う薬 50
例外 252
依頼 91
依頼の目安 68
侵襲性肺炎球菌感染症の届出 543
便秘栓 268
便秘 25、124、266、520
便秘・嘔気 106
保管 551
保管と帳簿 553
個人防護具 72
個別に決める治療 88
側臥位 61
偽性血小板減少 174
偽性高K血症の除外 200
偽痛風 504
免疫抑制療法と副作用の予防 443
免疫抑制療法の概略 443
免疫調整薬 312
免疫関連有害事象 522
入れた後 287
入れる場所 425
入院48時間以内 106
入院中に使う睡眠薬 25
入院中に始めた薬 433
入院中に始める心不全の薬 382
入院中の発熱 241
入院中の目標血糖 112
入院中の管理 354
入院中の落とし穴 148

入院中の血糖管理 112
入院後の発症 453
入院日に確かめる 41
入院時に出す検査 297
入院時の体液と食事 430
入院時の全身管理 491
入院時の検査と腎生検 441
入院時の評価 470
入院時指示 10
全員に行う予防 443
全数把握 538
全身 508
全身性ステロイド 406、412
全身状態 375
共通 436
内服 170、434
内服の心拍数調節薬 393
内服薬 459
内服薬の扱い 15
内視鏡 446
内視鏡と婦人科処置の前 439
内視鏡のタイミング 447
内視鏡的結紮術 454
円柱と細胞 222
再出血の徴候 449
再発 399、443、460、527
再発の治療 348
再発予防 349
再膨張性肺水腫 416、425
凝固 446
凝固異常とDIC 178
処方 476
処方と外来 483
処方の例 496
処方カスケード 40
処置の合併症 335
出す検査 297
出血 174、392、398
出血と抗凝固 439
出血のリスク 44
出血リスクと抗血小板薬の併用 395
出血性胃潰瘍（退院時） 450
分子標的薬の副作用 523
分岐鎖アミノ酸 474
切り替え 401
切る前 91
初回 380
初回25～30 mg/kg 341
初回の再発 348
初期の抗菌薬 352、374
初期対応と相談 63
初期治療の選び方 299、317
判定 110、380
別の診断 336、355
利尿薬 471
利尿薬の使い方 380
制吐薬 26
前処置 454
前壁STEMI（PCI後） 387
剤形 70
副腎クリーゼ 484
副腎クリーゼ疑い 485
副腎不全 484
副腎不全の主な原因 486
副腎皮質機能の検査 487
劇症 525
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 326
力価の換算 134
労災保険の手続き 549
効果の見方 363
化膿性屈筋腱腱鞘炎 329
化膿性関節炎 504
化膿性関節炎の治療 506
医原性気胸 423
医療事故調査制度 534
医療保険と介護保険 163
医療用麻薬の取り扱い 551
医療費の助成 528
医療関連機器褥瘡 62
半年 302

危険な徐脈 230
原因ごとの対応 262
原因ごとの治療 190
原因の見分け方 174
原因の除去 220
原因不明のまま解熱した 376
原疾患と体液量 429
原発性 484
原発性・続発性 489
原発性自然気胸 423
反応あり 380
反応なし 380
口と歯 106
口内炎 518
口腔ケア 66、306、522
口腔内崩壊錠 (OD錠) 70
可能性 367
右下肺野の浸潤影 236
右下腿の蜂窩織炎 323
右原発性自然気胸 426
右室の拡大 239
右腎盂腎炎 318
右膝の化膿性関節炎 507
合併と原因 337
合併症 302、308、333
合併症と手術の相談 369
同室の患者 314
名乗りと緊急度 92
向精神薬・覚醒剤原料との違い 556
否定的 367
吸入 405
吸入の道具 411
吸入ステロイド (ICS) 411
吸入手技 409、415
吸引 514
味とにおい 106
呼吸 435
呼吸と嘔吐 82
呼吸と循環 399
呼吸リハビリテーション 408

呼吸器外科 419
呼吸困難 510
呼吸困難の原因 239
呼吸性の異常 212
呼吸性アシドーシス 210
呼吸抑制 124
呼吸数 11
咳エチケット 72
問題名 93
喉頭摘出後 (永久気管孔) 286
喘息発作 410
喘息発作 (中等度) 413
嘔気 124
嘔気・嘔吐 26、266
器質的な閉塞に禁忌 267
嚥下 103
嚥下と栄養 491
嚥下のスクリーニング 67
嚥下内視鏡検査 68
嚥下評価と誤嚥の予防 66
嚥下造影検査 68
嚥下障害の疑い 71
回復 478
回復の判定 481
回数と曜日 35
回診のたびに見直し 20
在宅酸素療法 409
培養 117、334、372
培養と抗菌薬 334
基礎疾患 178
報告・相談・記録・病状説明 91
場所 354
場面ごとの予防法 43
塞栓 365、392
塞栓症 365
塩分 379、442、472
塩分制限とスピロノラクトン 472
塩化カリウム (KCl) 196
増悪因子 415
増量の速さ 383

壊死性軟部組織感染症 322
外来 378、405、410、429、445、447
外来の管理目標 434
多因子の予防策 52
夜のうちに悪くなる目安 293
大腸内視鏡 454、530
大腸憩室出血の止血と再出血 454
大腸憩室炎 525
大腸癌 457
大腸閉塞 457
大腿骨近位部骨折 281
大量穿刺排液 473
大量補液 498
太さ 425
失禁 60
好中球の増加 171
好中球数 166
好酸球 167
好酸球の増加 171
妊娠・授乳 547
妊婦に禁忌 320
始めた後の落とし穴 136
始めるコード 69
始め方 395
姿勢 66
嫌気性菌 117、305
安全三角 425
安静 442
安静度 10、401、500
安静度と離床 491
定点把握 538
定義と重症度 184
家族に伝える 533
家族のつらさ 510
家族等 85
対応の原則 523
対象 162、515
導尿の後 272
尿のアルカリ化 498
尿のグラム染色 316

尿培養 316
尿検査 183、221
尿毒症 183
尿毒症の症状 436
尿浸透圧による原因の見分け方 195
尿細管性アシドーシス 211
尿路感染症 241、316
尿路感染症の分類 316
尿道カテーテル 18、288
尿道カテーテルの適応 18
尿酸降下薬 505
尿量 184
尿量の急な増加 488
尿量低下・尿閉 271
尿閉 271
届け出る手順 541
届出 354
左室流出路狭窄 386
左方移動 170
市中発症 419
市中肺炎 297
帳簿 553
平均4倍 428
平均約50% (10~90%) 379
底付きの確認 61
延長のパターンと主な原因 178
延長投与 341
引き継ぎ 91
強心薬 378
弾性ストッキング 43
形と環境 106
後天性血友病 178
徐脈と頻脈 232
循環 325
循環と呼吸 402
循環と神経 82
循環器内科に伝える情報 385
循環血液量の減少 97
微小変化型の約3人に1人 443
微熱と傾眠だけ 351

心エコー 358、366
心エコーの感度 366
心不全 234、365、378
心不全による胸水 418
心不全の偽滲出液 417
心不全の悪化 313
心不全・COPDとの区別 411
心嚢液と左の胸水 239
心尖部の血栓 386
心房細動 392
心房細動（初発） 396
心房細動（抗凝固薬の量） 151
心拍数と症状 396
心拍数調節 393
心理・社会的な条件 373
心疾患 438
心疾患や誤嚥による 411
心臓 237、365
心臓の超音波 238
心臓リハビリテーション 384
心電図 230
心電図とK 436
心電図モニター 387
必ずブドウ糖 29
必要量 102
急性ジストニア 132
急性低酸素性呼吸不全（肺炎） 111
急性冠症候群 385
急性前立腺炎 319
急性単関節炎 504
急性単関節炎の鑑別 504
急性呼吸器感染症 542
急性増悪 303
急性期DIC診断基準 180
急性胆嚢炎 331
急性胆嚢炎の方針（TG18） 333
急性胆嚢炎（胆嚢結石） 335
急性胆管炎のドレナージ 332
急性胆管炎（総胆管結石） 334
急性腎障害 183、440
急性腎障害と肝腎症候群 474
急性膀胱炎 463
急性膀胱炎の局所合併症 468
急速進行性糸球体腎炎の疑い 224
患者の背景による差し替え 30
患者の自己管理 553
悪い知らせ 94
悪寒戦慄 241
悪心・嘔吐の予防と治療 520
悪性症候群 132
悪性胸水 416
悪性胸水（胸膜癒着術） 421
悪性腫瘍に伴う脊髄圧迫 499
意思 434
意思決定能力 86
意識の低下と徐脈 250
意識の変化やふらつきだけ 276
感染対策 349
感染対策と食事 376
感染巣 117、356
感染性心内膜炎 365
感染性脳動脈瘤 370
感染性膀胱壊死 468
感染源 338
感染源と抗菌薬 343
感染源の検索と制御 340
感染症 440
感染症以外 344
感染症型 180
感染症法に基づく届出 538
感染経路別予防策 72
慢性B型肝炎のある人 547
慢性の高K血症 436
成人の44～51% 351
成人の初期抗菌薬 352
所見から考える原因 418
手技・手術の前 145
手指衛生 349
手術 145、363
手術の日から数え直す 368

手術部位感染 327
手順 423
投与期間 120
投与経路 103
投与量 140、320
抗コリン作用のある薬 459
抗コリン薬 513
抗体の結果 175
抗凝固 312
抗凝固療法（敗血症性DIC） 180
抗凝固薬どうしの切り替え 148
抗凝固薬の前に保存 399
抗凝固薬の選び方 400
抗凝固薬・抗血小板薬 145
抗原と核酸増幅検査 310
抗原定性検査 311
抗真菌薬 376
抗精神病薬 130
抗菌薬 297、323、331、338、345、
351、359、365、405、413、419、
448、466、472
抗菌薬とPPIの見直し 349
抗菌薬と食事 529
抗菌薬の中止 376
抗菌薬の使用 243
抗菌薬の投与期間（TG18） 336
抗菌薬の腎機能別用量表 559
抗菌薬の選び方 305、323
抗菌薬（総論と主要薬剤） 117
抗血小板薬 145
抗血小板薬2剤併用 492
抗血栓療法 386
抗血栓薬 40、446、452
抗血栓薬と血小板 416
抗血栓薬の再開 494
抜いた後 18
抜くと高血糖になり 278
抜けた 285、423
抜去 425
拘束中の観察 82
拮抗薬（電子添文による） 149
拾い上げ 338
持効性注射剤 34
持参した麻薬 555
持参の β 遮断薬 406
持参薬 155、379、429
持参薬の扱い 34
持参薬の継続と中止 42
持続性 392
持続的深い鎮静 515
持続静注 33、249
指先の感染 328
指示とカルテの記載例 247、279、
283、290、294
指示の例 142、186
指示の記載例 20、42、46、51、54、
58、64、71、77、101、111、116、
122、128、236、315、425、461、
516、524、529
指示の記載例（入院時） 480
挿管 411
排尿・便秘 494
排泄 56
排液量 416
採り方 225
採り直す場面 227
採る場面 225
採血 244、429、485
採血と培養 324
採血と診察 454
接続と吸引 425
接触から72時間以内 314
接触者の予防投与 354
接触者健診 542
撮り方と頻度 236
撮影条件 234
放射線治療と手術 500
救急外来の発熱 246
敗血症 316、338
敗血症と発熱性好中球減少症 241

敗血症性DIC 180
敗血症（左腎盂腎炎） 342
数え方 368
数日以内 136
新しく出た心房細動 233
新たな院内感染 343
新鮮凍結血漿 141
方法 67、72、515
日々の診療録 93
早期発見 494
早期離床と積極的な運動 43
早発型 519
時刻 261
普段のCr 429
曝露した人 545
曝露後予防内服 546
曝露源の患者 545
最初の1時間 351
最初の一文 91
最大2回繰り返す 188
最後の手段 258
最終透析と体重 436
最長6か月 163
月1回 135
月経と重なる気胸 427
有効期間 551
服薬 379
未分画ヘパリンの皮下注 43
末梢静脈路 17、288
栄養 60、186、465、474
栄養の評価 102
栄養管理 102
核酸増幅検査 310
核酸増幅法 76
植込み型除細動器 511
検査の読み方 345
検査の順番 454
業務上の負傷 549
標準予防策 72
標準予防策と手指衛生 72
横紋筋融解症 218
横隔膜下の遊離ガス 234
欠乏の補正 100
次の治療に備える 526
止めた薬 429
止めると危険な薬 35
止める状況と再開の目安 38
止める目安と減らす速さ 472
止痢薬 268
止血の後 456
止血後3日以内に多く 449
正しく測り直し 249
正しく測り直す 250
正常血糖DKA 478
歯科 70
死亡の原因欄 535
死亡確認 532
死亡確認と死亡診断書 532
死亡確認の手順 532
死亡診断書の書き方 534
死前喘鳴 510
毎日 131、368
毎日の見直しと解除 82
毎日見直す項目 20
気管切開チューブ 285
気管支拡張薬 406
気胸 234、423
水の不足（高ナトリウム血症） 100
水分ととろみ 69
水溶性造影剤 459
水腎症 239
汎血球減少の原因 172
汚染菌の判断 226
治療の選び方 424
治療後2週間前後に多い 349
治療後の監視 204
治療抵抗性 515
治療期間 297、318、403
治療期間と退院 361
注射のハロペリドール 258

洞調律に戻す前後の抗凝固 394
浮腫の治療 442
消化管出血後の貧血 143
消化管閉塞に禁忌 459
淋菌 504
深い褥瘡に使う主な外用薬 64
深部損傷褥瘡 63
深部静脈血栓症・肺塞栓症 398
減らす手順 159
減圧 457
測定のと落とし穴 277
湿性嘔声 66
湿潤 60
準備 94
溢水 183
溶血 166
漏れた薬ごとの対応 289
潰瘍性大腸炎 525
潰瘍性大腸炎の臨床的重症度 525
灌流 339
炎症性腸疾患と大腸憩室炎 525
炭酸水素ナトリウム 212
点滴中の紅潮 293
点滴静注 22
無気肺 234
無症候性細菌尿 223、316
無石胆嚢炎 331
熱と菌血症 365
特別訪問看護指示書 163
狭域化 120、307、319
狭域化と期間 419
理学的予防 44
理解 86
環境 56、345
生検 363
用量と副作用 327
甲状腺ホルモン 488
申請 161
画像 244、324、398
留置より間欠導尿 272
留置物の位置 235
異動・退職 551
異常Q波 230
疑う 359
疑う場面 75、365
疑う所見 322、351
疾患と治療 373
病原体 298
病型の評価 490
病態ごとの降圧目標 252
病状説明 91
症状から始める予防策 74
痛み 106、500
痛みと食事 522
痛み（最後の数日） 512
痛風・偽痛風 509
痛風発作 504
痛風発作の治療薬（成人） 507
瘻孔・狭窄 528
癒着性小腸閉塞 458
発作性 392
発熱と疼痛 22
発熱性好中球減少症 372
発症24時間以降に再開 491
発症48時間以内 490
発赤の見分け方 63
白血球の異常 166
皮下輸液 514
皮膚 81、339
皮膚・眼の所見 365
監視 219、479
目標 511
目標SpO₂ 108
目標と測定 112
目標のPT-INR 147
直後の処置 544
直接優位 215
相互作用 147
相応性 515
眠気 124

睡眠薬 130
睡眠薬・抗精神病薬 130
短時間作用性抗コリン薬 406、411
破損 551
硝酸薬 380
硫酸マグネシウム 413
確かめる 91
確診 367
神経症状 359、499
禁煙 428
禁煙とワクチン 409
禁酒と外来 476
穿刺から整形外科に任せる 506
穿刺の繰り返し 420
穿刺吸引 424
穿刺後1時間以内 416
穿刺部 386
穿刺部位 423
穿孔 526
立位のPA 236
簡易酸素マスクに替える 109
精神病床との違い 83
糖尿病の患者 460
糞便移植 349
糸球体性 221
約15% 365
約3か月続ける 169
紅斑の見かけ 326
紛失 551
細胞外液の不足 100
細胞診・ADA 417
細菌以外 344
細菌性肺炎の合併と誤嚥 313
細菌性髄膜炎 351
終末期のせん妄 513
終末期の症状緩和 510
組み合わせ 458
経カテーテル動脈塞栓術 456
経口 102
経口薬 249
経口鉄剤 168
経管栄養 66、266
経腸栄養 103
経腸栄養と静脈栄養 107
経過観察 424
経過観察の予定 548
経鼻胃管 287、446
経鼻胃管の自己抜去 290
結核 72、528
結核と診断した後の主な手続き 541
結核性胸膜炎 417
統合失調症のある患者 41
続発性 484
続発性自然気胸 423
維持液 (3号液) 98
維持療法 409
維持輸液 15、98
緊張性気胸 423
緊急時 140
総胆管結石 331
線溶亢進型のDIC 180
繰り返す誤嚥と治療のゴール 308
耐性菌 73、299、316
耐性菌と真菌のリスク 341
職員 314
肋骨 281
肛門病変 527
肝性脳症 470
肝硬変 470
肝移植 474
肝胆道系酵素の上昇 214
肝腎症候群 474
肝膿瘍 332
肺の超音波 238
肺塞栓症 232、313
肺塞栓症 (中 [高] リスク) 402
肺外の感染巣 302
肺外結核 76
肺水腫 435、482
肺炎 235

肺炎・尿路感染 494
肺炎後の退院準備 164
肺炎随伴性胸水・膿胸 418
肺結核の届出 543
肺結核の疑い（空気を防策） 78
胃瘕 285
胆嚢結石のある胆管炎 337
胆石性 463
胆石性膵炎とERCP 466
胆管炎・胆嚢炎 331
背抜き 62
背骨 280
胸水 234、416
胸水の検査 417
胸痛の訴え 233
胸腔ドレナージ 424
胸腔ドレーン 285
胸腔内線維素溶解療法 419
胸膜癒着術 420
胸部X線 234、424
脂質異常 440
脂質異常症 440
脱水 183
脳卒中後うつ 494
脳卒中急性期の内科管理 490
脳梗塞の急性期に使う抗血栓薬 493
脳梗塞の抗血栓療法とスタチン 492
腎・膀胱エコー 185
腎性貧血 168、432
腎機能 44、505
腎機能とK 383
腎機能と併用薬 402
腎機能の指標 152
腎機能・肝機能 547
腎生検 151
腎生検と治療の準備 441
腎盂腎炎 91、118
腫瘍崩壊症候群 497
腰椎穿刺の後 13
腸球菌 365
腸管壁の造影不良 458
腸閉塞 457、527
腸間膜の液体貯留 458
腹水 239
腹水に使う利尿薬（成人） 473
腹水の治療 472
腹腔内膿瘍・瘻孔 527
腹膜炎 439
腹膜透析の患者 439
腹部エコー 214
腹部・泌尿器 239
腹部大動脈瘤 239
膀胱 237
膿瘍 525
膿瘍の有無と切開排膿 323
膿胸 416
膿胸（胸腔ドレナージ） 421
臓器障害 338
臓器障害の症状 249
臨床的安定の基準 300
自宅以外の主な行き先 162
自己免疫 215
自己抜去・事故抜去 286
自由水の不足量と補い方 193
致死的な発作の危険因子 411
菌と薬 308
葉酸 167
薬ごとに二つの問いに答える 34
薬ごとの代表的な副作用 520
薬とコース 518
薬と量 521、529
薬と電解質の見直し 457
薬の影響 313
薬の注意 443
薬の用量と避ける薬 436
薬の見直し 185、306
薬の選び方 346
薬剤 353
薬剤性 177
薬剤性の無顆粒球症 171

薬剤性肝障害 216
薬剤熱 243
薬物予防 43
薬物予防との併用 45
薬物療法との順序 420
薬疹とアナフィラキシー 291
薬疹の疑い（セファゾリン） 295
蘇生輸液 97
虚血性大腸炎 452
虚血肝 214
蛋白 471
蛋白制限食にせず 430
蛋白尿 221
血便 452
血圧 183、490
血圧上昇 28、249
血小板 401
血小板とHb 375
血小板減少 174
血小板減少の主な原因 174
血小板濃厚液 140
血小板輸血のトリガー値 140
血尿 221
血栓 481
血栓の予防 526
血栓性素因 399
血栓溶解療法 399
血栓症の予防 442
血液 216
血液ガスと酸塩基平衡 210
血液培養 225、241、365、372
血液培養2セット 316、339
血液培養と最初の検査 365
血液曝露 544
血液検査 185
血算 372
血算の読み方と貧血 166
血管作動薬 448
血管外漏出 285
血管外漏出と曝露対策 524

血管拡張薬と強心薬 380
血糖 342、444、490
血糖 <70 mg/dL 255
血糖とSpO₂ 255
行動計画 415
術後 244
術後30日以内 327
表明 86
補充療法 180
補助の薬 292
補助療法 341
補正インスリン 113
製剤 97
製剤と体液の分布 98
褐色尿 218
褥瘡の予防 60
褥瘡ハイリスク項目 61
褥瘡予防 64
要件 510
見分ける 303
規格 35
解熱 339
解熱薬 245
解除 72、347
計画の書き直し 93
記録と連絡 541
訪問看護 161
訪問看護と訪問診療 163
訪問診療 161
設定（COPD増悪） 110
診に行くサイン 261
診察 372、458、466、488
診察と検査 335
診断した日に始め 312
診断とリスク評価 497
診断と入院の適応 322
診断と原因 440
診断と培養 297
診断と成因 463
診断と拾い上げ 338

診断と最初の1時間 372
診断と病型 378
診断と発症の時刻 392
診断と重症度 304、331、477
診断の落とし穴 332
診断名 94
診断基準 179、366
診断基準 (TG18) 331
診療情報提供書に入れる項目 163
診療録 552
試験紙の読み方 221
試験紙の項目と注意 221
話し合いの流れ 86
話し合いの進め方 86
認定 163
認識 86
誘因 484
誘因の除去とラクツロース 473
誤嚥の予防 459
誤嚥性肺炎 304
誤嚥性肺炎や心不全の合併 310
誤嚥性肺炎・院内肺炎 304
誤嚥性肺臓炎 304
誤嚥性肺臓炎と誤嚥性肺炎 304
読む順番 234
読んだ順にカルテに書く 230
調節型鎮静 515
論理的思考 86
負荷の時期 386
貧血の分け方 168
赤血球 ≥ 5 個/HPF 222
赤血球液 139
起立性低血圧の測り方 57
身体拘束 57、79、255
身体拘束にあたる行為 79
身体拘束（翌朝の見直し） 84
身体的リスク 373
転倒した後 58
転倒と持参薬 160
転倒の後に探す原因 282
転倒・転落の予防 56
転倒・転落の後 280
転移性脊髄圧迫の疑い 501
転院 496
軽症・中等症I 312
輸液 97、218、338、430、435、
458、464、478、484、511
輸液と栄養 526
輸血 166、342、446、455
輸血と抗血栓薬 455
輸血と輸血副反応 139
輸血の手順 141
輸血前の予防投薬 142
輸血副反応 139
退院と紹介状 390
退院の基準 421
退院の基準とワクチン 314
退院の基準と再発予防 329、468
退院の基準と外来 445
退院の基準と後遺症 356
退院の基準と退院後 344、397
退院の基準と退院時 409、414、433
退院の準備 161
退院・転院と二次予防 496
退院処方 162
退院処方の照合 162
退院時 94、439
退院時の処方と日数制限 555
退院時の降圧薬 253
退院時要約 94
透析 499
透析の予定と体重 435
透析の見合わせ 88
透析中の低血圧 438
透析患者 147、395、478
透析患者に多い問題 438
透析患者の入院管理 434
透析用カテーテル 438
透析開始時に回路から採り 435
速さ 252

速度と量 140
造影CT 452
造影CT Grade 464
造影剤と腎排泄の薬 430
造影剤腎症の予防 155
連絡の仕方 515
週1～2回 368
遅発型 519
運転 496
過去の投与歴 518
過敏反応 519
選び方 257
選ぶ薬 263
避ける薬 466、476、525
配合剤 34
酵母様真菌 226
酸化マグネシウムとセンナ 268
酸塩基平衡異常の主な原因 211
酸素 405、411
酸素と気管支拡張薬 411
酸素と送風 512
酸素化の評価 210
酸素投与 11
酸素療法と呼吸補助 108
重い代謝性アシドーシス 183、436
重くなる虚血性大腸炎 453
重さの判断と鑑別 405
重炭酸 479
重症の患者 19
重症の薬疹 291
重症度 117、188、304、470
重症度と入院の判断 447、453
重症度と合併症 441
重症度と呼吸停止の前触れ 410
重症度と治療の場 298
重症度と緊急度 200
重症度の判定 346
重症度の目安 346
重症度判定基準 (TG18) 332
重複 35
量と入れ方 120
針刺し・血液曝露 544
針刺し(血液曝露) 550
鉄欠乏 166
鉄欠乏性貧血 166
鉄欠乏性貧血の治療 168
鎮痛 458
鎮痛と薬剤 465
鎮痛薬 124
鎮静 510
鎮静薬 413
長引く低血糖 277
長径 >5 cm か多房性 337
長時間作用性の吸入薬 406
長期投与 134
長期管理薬 414
閉塞と尿閉 272
閉塞と膿瘍 318
閉塞後利尿 272
間接優位 215
間隔の目安 230
間隔の目安と主な異常 230
関節 504
関節の洗浄・ドレナージ 506
関節穿刺と血液培養 505
閾値と吸収 379
院内感染対策 72
院内発症 419
院内肺炎 304
院内肺炎・医療・介護関連肺炎 305
陽イオン交換樹脂 203
陽性尤度比7.5 446
随時尿に足せる検査 223
離床 379、387、409、509
離床センサー 57
電子添文との関係 202
電極の付け違い 230
電解質 457
電解質と酸塩基の異常 431
電解質異常の心電図 232

静かなせん妄 257
静注 22
静注薬 249
静注鉄剤 169
静脈の温存 430
静脈栄養 103
非代償性肝硬変（腹水） 475
非侵襲的陽圧換気（NPPV） 110
非弁膜症性心房細動の抗凝固 394
非糸球体性 221
非薬物的な予防策 52
頓用指示 22
頭側挙上 62
頭蓋内の合併症 356
頭部CT 280
頭部MRI 369
頸椎 280
頰脈 231
顔と気切孔の両方 285
飛沫予防策 354
飛行機 426
食事 10、147、306、374、379、
430、435、456、529
食事とPPI 449
食事と尿道カテーテル 387
食事の再開 461
食事の姿勢と介助 69
食形態 15
食後 66
飲み方 70
骨突出部 60
骨粗鬆症 134
骨髓抑制の底 518
髄液所見の目安 352

髄液検査の読み方 352
高Ca血症 205
高K血症 183、200、431、435、482、
497
高K血症の治療 201
高Na血症 193
高P血症 499
高TG血症 463
高カリウム血症 200
高カルシウム血症 205
高ナトリウム血症 193
高マグネシウム血症 208
高リスク肺塞栓症 399
高リン血症 208、432
高度リスク 371
高流量鼻カニュラ（HFNC） 109
高血圧切迫症 251
高血圧緊急症 249
高血糖 29、276
高血糖・高浸透圧 477
高齢の入院患者 19
高齢者の処方と減薬 157
高齢者の皮質下出血に限り 494
麻疹・水痘 73
麻痺性イレウス 457
麻薬の破損 554
麻薬中毒者の届出 554
麻薬処方箋の書き方 552
麻薬処方箋の記載事項 552
麻薬施用者免許 551
黄疸 215
黄色ブドウ球菌 226
黄色ブドウ球菌と判明 227
鼻出血 149