

Objectif terrain Objectiver la qualité de digestion et l'équilibre sucre/azote de la ration.

Essentiel

- Combiner observation, pH/redox et tamisage.
- Les fiches évoquent amidon by-pass, manque/excès de fibres, excès d'azote by-pass et ration peu concentrée.
- L'intérêt est de relier les résidus fécaux à la ration.

Repères utiles

Tamis	Seuil / 1 kg / 500 g
4 mm - rumen	<20 % / <200 g / <100 g
1,5 mm - intestin	<10 % / <100 g / <50 g


Visuels issus des documents d'origine

CORRECTIONS

pH = équilibre sucre/azote de la ration
redox = fonctionnement du système digestif

- **pH et redox corrects et stables** au cours de la journée
 Ration à l'équilibre
- **pH haut :**
 - et **redox très bas** (-230, -240) → ration très pauvre donc reconcentrer la ration en protéine ou énergie selon pH
 - et **redox haut** → manque de sucre/énergie ou problème de conservation des fourrages (présence mycotoxines) → donner du sucre (mélasse/saccharose/dextrose → voir les quantités à la page 8 sur le sang)
 - Milieu favorable au développement de pathogènes (crypto et E.Coli)
- **pH très haut (>7,5) :**
 - et **odeur d'ammoniac** → ration avec excès de protéines by pass (digestibles dans l'intestin)
 - ration pas assez concentrée et excès de fibres
- **pH normal et redox haut (> -180) :**
 Ration équilibrée mais pas assez concentrée
- **pH < 6,5**
 Ration trop concentrée en énergie → augmenter la protéine et donner un peu de sucre
 Peut déclencher inflammations articulaires, avortements, mortalité, septicémie fœtale

Tamisage des bouses



	1.5mm intestin	4mm rumen
Quantité bouses	<10%	<20%
1000g	100g	200g
500g	50g	100g

Mémo terrain

- Observer structure et résidus
- Tamisage pour objectiver
- Toujours relier à la ration