

>10 °C	Brix 11 % / 15 %
<10 °C	Brix 12 % / 16 %

CONCENTRATION DES POUDRES DE LAIT

Il est nécessaire d'adapter la concentration de la poudre de lait aux besoins des animaux. Ces besoins varient notamment en fonction de la production et de la température extérieure.

	Veau laitier	Veau allaitant
Température extérieure > 10 °C	Brix 11%	Brix 15%
Température extérieure < 10 °C	Brix 12%	Brix 16%

Mesures sur les animaux

COLOSTRUM

Vérification de :

- Équilibre énergie/protéines/sucre de la ration
- Hydratation des animaux
- Bonne qualité du colostrum pour un bon démarrage des nouveaux-nés
- Bon transfert d'immunité

OUTILS

- Réfractomètres**
- à brix
 - à densité



INTERPRÉTATIONS

pH			
Vache	Chèvre	Brebis	
< 6.1	< 6.3	< 6.3	• Excès de protéines • Déficit en sodium et/ou potassium • Excès de soufre et/ou chlore
6.1 à 6.4	6.3 à 6.4	6.3 à 6.5	
6.4 à 6.6	6.4 à 6.6	6.5 à 6.8	Bon équilibre digestif
6.6 à 6.8	> 6.6 à 7	> 6.8 à 7	• Excès d'énergie, déficit en protéines • Déshydratation • Excès de fibres • Alcalose par déficit en chlore et/ou soufre • Excès de Na et K
> 6.8	> 7.0	> 7.0	



Brix		Densité		
Vache	Chèvre/Brebis			
< 17%	< 16 %	< 1022	Très pauvre	• Colostrums dilués • Carences énergie/protéines • Hyperhydratation
18 à 25%	16 à 25 %	1022 à 1050	Pauvre	
25 à 30%	26 à 30 %	1050 à 1060	Bon	• Bon équilibre énergie/protéine • Bon équilibre anions/cations • Bon équilibre oligo/vitamines
30 à 35 %	30 à 35 %	1060	Très bon	
> 35 %	> 35 %	> 1060		• Colostrums trop concentrés • Mauvaise hydratation • Déficit en sel

Mémo terrain

- Colostrum : ≥ 10 % du poids vif en 6-12 h
- Contrôle Brix si besoin
- Relier au contexte du veau