

Observation du troupeau & températures

RECTO • signes généraux + hydratation

Objectif terrain Repérer rapidement les signaux d'alerte, notamment ceux d'une hydratation insuffisante.


Essentiel

- Adultes : rumination, couchage, flanc, poil, propreté, aplombs, blessures et comportement.
- Veaux : température, colostrum, extrémités, cordon, congestion et état général.
- Clim'Alim ajoute : pli cutané, remplissage capillaire, durée de miction, fèces sèches, baisse d'ingestion et urines foncées.

Indicateur	Repère / lecture Clim'Alim
Durée de miction	Idéal : 8 à 10 s ; <8 s = déshydratation évoquée
Pli cutané	Peau encore fripée >2 s = alerte
Remplissage capillaire	Recoloration rose dans les 2 s = bon repère
Bouses / crottes	Très sèches = signe compatible avec un manque d'eau
Urines	Foncées, collantes, odeur forte = signes évoqués

Observation du troupeau

1. Bovins adultes



QUOTIDIEN	OBJECTIFS	HEBDOMADAIRE	OBJECTIFS	MENSUEL	OBJECTIFS
Creux du flanc	note 3/4	Nombre de coups moyen par bol de rumination	50 à 70	Note état corporel	2,25/4
Boues : structure	note 3/4	Brillance du poil	note 4/5	Vache pousse/paire	note 9
Sur 10 vaches qui devraient ruminer, combien ruminent ?	6 à 7	Poil dressé ligne de dos	0/10	Aplombs vue postérieure	note 3
En période calme, combien sont couchées ?	8 à 9	Etat de propreté		Note état corporel	2,25/4
Comportement habituels exprimés de façon anormale		Trayons	note 5		
ex : se coucher/lever	0/10	Taillères	note 5		
ex : respirer 2 fois plus vite	0/10	Canons et onglons	note 5		
ex : autres (déplacer...)	0/10	Blessures sur les animaux			
Comportement inhabituels		Jarrets	note 5		
ex : piétinements	0/10	Autres	rien		
ex : queue qui fouettent	0/10	congestion zones dépilées			
ex : toux	0/10	Couronne pieds, yeux, nez	note 0		
Conflits	5/10/100v				
Zone sous/sur fréquentées	absence				

Mesure des températures




Veau	
A la naissance	38.5-39 C
24h après naissance	39-39.5 C
Dès 72h de vie, T exténeure < 22 C	38.8-39.5 C
Dès 72h de vie, T exténeure > 22 C	Jusqu'à 40.5°C

Bovin > 1an	
Matin	38.1 - 38.5 C
Soir	38.5 - 38.9 C

- Un jeune hypothermique 24h après sa naissance n'a pas bu son colostrum.
- Dans les conditions d'ambiance favorables, une température rectale élevée (veau > 39.5 C, agneau-chevreaux > 40 C) indique généralement un phénomène infectieux. Toutes les infections n'entraînent pas systématiquement une température anormalement élevée. Une température < 38.4 C a une signification pathologique.
- Au-delà de 39.5 C un bovin adulte est en état d'hyperthermie nette

Vache autour du vêlage



Mémo Toujours relier les signes d'hydratation à l'ambiance, à l'accès à l'eau et au stade physiologique.



Observer les signes de déshydratation des ruminants

Le test du pli cutané, du remplissage capillaire, et de la souplesse du rumen



Le test du pli cutané est un moyen facile pour repérer la déshydratation. Il suffit par exemple de pincer la peau de la vache le long du cou et de voir ensuite si la peau revient à la normale dans la seconde ou si elle demeure fripée plus de 2 secondes. On peut également tester la souplesse du rumen, ou encore appuyer sur la gencive d'un animal et observer la recoloration en rose dans les secondes, comme signe de bonne hydratation.



La durée de la miction

La durée de la miction est un très bon indicateur qui renseigne sur l'état d'hydratation des ruminants. Un animal déshydraté urine rapidement, la miction est inférieure à 10 secondes.

Il suffit de compter et d'obtenir, dans l'idéal, 8 à 10 secondes.



Baisse de la production laitière et frein dans la croissance

L'état d'hydratation a un impact direct et immédiat sur la production laitière. En cas de baisse de production ou de sous production, il faut mesurer les paramètres d'hydratation et questionner les conditions d'abreuvement du troupeau.



Des bouses et des crottes sèches

Des bouses ou des crottes particulièrement sèches renseignent généralement efficacement sur l'état de déshydratation d'un ruminant.



Diminution de la consommation de fourrages

Le manque d'hydratation est un facteur limitant dans la capacité d'ingestion de matière sèche chez le ruminant. Cette baisse de consommation affectera la croissance, la production de lait et la qualité d'engraissement.



Caractères des urines

Couleur foncée, urines qui collent sur les doigts, odeurs fortes sont autant de signes d'un manque d'hydratation.

Extrait découpé du livret Clim'Alim, page 7.

Conséquences rappelées dans le livret

- Baisse de production laitière ; le livret cite qu'une restriction d'eau de 50 % peut entraîner 20 % de lait en moins en une semaine.
- Ralentissement de la croissance des jeunes et diarrhées plus longues.
- Diminution de l'ingestion et de la digestion.