

1 Analyse — lycée

1.1 Opérateurs indexés

Une somme : $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$, un produit : $\prod_{k=1}^n k$, une intégrale : $\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}$ et une réunion indexée $\bigcup_{i=1}^n A_i$.

1.2 Limites en ligne

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$.

1.3 Trigonométrie

$\cos(x)^2 + \sin(x)^2 = 1$, $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$, les réciproques $\arccos(x)$, $\arcsin(x)$, $\arctan(x)$ et les hyperboliques $\cosh(x)$, $\sinh(x)$, $\tanh(x)$.

1.4 Tableaux de signes

Soit une fonction $f(x) = (x + 2)(x - 3)$

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$	
$x + 2$	$-$	0	$+$	$+$	
$x - 3$	$-$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Soit une fonction $g(x) = \frac{x + 1}{x - 2}$

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$
$x - 2$	$-$		$-$	0
$g(x)$	$+$	0	$-$	$\parallel$

La forme bloc reste la forme générale, pour les lignes que le moteur ne sait pas dériver :

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	+	0	−

1.5 Tableau de variations


Soit une fonction $q(x) = |x|\sqrt{\frac{1-x}{1+3x}}$

x	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1			
$q'(x)$	$\parallel$	$-$	$\parallel$	$+$	0	$-$	
$q(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\frac{\sqrt{-3+2\sqrt{3}}}{3}$	$\searrow$	0

$$q'(x) = \begin{cases} -\frac{\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}(3x^2-1)}{(x-1)(3x+1)} & \text{sur }]-\frac{1}{3}; 0[\\ \frac{\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}(3x^2-1)}{(x-1)(3x+1)} & \text{sur }]0; 1[\end{cases}$$

$$q''(x) = \begin{cases} \frac{4\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}}{(x-1)^2(3x+1)^2} & \text{sur }]-\frac{1}{3}; 0[\\ -\frac{4\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}}{(x-1)^2(3x+1)^2} & \text{sur }]0; 1[\end{cases}$$

$$q(x) = 0 \iff x \in \{0, 1\}$$



1.6 La droite graduée




1.7 Aires et intégrales


On pose une fonction $p(x) = -\frac{x^2}{4} + 3$

On pose une fonction $v(x) = \frac{x}{2}$

L'aire sous la courbe de p entre 1 et 3 :



L'aire entre les courbes de u et v sur $[0; 3]$:



1.8 Intégrale numérique

Soit une fonction $m(x) = \exp(-x^2)$

$$\int_0^1 m(x) \, dx \approx 0,7468241328$$

1.9 Calcul formel du lycée

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 2)$$

$$(x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$$

$$x^2 - 4x + 1 = (x - 2)^2 - 3$$

$$\mathcal{S} = \{2, 3\}$$

1.10 Convexité

Soit une fonction $h(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

$$h''(x) = 6x - 6.$$

La fonction est convexe sur $]1; +\infty[$ et concave sur $] -\infty; 1]$.

Point d'inflexion en $x = 1$.

Soit une fonction $d(x) = \frac{\exp(x)}{x}$

$$d''(x) = \frac{(x^2 - 2x + 2)e^x}{x^3}.$$

La fonction est convexe sur $]0; +\infty[$ et concave sur $] -\infty; 0[$.

La courbe n'a pas de point d'inflexion.

1.11 Asymptotes

Soit une fonction $e(x) = \frac{2x^2 + 1}{x - 1}$

La droite d'équation $y = 2x + 2$ est asymptote oblique à la courbe en $-\infty$ et en $+\infty$.

La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à la courbe.

Soit une fonction $k(x) = \frac{3x + 1}{x + 2}$

La droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à la courbe en $-\infty$ et en $+\infty$.

La droite d'équation $x = -2$ est asymptote verticale à la courbe.

1.12 Équations trigonométriques

On résout $\cos x = \frac{1}{2}$ sur $\mathbb{R}$, avec la valeur remarquable $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

Les solutions sont les réels $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ et $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

On résout $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $\mathbb{R}$, avec la valeur remarquable $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Les solutions sont les réels $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ et $x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

On résout $\tan x = \sqrt{3}$ sur $\mathbb{R}$, avec la valeur remarquable $\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$.

Les solutions sont les réels $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.


1.13 Dérivées en ligne

$f'(x)$, $f''(x)$, la forme de Leibniz $\frac{df}{dx}$ et la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}$.

1.14 Suites récurrentes

Soit une fonction $h(x) = \sqrt{2x+3}$

L'escalier de $p(n+1) = h(p_n)$ depuis $p_0 = 0, 2$, convergeant vers le point fixe $l = 3$:



1.15 Primitive, limites, développement limité

Soit une fonction $w(x) = \frac{1}{x^2+1}$

$$\int w(x) dx = \arctan(x) + C$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} w(x) = 0$$

Soit une fonction $q2(x) = \frac{1}{x-1}$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} q2(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} q2(x) = -\infty$$

Soit une fonction $s(x) = \exp(x)$

$$s(x) = \frac{x^4}{24} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x + 1 + o(x^4)$$

1.16 Valeur absolue et partie entière

La valeur absolue s'écrit entre barres, la partie entière $E(x)$; toutes deux se posent, s'évaluent et se dérivent à gauche comme à droite :

Soit une fonction $k2(x) = |x - 2|$

$$k2(5) = |5 - 2| = 3$$

$$\mathcal{S} = \{-1, 5\}$$

Soit une fonction $pe(x) = E(x)$

$$pe(2,7) = E(2,7) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} pe(x) = 1$$


$$\lim_{x \rightarrow 2^+} pe(x) = 2$$

1.17 Le tracé, complet d'office


Le tracé d'une courbe embarque ce que dit le tableau de variations : tangentes en tirets fléchés aux extremums et aux points à tangente verticale, asymptotes en tirets — et les marches de la partie entière sans faux traits verticaux.


Soit une fonction $tc(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
$tc'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$tc(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$



x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	$\parallel$	$-$
$g(x)$	$1 \searrow$	$-\infty \parallel +\infty$	$\searrow 1$





La racine cubique montre la tangente verticale à l'origine :

Soit une fonction $cr(x) = racine[3](x)$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$cr'(x)$	$+$	$\parallel$	$+$
$cr(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

