

药物简介 - 抗生素

抗生素

抗生素可以消灭或抑制细菌生长，用作预防或治疗细菌感染。然而，抗生素不能够医治并非由细菌引起的感染，例如流行性感冒，或非由感染引起的炎症。

常见抗生素的种类

- 一. 青霉素类 Penicillins (例如: 阿莫西林 Amoxicillin及氨苄西林 Ampicillin)
- 二. 四环素类 Tetracyclines (例如: 四环素Tetracycline及多西环素 Doxycycline)
- 三. 头孢菌素类 Cephalosporins (例如: 头孢氨苄Cephalexin及头孢呋辛Cefuroxime)
- 四. 大环内酯类 Macrolides (例如: 红霉素Erythromycin及阿奇霉素 Azithromycin)
- 五. 氟喹诺酮类 Fluoroquinolones (例如: 环丙氟哌酸Ciprofloxacin 及左氧氟沙星 Levofloxacin)
- 六. 其他 (例如: 甲硝唑Metronidazole 及氯霉素Chloramphenicol)

服用药物需知

- 按照指示完成整个抗生素疗程。
- 不要服用任何剩余的抗生素。
- 服用抗生素水剂前应先摇匀。
- 若于使用药物后出现过敏反应如皮肤红疹、面部或手部肿胀、呼吸困难等，请立即求医。
- 副作用通常轻微和短暂。如果副作用持续或变得严重，请立即停止服药并咨询医生。
- 如果忘记服药，应该尽快补服所忘记服食的剂量。但如果当时已经差不多到下一次服药时间，便毋须补服，应该跳过错过的剂量，并依时服用下一剂量。切勿服用双倍剂量。
- 如果怀孕、计划怀孕或正在哺乳，应告知医生。
- 请告知医生或药剂师你正在服用的其他药物，包括处方药物、成药和维生素。

抗生素的副作用

抗生素的常见副作用包括呕吐、恶心、腹泻和头痛。

- 氟喹诺酮类：在极少数情况下，此类药物会引起严重的副作用，影响关节、肌肉和神经系统。若肌腱、肌肉或关节出现严重疼痛、刺痛或麻痹感，请立即求医。
- 四环素类：服用四环素类药物期间，避免皮肤在阳光下曝晒。

贮存方法

把药物存放在阴凉及干燥的地方，避免高温或光线直接照射。某些抗生素须存放于雪柜内，请依照个别药物标签的指示。

把药物存放在儿童不能触及的地方。

感染控制

使用抗生素可治疗细菌感染，但同时亦会杀死身体内之正常细菌，及增加感染抗药性细菌的风险。

保障您与家人的健康，请注意个人卫生：

- 时刻保持手部卫生
- 食水和食物必须彻底煮沸及煮熟
- 消毒及覆盖伤口
- 当有呼吸道感染征状时，请戴上口罩
- 有传染病征状的幼童，应尽可能减少接触其他儿童

抗生素耐药性

抗生素耐药性指细菌经演化而对抗生素产生抵抗力，令抗生素失去其药效。不当和过度使用抗生素，或没有按医生指示服完整个疗程，都是抗生素耐药性出现的原因。由耐药性细菌引致的感染比一般感染更难以医治，因此，必须按照医生的指示使用抗生素。

此药物信息只供参考之用。

应按照医生及药剂师指示用药。

如有疑问，请向医生、药房职员或其他医护人员查询。

切勿将自己的药物给予他人使用。