

Klein-Gordon likning; Spredning fra initiell forstyrrelse

Definisjon av problem, overblikk

Vi har gitt likningen

$$\frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} + q\eta = 0. \quad (1)$$

Med initialbetingelse

$$\eta(x, 0) \equiv \eta_0(x) = e^{-(\frac{x}{L})^2}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \eta(x, 0) = 0, \quad (2)$$

der vi har satt amplituden av initialbetingelsen til 1. Karakteren til løsningen avhenger av q og L i kombinasjonen qL^2 noe som kan vises ved reskalering¹. Likevel beholdes q i likningen.

En asymptotisk løsning av (1) og (2) finnes i to trinn

1. Fouriertransform

Likningssystemet er lineært med konstante koeffisienter og initialbetingelsen er romlig begrenset. Da kan vi etablere en løsning i form av et Fourier-integral. Feks. vil vi for store positive x kunne skrive:

$$\eta(x, t) = \frac{1}{2\pi} \Re \int_0^\infty \tilde{\eta}_0(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} dk$$

der ω og k oppfyller dispersjonsrelasjonen.

2. Stasjonær fase

For store x og t vil dominante bidrag i Fourier integralet komme fra områder nær stasjonære punkter. En kan da finne en eksplisitt løsning i sluttet form som er asymptotisk gyldig for store x og t .

Løsning i Fourierplanet

Generelt om Fouriertransform

Vi definer den transformerte til en funksjon, f , ved

$$\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx \quad (3)$$

med tilbaketransform

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(k) e^{ikx} dk \quad (4)$$

En viktig egenskap ved transformen er:

$$\frac{d\tilde{f}}{dk} = ik\tilde{f} \quad (5)$$

som vises enkelt ved delvis-integrasjon.

¹Tidsskalaen, dvs. hvor *fort* løsningen utvikler seg, vil ikke avhenge av den gitte kombinasjonen. Vi kan for eksempel skrive $\eta = \text{funksjon}(\frac{x}{L}, \frac{t}{L}, qL^2)$

Fouriertransform på (1,2)

Vi kan nå anvende Fouriertransform på hele likningen (1) og benytte (5) to ganger slik at all derivasjon mhp. x erstattes med potenser av ik . Resultatet er den *ordinære* likningen

$$\frac{\partial^2 \tilde{\eta}}{\partial t^2} + (k^2 + q)\tilde{\eta} = 0 \quad (6)$$

som har den generelle løsningen

$$\tilde{\eta}(k, t) = A(k)e^{-i\omega(k)t} + B(k)e^{i\omega(k)t} \quad (7)$$

der $\omega(k) = \sqrt{q + k^2}$. Dette er dispersjonsrelasjonen. Faktorene A og B bestemmes av initialbetingelsene. Den Fouriertransformerte versjonen av initialbetingelsene blir

$$\tilde{\eta}(k, 0) = \tilde{\eta}_0(k) = L\sqrt{\pi}e^{(\frac{kL}{2})^2}, \quad \frac{\partial \tilde{\eta}(k, 0)}{\partial t} = 0 \quad (8)$$

som gir $A = B = \frac{1}{2}\tilde{\eta}_0$. Tilbaketransformasjonsformelen gir da

$$\eta(x, t) = \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\tilde{\eta}_0(k)e^{i(kx - \omega(k)t)} + \tilde{\eta}_0(k)e^{i(kx + \omega(k)t)} \right) dk \quad (9)$$

Dette er en linær superposisjon av harmoniske moder som oppfyller initialbetingelsene.

Uttrykket (9) kan skrives om på mange vis. Siden $\tilde{\eta}_0$ er reell og symmetrisk om $k = 0$ er det lett å vise at de to leddene i integranden gir bidrag som er komplekskonjugerte av hverandre. Derfor

$$\eta(x, t) = \frac{1}{2\pi} \Re \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\eta}_0(k)e^{i(kx - \omega(k)t)} dk.$$

Gjør vi om til to integraler fra 0 til ∞ følger

$$\eta(x, t) = \frac{1}{2\pi} \Re \left\{ \int_0^{\infty} \tilde{\eta}_0(k)e^{i(kx - \omega(k)t)} dk + \int_0^{\infty} \tilde{\eta}_0(k)e^{-i(kx + \omega(k)t)} dk \right\} \quad (10)$$

der de to integralene kan gjenkjennes som bølgesystemer som går i hhv. positiv og negativ x -retning.

Stasjonær fase

Generelt om stasjonær fase

Et generelt Fourier-integral er gitt ved

$$I(t) = \int_a^b F(k)e^{it\chi(k)} dk \quad (11)$$

der a og b kan være endelige eller uendelige grenser. For store t svinger integranden meget hurtig og $I \rightarrow 0$ når $t \rightarrow \infty$. Dersom vi i integrasjonsintervallet har et stasjonært punkt, dvs. en k_0 slik at

$$\frac{d\chi(k_0)}{dk} = 0$$

vil det dominante bidraget til I komme fra området rundt k_0^2 . Vi finner da den asymptotiske tilnærmelsen

$$I(t) \sim \frac{\sqrt{2\pi} F(k_0)}{\sqrt{t|\chi''(k_0)|}} e^{i(\chi(k_0)t \pm \frac{\pi}{4})} \quad (12)$$

der fortegnet i eksponenten er likt fortegnet på $\chi''(k_0)$.

Anvendelse av stasjonær fase

Vi konsentrerer oss om det første leddet i (10) og gjenkjenner F i (11) som $\tilde{\eta}_0/(2\pi)$ og fasefunksjonen som

$$\chi = k \frac{x}{t} - \omega(k) \quad (13)$$

det stasjonære punktet er gitt ved

$$c_g(k_0) \equiv \frac{d\omega(k_0)}{dk} = \frac{x}{t}.$$

Tolk denne! Utregning av viser at $c_g < 1$ for alle k som betyr at stasjonær fase kan brukes bare for $x < t$. Når $x < t$ finner vi

$$k_0 = q^{\frac{1}{2}} \frac{x}{t} (1 - (\frac{x}{t})^2)^{-\frac{1}{2}}, \quad \chi(k_0) = -q^{\frac{1}{2}} (1 - (\frac{x}{t})^2)^{\frac{1}{2}}, \quad \chi''(k_0) = -q^{-\frac{1}{2}} (1 - (\frac{x}{t})^2)^{\frac{3}{2}}.$$

Innsatt i (12) gir dette

$$\eta \sim a(x, t) \cos \theta(x, t) \quad (14)$$

der

$$a = \frac{L^{\frac{1}{2}} q^{\frac{1}{4}}}{(2\frac{t}{L})^{\frac{1}{2}}} \frac{e^{-\frac{L^2 q}{4((\frac{t}{x})^2 - 1)}}}{(1 - (\frac{x}{t})^2)^{\frac{3}{4}}}, \quad \theta = \frac{\pi}{4} - q^{\frac{1}{2}} \sqrt{t^2 - x^2}$$

Det lokale bølgetallet kan defineres ved $k_l(x, t) = d\theta/dx$. Utregning viser $k_l(x, t) = k_0(x, t)$. Dette er et resultat som kan vises generelt for stasjonær fase approksimasjoner når χ har formen (13).

Med utgangspunkt i løsningen bør nå følgende spørsmål diskuteres:

1. Hvordan varierer amplituden (a) med x og t ?
2. Hvordan varierer den lokale bølgelengden med x og t ?
3. Hvordan forplanter enkelttopper seg relativt til hele bølgesystemet ?

Svarene sammenholdes med animasjonen på nettet.

²Dersom vi *ikke* har et stasjonært punkt vil I gå mot null som $1/t$. Hvis a og b er endelige kan en asymptotisk tilnærmeelse finnes ved delevise integrasjon.