中检科健

240200230095

检 验 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号	CAST-03-2025-0992
样 品 名 称	藏红花多糖压片糖果
检 测 项 目	急性经口毒性试验
送 检 单 位	林芝天旺农牧产品有限公司

中检科健（天津）检验检测有限责任公司

Chinese Academy of Surveillance and Testing (Tianjin) Co., Ltd.

2025 年 10 月 31 日

地址：天津市东丽区东丽湖天骥智谷汇智商务园 18，19，20 号楼

电话：022-60633692

网址：http://www.caiqcast.com

声明

一、本检测报告仅对送检样品负责。

二、本检测报告涂改增删无效，未加盖单位印章无效，复印件无效。

三、本检测报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

四、报告存在中英文版本的情况下，英文报告仅供参考，如有疑问，请以中文报告为准。

五、本检测报告一式三份，两份交委托单位，一份由我单位存档。

中检科健（天津）检验检测有限责任公司
检验报告

样品名称	藏红花多糖压片糖果	样品数量	2 盒
样品性状	颗粒	样品规格	（0.5 g×20 粒）/盒
保存条件	阴凉干燥常温	样品批号	/
申请单位	林芝天旺农牧产品有限公司	生产日期	20250825
申请单位地址	西藏林芝市巴宜区米瑞乡姆多村 42 号	保质期至	24 个月
生产企业	佳裕健康科技(浙江)有限公司	收样日期	2025 年 09 月 30 日
检测类别	委托检测	检测日期	2025 年 10 月 10 日- 2025 年 10 月 28 日
检测项目编号	BJ20250383C	样品编号	YP20250883
检测项目及依据	急性经口毒性试验 GB 15193.3-2014 食品安全国家标准 急性经口毒性试验		

检测结果：

本试验条件下，结果汇总如下：

根据“GB 15193.3-2014 食品安全国家标准 急性经口毒性试验”对试验样品藏红花多糖压片糖果进行急性经口毒性试验，试验结果如下：

试验样品藏红花多糖压片糖果对 ICR 小鼠急性经口半数致死剂量（LD_{50}）雌、雄性均＞10000 mg/kg 体重。急性经口毒性分级级别为实际无毒。

（以下空白）

检　验　人　　2025 年 10 月 31 日

校　核　人　　2025 年 10 月 31 日　　检验机构盖章

授权签字人　　2025 年 10 月 31 日

中检科健（天津）检验检测有限责任公司
检验报告

试验系统：

动物信息：ICR 小鼠，SPF 级，雌性 10 只：19~22 g；雄性 10 只，18~20 g

繁育单位：斯贝福（北京）生物科技有限公司（SCXK（京）2024-0001）

合格证号：110324251106349722

饲养环境：温度为 20.5~26.0℃，最大日温差≤4.0℃；相对湿度为 40.1~60.7%

饲料种类：^{60}Co 放射灭菌鼠全价颗粒饲料

饲料来源：斯贝福（北京）生物科技有限公司（SCXK（京）2024-0001）

合格证号：1103242500178498

试验方法：

样品配制：

样品研磨后作为受试样品，受试样品用水配制成所需浓度（500 mg/mL），现用现配。给样过程中试验样品常温放置，给样过程不超过半天。

试验设计：

应用限量法，ICR 小鼠 20 只，雌雄各半，设 10000 mg/kg 剂量组。动物禁食（不禁水）4-6 h 后经口灌胃给予试验样品，持续观察 4 小时，并观察给予样品后 14 天大鼠毒性表现。试验结束时存活动物颈椎脱臼处死，大体解剖肉眼观察其组织器官病理变化。根据动物死亡情况确定试验样品小鼠急性经口半数致死剂量（LD_{50}），并按照“GB 15193.3-2014 食品安全国家标准 急性经口毒性试验”中附录 G 急性毒性（LD_{50}）剂量分级中的规定确定试验样品的毒性分级。

给样途径及方法：采用带有灌胃针头的注射器经口灌胃给样（0.2 mL/10 g）。

临床观察：每天观察 1 次，共观察 14 d。

体重测定：观察期每周测定 1 次。

病理学检查：所有的试验动物均进行了大体剖检。

试验结果：

临床体征：给样后，未观察到任何给样相关的明显中毒体征，观察期间雌、雄动物

中检科健（天津）检验检测有限责任公司
检验报告

均无死亡发生（详见表 1）。

表 1. 动物死亡情况总结表

性别	剂量（mg/kg）	死亡时间（日）														累计死亡
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
雌性	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/10
雄性	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/10

体重变化：各组动物于染毒前、第 7 天、第 14 天的体重无显著性异常（详见表 2）。

表 2. 动物体重（g，$\bar{x}\pm s$）

性别	剂量（mg/kg）	试验前体重（n=10）	7d 体重（n=10）	14d 体重（n=10）
雌性	10000	20.5±1.18	23.7±1.06	27.9±0.99
雄性	10000	19.1±0.74	27.3±0.67	34.5±0.85

大体病理学检查结果：观察期 14 天结束时存活动物大体剖检未见明显异常（详见表 3）。

表 3. 动物大体剖检所见

性别	剂量（mg/kg）	动物编号	观察结果
雌性	10000	F1001-F1005	未见明显异常表现
	10000	F1006-F1010	未见明显异常表现
雄性	10000	M1001-M1005	未见明显异常表现
	10000	M1006-M1010	未见明显异常表现

试验结论：

试验结果显示，本试验条件下，以剂量 10000 mg/kg 体重灌胃给予试验样品藏红花多糖压片糖果，雌、雄动物均无死亡，无明显毒性表现。该试验样品对 ICR 小鼠急性经口半数致死剂量（LD_{50}）雌、雄性均＞10000 mg/kg 体重，急性经口毒性分级级别为实际无毒。

（本页以下空白）