
A. Cross-Sectional Richness Comparisons (n = 356 samples)
HCT time: post (n=225) vs pre (n=78)
H = 70.58 (q = 1.3e-16)
Graft: BM (n=67) vs PBSC (n=128)
H = 21.20 (q = 2.5e-05)
HCT time: peri (n=53) vs pre (n=78)
H = 20.38 (q = 9.5e-06)
Graft: PBSC (n=128) vs TCD (n=129)
H = 18.86 (q = 4.2e-05)
FMT time: peri (n=27) vs post (n=41)
H = 10.42 (q = 0.004)
Graft: BM (n=67) vs cord (n=32)
H = 10.30 (q = 0.003)
HCT time: peri (n=53) vs post (n=225)
H = 8.51 (q = 0.004)
Stool: formed (n=97) vs semi-formed (n=115)
H = 8.26 (q = 0.012)
Graft: TCD (n=129) vs cord (n=32)
H = 7.85 (q = 0.008)
FMT time: peri (n=27) vs pre (n=288)
H = 5.87 (q = 0.023)
Stool: formed (n=97) vs liquid (n=143)
H = 5.55 (q = 0.028)
Graft: BM (n=67) vs TCD (n=129)
H = 2.09 (q = 0.178)
FMT time: post (n=41) vs pre (n=288)
H = 1.58 (q = 0.208)
Group: control (n=150) vs treatment (n=206)
H = 1.29 (q = 0.256)
Stool: liquid (n=143) vs semi-formed (n=115)
H = 0.44 (q = 0.507)
Graft: PBSC (n=128) vs cord (n=32)
H = 0.01 (q = 0.908)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Kruskal-Wallis H statistic (observed ASVs)
B. Beta-Diversity PCoA Variance Explained
PC1
PC2
PC3
Variance explained (%)
0
5
10
15
20
25
30
35
Sum: 31.1%
20.4%
6.2%
4.4%
Sum: 54.6%
31.6%
11.6%
11.5%
Sum: 30.2%
13.9%
10.7%
5.6%
Sum: 13.1%
6.9%
3.4%
2.8%
Unweighted UniFrac
Weighted UniFrac
Bray-Curtis
Jaccard