本実験が完了

RQ1 ～ 3 の主要な結果（速報）

修士論文の章立てと執筆スケジュール



進捗報告 2026/12/18

今井元

大阪工業大学
メディアインタラクション研究室

結果のまとめ（速報）

Media Interaction Laboratory, Osaka Institute of Technology

○ **RQ1**
予測の精度

個人補正で予測の誤差が約 26% 減った（推し疲れ）
80% 区間に入った割合は 76%（目標 80%）

○ **RQ2**
アバターで実行は増えるか

群 C の実行率が群 B より高い（オッズ比 1.71）
4 週間を通して群 C が約 12 ポイント上回った


△ **RQ3**
ウェルビーイングは上がるか

WHO-5 は群 C で上がったが、主要な比較は有意差なし
群 C− 群 B +0.9（Holm 補正後 p = .16）。群 C− 群 A は +1.7（探索的）

前回からの差分：実験完了（12/13）→ 事後アンケート回収（197 名）→ 事前に決めた解析を実施（12/17）

※ 想定値：実データで差し替え


全体スケジュールと現在地



本実験が完了し、解析と修論執筆の段階へ。提出（1/29）まで約 6 週間

前回（11/27）から：介入期間の後半 → 終了 → 事後アンケート → 主要解析

参加者：最後まで続いた割合



197 名

6 週間を完了

7.5%

割付後の脱落率


64 名

1 群あたりの必要人数

各群とも必要人数（64 名）を確保：群 A 64 名・群 B 66 名・群 C 67 名。脱落は群 A でやや多い

※ 想定値：実データで差し替え

RQ3 ： WHO-5 （精神的な健康）の変化



2 週までは全群が記録のみ。 2 週の終わりに割付し、 3 週目から介入

比較	調整済みの差	p （ Holm 補正後）
C − B （主要）	+0.9	.08 （ .16 ）
B − A （主要）	+0.8	.12 （ .16 ）
C − A （探索的）	+1.7	.001


共分散分析（ 2 週の WHO-5 を共変量）

主要な比較は有意差なし

- 群 C は記録のみの群 A より +1.7 点（探索的）
- 群 C− 群 B の差 +0.9 は効果量 d ≈ 0.2（小）。検出力が足りなかった可能性

※ 想定値：実データで差し替え

RQ2 ：選んだ提案を実行できた割合



オッズ比 1.71

95% 信頼区間 1.18 〜 2.48 、 p = .005


ロジスティック混合モデル（群 × 週）

読み取れること

- 両群とも週を追うごとに下がる（交互作用は有意でない）
- 群 C は下がり方がゆるやかで、 6 週でも半分以上が実行
- 同じ提案でも、見せ方で実行が変わる

※ 想定値：実データで差し替え

RQ1 ：個人補正で予測はどれだけ当たったか



78%

充実： 80% 区間に入った割合

76%

推し疲れ： 80% 区間に入った割合


区間はほぼ「正直」

80% 区間に入った割合が 80% に近い → ゆらぎアバターが示す幅は、実際の外れ方とおおむね一致

※ 想定値：実データで差し替え

副次評価：疲れの中身と楽しさ

2 週 → 6 週の変化（マイナス＝疲れが減った）



睡眠と出費の疲れが群 C で大きく減った。比較（ SNS での他のファンとの比較）はどの群も変わらない

楽しさは下がらなかった


群 A 3.9 → 3.9
群 B 3.9 → 3.9
群 C 3.8 → 3.9

「組み替える」提案の手応え

疲れは減り、楽しさは保たれた。一律に減らす支援では得にくい結果

※ 想定値：実データで差し替え

記録の続き方とアバターの評価



3 週目（介入開始）から差が開く。群 C は「未来の解像度」が記録の動機になった可能性（探索的）

3.7

似ている度（群 C ・ 5 段階）

4.6 vs 4.1

未来の自分とのつながり（ C vs B ・ 7 段階）

1.9 vs 1.8

予測を見た後の不安（ C vs B ・ 5 段階）

76.4

SUS （群 C ）

※ 想定値：実データで差し替え

自由記述から

群 C

「ぼやけていた自分がだんだんはっきりしてくるのが楽しみで、記録を続けられた」

群 B

「「推しを減らせ」と言われないのがよかった。グッズの買い方だけ変えた」

群 C

「「今のまま」の自分の顔を見て、夜中まで配信を見るのをやめようと思った」

群 C

「予測が 2 週続けて外れて、少し信用できなくなった」

「減らせと言われない」安心感と、「未来がくっきりする」楽しさが続ける理由に

一方で、予測が外れ続けると信頼が下がる → 答え合わせの見せ方は今後の課題

※ 記述は想定例

考察（暫定）

見せ方で行動は変わる（RQ2）

同じ提案でも、自分に似たアバターで将来の見込みを見ると実行が増えた

幸福度への効果は小さい（RQ3）

6 週間は習慣が定着する前（Lally et al., 2010 ：中央値 66 日）。効果が出るには期間が短い可能性

不確かさを見せても不安は増えない

区間がおおむね正直で、不安も群 B と同程度。「ゆらぎ」は安全に使える見込み

注意：実行した人ほど WHO-5 が高いかは、実行を本人が選ぶため偏りがある。主な結論は無作為割付の比較から導く

修士論文の章立てと執筆スケジュール

章	内容	執筆期間
1 章 序論	背景・目的・ RQ	12/21–12/25
2 章 関連研究	PI ・行動変容・アバター・推し活	12/26–12/30
3 章 予備調査	215 名の調査とパス解析	1/4–1/7
4 章 システム	OshiFit （ツイン・提案・ゆらぎ）	1/8–1/12
5 章 実験	6 週間・ 3 群の比較実験と結果	1/13–1/18
6 章 考察	RQ ごとの考察・限界	1/19–1/22
7 章 結論	まとめと展望	1/23

節目

- **12/25** 1 章を先生に提出
- **1/12** 4 章まで提出
- **1/24–27** 全体の確認・修正
- **1/29** 修論提出
- **2/17** 公聴会

3 章は IEVC ・関西支部大会の原稿を、
4 章は CHIIR の原稿を下敷きにする

相談事項と次の予定

相談したいこと

主要な比較で有意差が出なかった RQ3 の書き方
「傾向あり」とは書かず、効果量と信頼区間で報告し、必要人数の再計算を今後の課題にする案でよいか

記録率の群差（群 C 86% / 群 A 81% ）による欠測の偏り
多重代入の感度分析を本文の表に並べ、結論が変わらないことを示す

CHIIR 2027 採択（ 12/15 通知）後の作業と IEEE Access への投稿時期
カメラレディは 1 月中旬。修論提出後の 2 月に IEEE Access の原稿をまとめる

次回（ 1 月）に見せるもの

感度分析を含めた確定値／修論の 1 〜 4 章の草稿／公聴会スライドの骨子

※ 採否・数値は想定