잎을 관상하는 실내식물

관음죽



- 학명 Rhapis excelsa
- 영명 Fan Palms, (Large) Lady Palm, Bamboo Palm, Broad-leaved Lady Palm, Ground Rattan
- 유통명 관음죽
- 과명 야자과
- 원산지 한국, 일본, 중국남부
- TIP 컨테이너, 경계, 차폐, 방풍/ 암모니아 흡수에 최강인 관엽식물

분류 생육형태 광요구도 물주기

봄 여름 가을 겨울

상세정보	
분류	잎보기식물
생육형태	관목형
생장높이(cm)	200
생장너비(cm)	70
실내정원구성	상층목,중층목
생태형	일반형
잎형태	잎의 질감-거침 / 잎의 광택-있음 / 상록
잎무늬	기타 (무늬없음 등)
잎색	녹색, 연두색
독성	수액이 인체의 피부나 점막을 자극할 수 있음
번식방법	파종,분주

관리정보	
관리수준	경험자
관리요구도	보통 (약간 잘 견딤)
광요구도	낮은 광도(300~800 Lux),중간 광도(800~1,500 Lux),높은 광도(1,500~10,000 Lux)
	실내 어두운 곳 (실내깊이 500 이상cm)

배치장소	거실 내측 (실내깊이 300~500cm) 거실 창측 (실내깊이 150~300cm) 발코니 내측 (실내깊이 50~150cm) 발코니 창측 (실내깊이 0~50cm)
생장속도	느림
생육적온	16~20°C
겨울최저온도	5°C
습도	40 ~ 70%
비료	비료를 보통 요구함
토양	중성,산성 / 배수 잘 됨 / 타입-Loam, Sand
물주기-봄	토양 표면이 말랐을때 충분히 관수함
물주기-여름	토양 표면이 말랐을때 충분히 관수함
물주기-가을	토양 표면이 말랐을때 충분히 관수함
물주기-겨울	화분 흙 대부분 말랐을때 충분히 관수함
병충해	응애,깍지벌레
병충해관리	일반적으로 병이나 해충이 없으나 매우 드물게 응애가 생기기도 한다.
특별관리	관음죽을 지하관수나 수경재배로 기르는 경우에는 수돗물 속의 염분이나 미네랄이 잎 끝에 축적되어 갈색으로 변할 수도 있다. 이런 현상이 나타날 때에는 갈색으로 변한 부분만 가위로 잘라내면 된다. 그러면 염분도 제거할 수 있고 특유의 톱니모양의 녹색 잎을 유지시킬 수 있다.

기능성정보

손바닥 모양의 잎을 가진 집에서 기르기 쉽고 그늘과 추위에도 잘 견디고 병해충에도 강하기기 때문에 기르기 쉬운 식물이다. 자라는 속도가 느려서 관리가 편하다. 반엽이 들어있는 종은 색상이 더욱 아름답다. 2년에 한 번씩 분갈이를 해 주면 좋다.

목록