잎을 관상하는 실내식물

박쥐란



- 학명 Platycerium bifurcatum

영명 common staghorn fern, elkhorns
유통명
과명 고사리과
원산지 오스트레일리아
TIP 상층행잉초본

분류 생육형태 광요구도 물주기

봄 여름 가을 겨울

상세정보	
분류	잎보기식물
생육형태	풀모양
생장높이(cm)	30
생장너비(cm)	30
실내정원구성	상층목
생태형	일반형
잎무늬	기타 (무늬없음 등)
잎색	녹색, 연두색
향기	거의 없음
번식방법	파종,분주

관리정보	
관리수준	전문가
관리요구도	필요함
광요구도	중간 광도(800~1,500 Lux),높은 광도(1,500~10,000 Lux)
배치장소	거실 창측 (실내깊이 150~300cm) 발코니 내측 (실내깊이 50~150cm) 발코니 창측 (실내깊이 0~50cm)

	[illegible]
생장속도	보통
생육적온	16~20°C
겨울최저온도	13°C 이상
습도	40 ~ 70%
비료	비료를 보통 요구함
물주기-봄	흙을 촉촉하게 유지함(물에 잠기지 않도록 주의)
물주기-여름	흙을 촉촉하게 유지함(물에 잠기지 않도록 주의)
물주기-가을	흙을 촉촉하게 유지함(물에 잠기지 않도록 주의)
물주기-겨울	토양 표면이 말랐을때 충분히 관수함
병충해	응애
병충해관리	깍지벌레, 개각충, 진딧물

기능성정보

본 종의 포자엽은 30~70cm이고 길이는 60~90cm로 기부는 좁고 직립한다. 잎 기부로부터 잎 끝까지의 형태는 V자형으로 상부에는 2~3회 우상으로 갈라져서 늘어진다. 잎 표면은 회녹색이고 뒷면은 녹백색이다. 외투엽은 원형으로 불룩하게 튀어 나오고 처음에는 녹색, 후에는 갈색으로 변한다. 외투 직경은 20cm로 잎 가장자리는 약간의 파상이며 본 엽은 총생하고 좁고 길다. 갈라진 잎의 길이는 10cm, 폭은 4cm로 회녹색이고 뒷면은 회녹백색으로 털이 있다. 포자낭군은 황갈색이고 열편의 정점이 착생한다. 그래서 갈라진 풀잎은 황갈색으로 변한다. 원산지는 열대 아프리카, 열대 아시아, 온대 오스트레일리아로 14종이 있다. 회녹색의 사슴뿔 모양을 지니고 있으며 밝은 곳을 좋아한다. 건조한 것 보다는 습한 환경을 좋아하므로 잎에 자주 분무해 준다.

목록