잎을 관상하는 실내식물

상록넉줄고사리 '후마타'



- 학명 Humata tyermannii (Davallia griffithiana)
- 영명 squirrel's (bear's, white rabbit's) foot fern
- 유통명
- 과명 고사리과
- 원산지 열대아시아, 말레이시아
- TIP 흙 위로 올라온 발이 매력적이며 그 발에서 계속 새순을 낸다.

분류 생육형태 광요구도 물주기

봄 여름 가을 겨울

상세정보	
분류	잎보기식물
생육형태	풀모양
생장높이(cm)	25
생장너비(cm)	30
실내정원구성	하층목
생태형	일반형
잎무늬	기타 (무늬없음 등)
잎색	녹색, 연두색
향기	거의 없음
번식방법	삽목,분주

관리정보	
관리수준	초보자
관리요구도	보통 (약간 잘 견딤)
광요구도	낮은 광도(300~800 Lux),중간 광도(800~1,500 Lux),높은 광도(1,500~10,000 Lux)
배치장소	실내 어두운 곳 (실내깊이 500 이상cm) 거실 내측 (실내깊이 300~500cm) 거실 창측 (실내깊이 150~300cm)

	발코니 내측 (실내깊이 50~150cm) 발코니 창측 (실내깊이 0~50cm)
생장속도	빠름
생육적온	16~20°C
겨울최저온도	5°C
습도	70% 이상
비료	비료를 보통 요구함
토양	배수가 잘되는 토양이 좋다.
물주기-봄	흙을 촉촉하게 유지함(물에 잠기지 않도록 주의)
물주기-여름	흙을 촉촉하게 유지함(물에 잠기지 않도록 주의)
물주기-가을	흙을 촉촉하게 유지함(물에 잠기지 않도록 주의)
물주기-겨울	토양 표면이 말랐을때 충분히 관수함
병충해	응애,온실가루이
병충해관리	습기가 많아서 민달팽이에 침해되기 쉬우므로 민달팽이가 붙으면 약을 뿌려 주도록 하고 과습에 의한 곰팡이병도 문제가 된다. 또, 건조할 때는 깍지벌레, 온실가루이, 가루깍지벌레 등이 발생한다.

기능성정보

너무 습기가 많으면 민달팽이의 피해와 곰팡이병이 생기지만 너무 건조할 때는 깍지벌레, 온실가루이, 가루깍지벌레 등이 발생한다. 그러나 거미발만 살아있다면 언제든지 새 순을 낼 수 있다.

목록