

# 曲線のパラメータ付けの変換と曲線の長さの定義

$\mathbb{R}^n$  内のなめらかな曲線のパラメータ付けは微分可能で「速さが常に正」という条件を付けたものとする。

このとき、同じ曲線の2つのパラメータ付けのあいだの連続な変数変換が微分可能になることは以下の補題によって示される。

さらにパラメータ付けに  $C^1$  級であるという条件を課すると、

同じ曲線のパラメータ付けのあいだの連続な変数変換も  $C^1$  級になることもわかる。

**補題**  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$  は  $\alpha \in (a, b)$  で微分可能で  $f'(\alpha) \neq 0$  であると仮定する。

$g: (c, d) \rightarrow (a, b)$  は  $\beta \in (c, d)$  で連続で  $g(\beta) = \alpha$  をめたと仮定する。

$F(t) = f(g(t))$  ( $t \in (c, d)$ ) とおく、 $F(t)$  は  $t = \beta$  で微分可能だと仮定する。

このとき、 $g(t)$  は  $t = \beta$  で微分可能で  $g'(\beta) = \frac{F'(\beta)}{f'(\alpha)}$  となる。

**証明** 仮定より、以下のように書ける：

$$\textcircled{1} \quad f(\alpha+h) - f(\alpha) = f'(\alpha)h + \varepsilon(h)h = (f'(\alpha) + \varepsilon(h))h, \quad \varepsilon(h) \rightarrow 0 \text{ as } h \rightarrow 0,$$

$$\textcircled{2} \quad g(\beta+k) - g(\beta) = g(\beta+k) - \alpha = \eta(k) \rightarrow 0 \text{ as } k \rightarrow 0,$$

$$\textcircled{3} \quad F(\beta+k) - F(\beta) = f(g(\beta+k)) - f(g(\beta)) = F'(\beta)k + \delta(k)k = (F'(\beta) + \delta(k))k, \quad \delta(k) \rightarrow 0 \text{ as } k \rightarrow 0,$$

さらに  $\alpha = g(\beta)$ ,  $h = g(\beta+k) - g(\beta) = \eta(k)$  を  $\textcircled{1}$  に代入すると、 $\alpha+h = g(\beta+k)$  となる。

$$\textcircled{4} \quad F(\beta+k) - F(\beta) = f(g(\beta+k)) - f(g(\beta)) = (f'(\alpha) + \varepsilon(\eta(k)))(g(\beta+k) - g(\beta)).$$

これを  $\textcircled{3}$  と比較し、 $\textcircled{2}$  を使うと  $f'(\alpha) \neq 0$  より、

$$\frac{g(\beta+k) - g(\beta)}{k} = \frac{F'(\beta) + \delta(k)}{f'(\alpha) + \varepsilon(\eta(k))} \rightarrow \frac{F'(\beta)}{f'(\alpha)} \text{ as } k \rightarrow 0.$$

ゆえに、 $g(t)$  は  $t = \beta$  で微分可能で  $g'(\beta) = F'(\beta)/f'(\alpha)$  となることが示された。 □

同じ曲線の2つの  $C^1$  級パラメータ付け  $P(t)$  ( $a \leq t \leq b$ ) と  $Q(s)$  ( $c \leq s \leq d$ ) を考える。

そのあいだのパラメータの変数変換  $t = t(s)$  も  $C^1$  級になる。このとき、

$$\int_c^d \|Q'(s)\| ds = \int_c^d \|P'(t(s))t'(s)\| ds = \int_c^d \|P'(t(s))\| t'(s) ds = \int_a^b \|P'(t)\| dt$$

となり、その曲線の長さ  $L$  は

$$L = \int_a^b \|P'(t)\| dt = \int_c^d \|Q'(s)\| ds$$

で定義できる。