

# 3x3行列の逆行列の計算

2018-06-08

①

$\delta$ は行列式とよばれる

黒木玄

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix} \leftarrow \text{行列式} = aek + bfg + cdh - afh - bdk - ceg =: \delta \neq 0 \text{ と仮定}$$

$$\left[ \begin{array}{ccc|ccc} a & b & c & 1 & 0 & 0 \\ d & e & f & 0 & 1 & 0 \\ g & h & k & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left. \begin{array}{l} a \neq 0 \\ ae - bd \neq 0 \end{array} \right\} \text{と仮定}$$

$$\begin{aligned} & a\delta + (af - cd)(ah - bg) \\ &= a(aek + bfg + cdh - afh - bdk - ceg) \\ & \quad + aafh - abfg - acdh + bcdg \\ &= aek - bdk - aeg + bcdg \\ &= ae(ak - cg) - bd(ak - cg) \\ &= (ae - bd)(ak - cg) \end{aligned}$$

$$\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} a & b & c & 1 & 0 & 0 \\ ad & ae & af & 0 & a & 0 \\ ag & ah & ak & 0 & 0 & a \end{array} \right] \leftarrow \begin{array}{l} a \text{ をかけた} \\ \end{array}$$

$$\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} a & b & c & 1 & 0 & 0 \\ 0 & ae - bd & af - cd & -d & a & 0 \\ 0 & ah - bg & ak - cg & -g & 0 & a \end{array} \right] \leftarrow \begin{array}{l} \text{(第1行)} \times d \text{ を引いた} \\ \text{(第1行)} \times g \text{ を引いた} \end{array}$$

$$\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} a & b & c & 1 & 0 & 0 \\ 0 & ae - bd & af - cd & -d & a & 0 \\ 0 & (ae - bd)(ah - bg) & (ae - bd)(ak - cg) & -(ae - bd)g & 0 & a(ae - bd) \end{array} \right] \leftarrow ae - bd \text{ をかけた}$$

$$\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} a & b & c & 1 & 0 & 0 \\ 0 & ae - bd & af - cd & -d & a & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & \beta & -a(ah - bg) & a(ae - bd) \end{array} \right] \leftarrow \begin{array}{l} \text{(第2行)} \times (ah - bg) \text{ を引いた} \\ \end{array} \quad \leftarrow (\star)$$

$$\begin{aligned} \alpha &= (ae - bd)(ak - cg) - (af - cd)(ah - bg) \\ &= aek - aeg - abdk + bcdg - afh + abfg + acdh - bcdg = a\delta \\ \beta &= -(ae - bd)g + d(ah - bg) = -aeg + adh - bdg = a(dh - eg) \end{aligned}$$

$$\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} a\delta & b\delta & c\delta & \delta & 0 & 0 \\ 0 & (ae - bd)\delta & (af - cd)\delta & -d\delta & a\delta & 0 \\ 0 & 0 & \delta & dh - eg & -(ah - bg) & ae - bd \end{array} \right] \leftarrow \begin{array}{l} \delta \text{ をかけた} \\ a \text{ で割った} \end{array}$$

$$\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} a\delta & b\delta & 0 & \delta - c(dh - eg) & c(ah - bg) & -c(ae - bd) \\ 0 & (ae - bd)\delta & 0 & -d\delta - (af - cd)(dh - eg) & a\delta + (af - cd)(ah - bg) & -(af - cd)(ae - bd) \\ 0 & 0 & \delta & dh - eg & -(ah - bg) & ae - bd \end{array} \right] \leftarrow \begin{array}{l} \text{よく} \\ \text{引いた} \end{array}$$

$$\begin{aligned} -d\delta - (af - cd)(dh - eg) &= -d(aek + bfg + cdh - afh - bdk - ceg) - dafh + dcdh + aefg - dceg \\ &= -aedk - bdfg + bddk + aefg = ae(fg - dk) - bd(fg - dk) = (ae - bd)(fg - dk) \end{aligned}$$

$$\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} a\delta & b\delta & 0 & \delta - c(dh - eg) & c(ah - bg) & -c(ae - bd) \\ 0 & \delta & 0 & -(dk - fg) & ak - cg & -(af - cd) \\ 0 & 0 & \delta & dh - eg & -(ah - bg) & ae - bd \end{array} \right] \leftarrow ae - bd \text{ で割った}$$

(2)

$$\xrightarrow{\text{つづき}} \left[ \begin{array}{ccc|ccc} a\delta & b\delta & 0 & \delta - c(dh - eg) & c(ah - bg) & -c(ae - bd) \\ 0 & \delta & 0 & -(dk - fg) & ak - cg & -(af - cd) \\ 0 & 0 & \delta & dh - eg & -(ah - bg) & ae - bd \end{array} \right] \quad \downarrow \text{(第2行)} \times b \pm \text{(第1行)} \text{ かすく}$$

$$\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} a\delta & 0 & 0 & \delta - c(dh - eg) + b(dk - fg) & c(ah - bg) - b(ak - cg) & -c(ae - bd) + b(af - cd) \\ 0 & \delta & 0 & & & \\ 0 & 0 & \delta & & & \end{array} \right] \quad \text{上と可い}$$

$$= \left[ \begin{array}{ccc|ccc} a\delta & 0 & 0 & a(ek - fh) & -a(bk - ch) & a(bf - ce) \\ 0 & \delta & 0 & & & \\ 0 & 0 & \delta & & & \end{array} \right] \quad \text{上と可い}$$

$$\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} \delta & 0 & 0 & ek - fh & -(bk - ch) & bf - ce \\ 0 & \delta & 0 & -(dk - fg) & ak - cg & -(af - cd) \\ 0 & 0 & \delta & dh - eg & -(ah - bg) & ae - bd \end{array} \right] \quad \leftarrow a \text{ 2" けた}$$

$$\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right] \quad \text{上を}\delta\text{でわったもの} \quad \leftarrow \text{全体を}\delta\text{でわった.}$$

ゆえに,

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\delta} \begin{bmatrix} ek - fh & -(bk - ch) & bf - ce \\ -(dk - fg) & ak - cg & -(af - cd) \\ dh - eg & -(ah - bg) & ae - bd \end{bmatrix}$$

2x2行列式



$$\downarrow \quad \left| \begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array} \right| = ad - bc$$

$$= \frac{1}{\delta} \begin{bmatrix} \left| \begin{array}{cc} e & f \\ h & k \end{array} \right| & -\left| \begin{array}{cc} b & c \\ h & k \end{array} \right| & \left| \begin{array}{cc} b & c \\ e & f \end{array} \right| \\ -\left| \begin{array}{cc} d & f \\ g & k \end{array} \right| & \left| \begin{array}{cc} a & c \\ g & k \end{array} \right| & -\left| \begin{array}{cc} a & c \\ d & f \end{array} \right| \\ \left| \begin{array}{cc} d & e \\ g & h \end{array} \right| & -\left| \begin{array}{cc} a & b \\ g & h \end{array} \right| & \left| \begin{array}{cc} a & b \\ d & e \end{array} \right| \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{\delta} \begin{bmatrix} \left| \begin{array}{cc} e & f \\ h & k \end{array} \right| & -\left| \begin{array}{cc} d & f \\ g & k \end{array} \right| & \left| \begin{array}{cc} d & e \\ g & h \end{array} \right| \\ -\left| \begin{array}{cc} b & c \\ h & k \end{array} \right| & \left| \begin{array}{cc} a & c \\ g & k \end{array} \right| & -\left| \begin{array}{cc} a & b \\ g & h \end{array} \right| \\ \left| \begin{array}{cc} b & c \\ e & f \end{array} \right| & -\left| \begin{array}{cc} a & c \\ d & f \end{array} \right| & \left| \begin{array}{cc} a & b \\ d & e \end{array} \right| \end{bmatrix}^T \quad \leftarrow \text{転置.}$$

3x3の行列の逆行列のまとめ

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{bmatrix} = \frac{1}{\delta} \begin{bmatrix} \begin{matrix} e & f \\ h & k \end{matrix} & -\begin{matrix} d & f \\ g & k \end{matrix} & \begin{matrix} d & e \\ g & h \end{matrix} \\ -\begin{matrix} b & c \\ h & k \end{matrix} & \begin{matrix} a & c \\ g & k \end{matrix} & -\begin{matrix} a & b \\ g & h \end{matrix} \\ \begin{matrix} b & c \\ e & f \end{matrix} & -\begin{matrix} a & c \\ d & f \end{matrix} & \begin{matrix} a & b \\ d & e \end{matrix} \end{bmatrix}^T$$

この行列の成分を行列の余因子と呼ぶ  
minor

$$\delta = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix} = aek + bfg + cdh - afh - bdk - ceg.$$

これを行列の行列式と呼ぶ  
determinant

逆行列を行列式と余因子で表わす公式が存在する!  
分母 分子

2x2行列の行列式の復習

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}^T$$

分母は行列式  
この成分は  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  の余因子

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc$

**注意** 行列 (matrix) と行列式 (determinant) は全然異なるものである。  
 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$        $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc \leftarrow \text{スカラーになる}$

①の途中からのつづき

④

$$\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} a & b & c & 1 & 0 & 0 \\ 0 & ae-bd & af-cd & -d & a & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & \beta & -a(ah-bg) & a(ae-bd) \end{array} \right] \leftarrow \begin{array}{l} \text{← (第2行) } \times (ah-bg) \text{ を入れた} \\ \text{← (★)} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \alpha &= (ae-bd)(ah-bg) - (af-cd)(ah-bg) \\ &= aek - aceg - abd h + \cancel{bdg} - a^2fh + abfg + acdh - \cancel{bdg} = a\delta \\ \beta &= -(ae-bd)g + d(ah-bg) = -aeg + \cancel{bdg} + adh - \cancel{bdg} = a(dh-eg) \end{aligned}$$

$$\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} a & b & c & 1 & 0 & 0 \\ 0 & ae-bd & af-cd & -d & a & 0 \\ 0 & 0 & \delta & dh-eg & -(ah-bg) & ae-bd \end{array} \right]$$

$$\delta = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix} = aek + bfg + cdh - afh - bdk - ceg$$

$$\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} a & b & c & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{ae-bd}{a} & \frac{af-cd}{a} & -\frac{d}{a} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\delta}{ae-bd} & \frac{dh-eg}{ae-bd} & -\frac{ah-bg}{ae-bd} & 1 \end{array} \right]$$

これは次が成立していることを意味している。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{d}{a} & 1 & 0 \\ \frac{dh-eg}{ae-bd} & -\frac{ah-bg}{ae-bd} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & \frac{ae-bd}{a} & \frac{af-cd}{a} \\ 0 & 0 & \frac{\delta}{ae-bd} \end{bmatrix}$$

対角成分がすべて1の下三角行列 ← 上三角行列

この公式も結構重要である。

時間変数  $t$  に依存する可逆な  $n \times n$  行列  $X(t)$  は線形微分方程式

$$\frac{dX}{dt} = \Lambda X, \quad \Lambda \text{ は } n \times n \text{ の定数行列}$$

をみたしていると仮定する。  $X(t)$  は次のように表わされていると仮定する。

$$X(t) = W(t)^{-1} Z(t), \quad W(t) \text{ は対角成分がすべて1の下三角行列, } Z(t) \text{ は上三角行列}$$

$n \times n$  行列  $A$  は  $A = A_+ - A_-$ ,  $A_+$  は上三角,  $A_-$  は対角成分がすべて0の下三角行列と一意に書ける。

$$\Lambda W^{-1} Z = \Lambda X = \frac{dX}{dt} = -W^{-1} \frac{dW}{dt} W^{-1} Z + W^{-1} \frac{dZ}{dt}, \quad \therefore W \Lambda W^{-1} = \frac{dZ}{dt} Z^{-1} - \frac{dW}{dt} W^{-1}$$

$$\therefore \frac{dZ}{dt} Z^{-1} = (W \Lambda W^{-1})_+ =: B, \quad \frac{dW}{dt} W^{-1} = (W \Lambda W^{-1})_- = B - W \Lambda W^{-1}$$

$$\therefore \frac{dZ}{dt} = B Z, \quad \frac{dW}{dt} = B W - W \Lambda. \quad \leftarrow \text{これを Sato-Wilson 方程式と呼ぶ}$$

ソリトン方程式の  
佐藤理論の  
中核部分!!!

2018-06-14

(5)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 8 \end{bmatrix}^{-1} = ?$$

行列の基本変形を用いた求め方

$$\left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 7 & 8 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} \text{2倍して} \leftarrow \text{4倍して} \\ \text{7倍して} \end{array}$$

$$\longrightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & -13 & -7 & 0 & 1 \end{array} \right] \text{2倍して}$$

$$\longrightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} \leftarrow -3 \text{ がある} \\ \leftarrow -1 \text{ をかける} \end{array}$$

$$\longrightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -\frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \end{array} \right] \begin{array}{l} \text{2倍して} \leftarrow \text{3倍して} \end{array}$$

$$\longrightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 4 & -6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{10}{3} & -\frac{13}{3} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \end{array} \right] \text{2倍して}$$

$$\longrightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{8}{3} & \frac{8}{3} & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{10}{3} & -\frac{13}{3} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \end{array} \right]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 8 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -8 & 8 & -3 \\ 10 & -13 & 6 \\ -3 & 6 & -3 \end{bmatrix} \text{ であらう.}$$

検算

$$\begin{bmatrix} -8 & 8 & -3 \\ 10 & -13 & 6 \\ -3 & 6 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \leftarrow \text{自分で確認せよ.}$$

# 逆行列の公式を使う方法

6

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 8 \end{vmatrix} = 1 \cdot 5 \cdot 8 + 2 \cdot 6 \cdot 7 + 3 \cdot 4 \cdot 8 - 1 \cdot 6 \cdot 8 - 2 \cdot 4 \cdot 8 - 3 \cdot 5 \cdot 7$$

$$= 40 + 84 + 96 - 48 - 64 - 105$$

$$= 220 - 217 = 3$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 8 \end{vmatrix} = -8, \quad -\begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = 10, \quad \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -3$$

$$-\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 8 \end{vmatrix} = 8, \quad \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -13, \quad -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = 6$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -3, \quad -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 6, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -3$$

$$\therefore \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 8 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -8 & 10 & -3 \\ 8 & -13 & 6 \\ -3 & 6 & -3 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -8 & 8 & -3 \\ 10 & -13 & 6 \\ -3 & 6 & -3 \end{bmatrix} \leftarrow \text{これは前ページの結果と同じ}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}^{-1} \text{ は存在しない}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 1 \cdot 5 \cdot 9 + 2 \cdot 6 \cdot 7 + 3 \cdot 4 \cdot 8 - 1 \cdot 6 \cdot 8 - 2 \cdot 4 \cdot 9 - 3 \cdot 5 \cdot 7$$

$$= 45 + 84 + 96 - 48 - 72 - 105$$

$$= 225 - 225 = 0.$$

$\frac{1}{0}$  は不可,

$$\left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{matrix} \text{2倍してuく} \\ \text{7倍してuく} \end{matrix}$$

$$\longrightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & -12 & -7 & 0 & 1 \end{array} \right] \text{2倍してuく}$$

$$\longrightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right]$$

ここはもう  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  にできない