

検定と信頼区間: 平均の比較

- 黒木玄
- 2022-06-16～2022-06-18

このノートでは[Julia言語](https://julialang.org/) (<https://julialang.org/>)を使用している:

- [Julia言語のインストールの仕方の一例](https://nbviewer.org/github/genkuroki/msfd28/blob/master/install.ipynb) (<https://nbviewer.org/github/genkuroki/msfd28/blob/master/install.ipynb>)

自明な誤りを見つけたら、自分で訂正して読んで欲しい。大文字と小文字の混同や書き直しが不完全な場合や符号のミスは非常によくある。

このノートに書いてある式を文字通りにそのまま読んで正しいと思ってしまうとひどい目に会う可能性が高い。しかし、数が使われている文献には大抵の場合に文字通りに読むと間違っている式や主張が書いてあるので、内容を理解した上で訂正しながら読んで利用しなければいけない。実践的に数学を使う状況では他人が書いた式をそのまま信じていけない。

このノートの内容よりもさらに詳しいノートを自分で作ると勉強になるだろう。膨大な時間を取られることになるが、このノートの内容に関係することで飯を食っていく可能性がある人にはそのためにかけた時間は無駄にならないと思われる。

目次

- ▼ [1 平均の差に関するP値と信頼区間](#)
 - [1.1 平均の差に関するP値と信頼区間を使って行いたいこと](#)
 - [1.2 平均の差の検定で使用されるP値の定義](#)
- ▼ [2 データサイズを大きくしたときの信頼区間の収束の視覚化](#)
 - [2.1 信頼区間のみを静的にプロット](#)
 - [2.2 信頼区間とP値函数を同時に静的にプロット](#)
 - [2.3 動画](#)
- ▼ [3 Welchのt検定のP値と信頼区間の計算例](#)
 - ▼ [3.1 必修問題: Welchのt検定のP値と信頼区間の計算](#)
 - [3.1.1 WolframAlphaによるWelchのt検定のP値と信頼区間の計算の必修問題の解答例](#)
 - [3.1.2 Julia言語によるWelchのt検定のP値と信頼区間の計算の必修問題の解答例](#)
 - [3.1.3 Julia言語による必修問題のデータの視覚化](#)
 - [3.1.4 Julia言語による必修問題のP値函数の視覚化](#)
 - [3.1.5 R言語によるWelchのt検定のP値と信頼区間の計算の必修問題の解答例](#)
 - [3.1.6 Welchのt検定のP値と信頼区間の計算の必修問題の解答例](#)
 - ▼ [3.2 必修問題: 12歳の男子と女子の平均身長の差](#)
 - [3.2.1 WolframAlphaによる12歳の男子と女子の平均身長の差に関する必修問題の解答例](#)
 - [3.2.2 Julia言語による12歳の男子と女子の平均身長の差に関する必修問題の解答例](#)
 - [3.2.3 Julia言語による12歳の男子と女子の平均身長の差のP値函数の視覚化](#)
 - [3.2.4 R言語による12歳の男子と女子の平均身長の差に関する必修問題の解答例](#)
 - [3.2.5 12歳の男子と女子の平均身長の差に関する必修問題の解答例](#)
- ▼ [4 Welchのt検定で使う自由度の式の導出](#)
 - [4.1 2つの正規分布の標本分布の設定](#)
 - [4.2 \$\chi^2\$ 分布で近似することによる自由度の式の導出](#)
 - [4.3 t分布による近似](#)
- ▼ [5 Welchのt検定での第一種の過誤の確率の視覚化](#)
 - [5.1 異なる分散を持つ正規分布達の標本でのWelchのt検定での第一種の過誤の確率の視覚化](#)
 - [5.2 異なる分散を持つ一様分布達の標本でのWelchのt検定での第一種の過誤の確率の視覚化](#)
 - [5.3 正規分布とガンマ分布の標本でのWelchのt検定での第一種の過誤の確率の視覚化](#)
 - [5.4 一様分布とガンマ分布の標本でのWelchのt検定での第一種の過誤の確率の視覚化](#)
 - [5.5 同一のガンマ分布達の標本でのWelchのt検定での第一種の過誤の確率の視覚化](#)
 - [5.6 異なるガンマ分布達の標本でのWelchのt検定での第一種の過誤の確率の視覚化](#)
 - [5.7 正規分布と対数正規分布の標本でのWelchのt検定での第一種の過誤の確率の視覚化](#)
 - [5.8 同一の対数正規分布達の標本でのWelchのt検定での第一種の過誤の確率の視覚化](#)
 - [5.9 異なる対数正規分布達の標本でのWelchのt検定での第一種の過誤の確率の視覚化](#)

```
In [1]: 1 ENV["LINES"], ENV["COLUMNS"] = 100, 100
2 using Base.Threads
3 using BenchmarkTools
4 using DataFrames
5 using Distributions
6 using LinearAlgebra
7 using Memoization
8 using Printf
9 using QuadGK
10 using RCall
11 using Random
12 Random.seed!(4649373)
13 using Roots
14 using SpecialFunctions
15 using StaticArrays
16 using StatsBase
17 using StatsFuns
18 using StatsPlots
19 default(fmt = :png, size = (400, 250),
20         titlefontsize = 10, plot_titlefontsize = 12)
21 using SymPy
```

```
In [2]: 1 # Override the Base.show definition of SymPy.jl:
2 # https://github.com/JuliaPy/SymPy.jl/blob/29c5bfd1d10ac53014fa7fef468bc8deccadc2fc/src/types.
3
4 @eval SymPy function Base.show(io::IO, ::MIME"text/latex", x::SymbolicObject)
5     print(io, as_markdown("\\displaystyle " *
6                           sympy.latex(x, mode="plain", fold_short_frac=false)))
7 end
8 @eval SymPy function Base.show(io::IO, ::MIME"text/latex", x::AbstractArray{Sym})
9     function toeqnarray(x::Vector{Sym})
10        a = join(["\\displaystyle " *
11                  sympy.latex(x[i]) for i in 1:length(x)], "\\\\"")
12        """\\left[ \\begin{array}{r} a \\end{array} \\right]"""
13    end
14    function toeqnarray(x::AbstractArray{Sym,2})
15        sz = size(x)
16        a = join([join("\\displaystyle " .* map(sympy.latex, x[i,:]), "&")
17                  for i in 1:sz[1]], "\\\\"")
18        "\\left[ \\begin{array}{* repeat(\"r\",sz[2]) * } a \\end{array} \\right]"
19    end
20    print(io, as_markdown(toeqnarray(x)))
21 end
```

```
In [3]: 1 safemul(x, y) = x == 0 ? x : isinf(x) ? typeof(x)(Inf) : x*y
2 safediv(x, y) = x == 0 ? x : isinf(y) ? zero(y) : x/y
3
4 x ≈ y = x < y || x ≈ y
5
6 mypdf(dist, x) = pdf(dist, x)
7 mypdf(dist::DiscreteUnivariateDistribution, x) = pdf(dist, round(Int, x))
8
9 distname(dist::Distribution) = replace(string(dist), r".*}" => "")
10 myskewness(dist) = skewness(dist)
11 mykurtosis(dist) = kurtosis(dist)
12 function standardized_moment(dist::ContinuousUnivariateDistribution, m)
13     μ, σ = mean(dist), std(dist)
14     quadgk(x → (x - μ)^m * pdf(dist, x), extrema(dist)...)[1] / σ^m
15 end
16 myskewness(dist::MixtureModel{Univariate, Continuous}) =
17     standardized_moment(dist, 3)
18 mykurtosis(dist::MixtureModel{Univariate, Continuous}) =
19     standardized_moment(dist, 4) - 3
```

Out[3]: mykurtosis (generic function with 2 methods)

In [4]:

```
1 function tvalue_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; Δμ=0)
2     (x̄ - ȳ - Δμ) / √(sx²/m + sy²/n)
3 end
4
5 function tvalue_welch(x, y; Δμ=0)
6     m, x̄, sx² = length(x), mean(x), var(x)
7     n, ȳ, sy² = length(y), mean(y), var(y)
8     tvalue_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; Δμ)
9 end
10
11 function degree_of_freedom_welch(m, sx², n, sy²)
12     (sx²/m + sy²/n)² / ((sx²/m)²/(m-1) + (sy²/n)²/(n-1))
13 end
14
15 function degree_of_freedom_welch(x, y)
16     m, sx² = length(x), var(x)
17     n, sy² = length(y), var(y)
18     degree_of_freedom_welch(m, sx², n, sy²)
19 end
20
21 function pvalue_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; Δμ=0)
22     t = tvalue_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; Δμ)
23     v = degree_of_freedom_welch(m, sx², n, sy²)
24     2ccdf(TDist(v), abs(t))
25 end
26
27 function pvalue_welch(x, y; Δμ=0)
28     m, x̄, sx² = length(x), mean(x), var(x)
29     n, ȳ, sy² = length(y), mean(y), var(y)
30     pvalue_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; Δμ)
31 end
32
33 function confint_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; α=0.05)
34     v = degree_of_freedom_welch(m, sx², n, sy²)
35     c = quantile(TDist(v), 1-α/2)
36     SEhat = √(sx²/m + sy²/n)
37     [x̄-ȳ-c*SEhat, x̄-ȳ+c*SEhat]
38 end
39
40 function confint_welch(x, y; α=0.05)
41     m, x̄, sx² = length(x), mean(x), var(x)
42     n, ȳ, sy² = length(y), mean(y), var(y)
43     confint_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; α)
44 end
```


Out[4]: confint_welch (generic function with 2 methods)

In [5]:


```

1 """平均0を持つ分布のサンプルをx,yとして与えること"""
2 function plot_confint_of_diffmeans(x, y; α = 0.05,
3     xlim = nothing,
4     plot_pvaluefunc = false,
5     xtick=-100:100, kwargs...)
6     m, n = length(x), length(y)
7     if isnothing(xlim)
8         a, b = extrema([x; y])
9         a, b = a - 0.05(b-a), b + 0.05(b-a)
10    else
11        a, b = xlim
12    end
13    confidence_interval = confint_welch(x, y; α)
14    if plot_pvaluefunc
15        scatter(x, fill(-0.05, m); label="", msc=:auto, alpha=0.7, c=1)
16        scatter!(y, fill(-0.10, n); label="", msc=:auto, alpha=0.7, c=2)
17        plot!(Δμ → pvalue_welch(x, y; Δμ), a, b; label="", c=:blue)
18        plot!(confidence_interval, fill(α, 2); label="", lw=3, c=:red)
19        plot!(; ylim=(-0.15, 1.03), ytick=0:0.1:1, yguide="P-value")
20        title!("P-value func. and $(100(1-α))% conf. int. of Δμ for data of size m=$m, n=$n")
21        plot!(; size=(600, 200), leftmargin=4Plots.mm)
22    else
23        scatter(x, fill(-0.05, m); label="", msc=:auto, alpha=0.7, c=1)
24        scatter!(y, fill(-0.13, n); label="", msc=:auto, alpha=0.7, c=2)
25        plot!(confidence_interval, fill(0.06, 2); label="", lw=6, c=:red)
26        plot!(; ylim=(-0.2, 0.2), yaxis=false, ytick=false)
27        title!("$(100(1-α))% confidence interval of Δμ for data of size m=$m, n=$n")
28        plot!(; size=(600, 80))
29    end
30    plot!(; xlim=(a, b), xtick)
31    plot!(; kwargs...)
32 end
33
34 x, y = rand(Gamma(3,2)-6, 20), rand(Gamma(2,3)-6, 30)
35 plot_confint_of_diffmeans(x, y) ▷ display
36 plot_confint_of_diffmeans(x, y; plot_pvaluefunc=true)

```

95.0% confidence interval of $\Delta\mu$ for data of size $m=20, n=30$ 

Out[5]:

P-value func. and 95.0% conf. int. of $\Delta\mu$ for data of size $m=20, n=30$ 

In [6]:

```

1 rd(x) = @sprintf "%.3f" x
2
3 function plot_welch();
4     distx=Normal(0,1), m=10, distxlim=nothing,
5     disty=Normal(0,2), n=20, distylim=nothing,
6     L=10^6, M=10^4, kwargs...
7     μ_x, σ_x = mean(distx), std(distx)
8     μ_y, σ_y = mean(disty), std(disty)
9     Δμ = μ_x - μ_y
10
11    println("m = ", m,
12        ", μ_x = ", rd(μ_x),
13        ", σ_x = ", rd(σ_x),
14        ", skewness_x = ", rd(myskewness(distx)),
15        ", kurtosis_x = ", rd(mykurtosis(distx)))
16    println("n = ", n,
17        ", μ_y = ", rd(μ_y),
18        ", σ_y = ", rd(σ_y),
19        ", skewness_y = ", rd(myskewness(disty)),
20        ", kurtosis_y = ", rd(mykurtosis(disty)))
21    @show Δμ
22
23 pval = similar(zeros(), L)
24 T = similar(zeros(), L)
25 df = similar(zeros(), L)
26 tmpx = [similar(zeros(), m) for _ in 1:nthreads()]
27 tmpy = [similar(zeros(), n) for _ in 1:nthreads()]
28 @threads for i in 1:L
29     x = rand!(distx, tmpx[threadid()])
30     y = rand!(disty, tmpy[threadid()])
31     pval[i] = pvalue_welch(x, y; Δμ)
32     T[i] = tvalue_welch(x, y; Δμ)
33     df[i] = degree_of_freedom_welch(x, y)
34 end
35 ecdf_pval = ecdf(pval)
36 f(x) = ecdf_pval(x)
37 @show ȳ = mean(df)
38
39 P1 = if isnothing(distxlim)
40     plot(distx; label="", title="$(distname(distx)), m=$m")
41 else
42     plot(distx, distxlim...; label="", title="$(distname(distx)), m=$m")
43 end
44 plot!(; xguide="x", yguide="density", guidefontsize=9)
45 plot!(; leftmargin=4Plots.mm#, bottommargin=4Plots.mm)
46 plot!(; tickfontsize=6)
47
48 P2 = if isnothing(distylim)
49     plot(disty; label="", title="$(distname(disty)), n=$n")
50 else
51     plot(disty, distylim...; label="", title="$(distname(disty)), n=$n")
52 end
53 plot!(; xguide="y", yguide="density", guidefontsize=9)
54 plot!(; leftmargin=4Plots.mm#, bottommargin=4Plots.mm)
55 plot!(; tickfontsize=6)
56
57 P3 = scatter(T[1:M], df[1:M]; label="", ms=1.5, msw=0, alpha=0.3)
58 plot!(; xlim=(-5, 5), xtick=-5:5)
59 plot!(; xguide="T = T-value", yguide="v = df", guidefontsize=9)
60 plot!(; leftmargin=4Plots.mm#, bottommargin=4Plots.mm)
61 plot!(; tickfontsize=6)
62
63 P4 = stephist(T; norm=true, label="T")
64 plot!(TDist(ȳ); label="TDist(ȳ)", ls=:dash)
65 plot!(; xlim=(-5, 5), xtick=-5:5)
66 plot!(; xguide="t", yguide="density", guidefontsize=9)
67 plot!(; leftmargin=4Plots.mm#, bottommargin=4Plots.mm)
68 plot!(; tickfontsize=6)
69
70 P5 = plot(f, 0, 1; label="")
71 plot!(identity, 0, 1; label="", ls=:dot)
72 plot!(; xtick=0:0.1:1, ytick=0:0.1:1)
73 plot!(; xguide="significance level α", yguide="probability of type I error",
74         guidefontsize=9)
75 plot!(; tickfontsize=6)
76
77 P6 = plot(f, 0, 0.1; label="")

```


```

78 plot!(identity, 0, 0.1; label="", ls=:dot)
79 plot!(; xtick=0:0.01:1, ytick=0:0.01:1)
80 plot!(; xguide="significance level  $\alpha$ ", yguide="probability of type I error",
81     guidefontsize=9)
82 plot!(; tickfontsize=6)
83
84 layout = @layout [a{0.25h} b{0.25h}; c{0.25*h} d{0.25*h}; e f]
85 plot(P1, P2, P3, P4, P5, P6; size=(700, 700), layout)
86 end
87
88 plot_welch(distx=Gamma(2,3), m=40, disty=Gamma(3,2), n=80)

```

$m = 40, \mu_x = 6.000, \sigma_x = 4.243, \text{skewness}_x = 1.414, \text{kurtosis}_x = 3.000$
 $n = 80, \mu_y = 6.000, \sigma_y = 3.464, \text{skewness}_y = 1.155, \text{kurtosis}_y = 2.000$
 $\Delta\mu = 0.0$
 $\bar{v} = \text{mean}(df) = 68.32711835884052$

Out[6]:



1 平均の差に関するP値と信頼区間

このノートでは2群の平均の比較に関する Welchの t 検定 のP値とそれに付随する信頼区間について解説する。

多くの入門的教科書では、2群の平均の比較について、Welchの t 検定ではなく、Studentの t 検定について解説している場合が多い。

しかし、2群の平均の比較に関するStudentの t 検定は現実の母集団について仮定するには非現実的な「等分散の仮定」を使うので頑健ではない。

昔の教科書には正規性検定と等分散検定を通過した場合にStudentの t 検定を使うように指示しているものがあるが、その方法には様々な害がある。どのような害があるかについては

- <https://okumuralab.org/~okumura/stat/ttest.html> (<https://okumuralab.org/~okumura/stat/ttest.html>)

の「分散が等しいかどうか不明の場合」の節を参照せよ。

そこで、このノートでは思い切ってStudentの t 検定の解説を止めて、Welchの t 検定のみを解説することにした。

Welchの t 検定は一定の頑健さを持っており、母集団分布の正規性を仮定しなくても使用可能である。(ただし、誤差が大きくなる場合に関する注意は必要になる。)

1.1 平均の差に関するP値と信頼区間を使って行いたいこと

以下のようなことを行いたい。

(1) 日本にいる12歳の男子と女子をそれぞれ m 人と n 人無作為抽出して、身長を測って得た数値のデータをそれぞれ x_1, \dots, x_m , y_1, \dots, y_n と書くこととする。そのようなデータを用いて日本にいる12歳の男子と女子の平均身長の差がどれだけあるか(もしくはないか)を推定したい。

(2) 薬Xの効き目を調べるために、同一の母集団から $m + n$ 人を無作為に選んで、ランダムに選んだそのうち m 人は薬Xを与え、残りの n 人にはプラセボ(偽薬)を与えた。そして、 $m + n$ 人について治療効果を表す指標の数値を測定し、薬Xを与えた m 人分の数値は x_1, \dots, x_m でプラセボを与えた n 人分の数値は y_1, \dots, y_n であったとする。そのデータから、薬Xを与えた場合の治療効果を表す指標の平均値と与えなかつた場合の治療効果を表す指標の平均値の差がどうなっているかについて推定したい。

目標は2つの群の平均の差の信頼区間の構成である。

そのためには、検定と信頼区間の表裏一体性より、P値を適切に定義すればよい。

1.2 平均の差の検定で使用されるP値の定義

データ: m 個の実数値 x_1, \dots, x_m と n 個の実数値 y_1, \dots, y_n .

x_i 達と y_i 達の標本平均と不偏分散を以下のように書くこととする:

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i, \quad s_x^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2,$$
$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad s_y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2.$$

統計モデル: 平均 μ_x と分散 σ_x^2 を持つ確率分布 D_x のサイズ m の標本分布 D_x^m と平均 μ_y と分散 σ_y^2 を持つ確率分布 D_y のサイズ n の標本分布 D_y^n の直積分布 $D_x^m \times D_y^n$ を統計モデルとして採用する。

以下では簡単のため D_x も D_y も連続分布であると仮定し、それぞれの確率密度函数を $p_x(x), p_y(y)$ と書くこととする。このとき、統計モデル $D_x^m \times D_y^n$ の確率密度函数は

$$p(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = p_x(x_1) \cdots p_x(x_m) \cdot p_y(y_1) \cdots p_y(y_n)$$

になる。この確率分布に従う確率変数達(独立になる)を $X_1, \dots, X_m, Y_1, \dots, Y_n$ と書き、 X_i 達と Y_i 達の標本平均と不偏分散を以下のように書くこととする:

$$\bar{X} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i, \quad S_x^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2,$$
$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i, \quad S_y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2.$$

この統計モデルが適用可能な場合: 上の統計モデルでは、データの数値 x_i, y_i の生成のされ方のモデル化である X_i, Y_i 達が独立な確率変数になっており、 X_i 達は同じ分布に従い、 Y_i 達も同じ分布に従うが、 X_i 達と Y_i 達が従う分布は違っていてよいという設定になっている。データの生成のされ方がこの条件を満たしていない場合には、上の統計モデルの適用は不適切になる。

例えば、 $m = n$ でデータ中の x_i の値と y_i の値が関係している場合には上のモデルの使用は不適切になる。例えば、 i 番目の人の薬を与える前の数値が x_i で薬を与えた後の数値が y_i の場合には y_i の値は x_i の値に依存して決まるので、このような場合に上のモデルの適用は不適切になる。そのような場合には、例えばそれらの差に平均の値に関する検定や信頼区間を使用すればよい。

検定したい仮説: $\mu_x - \mu_y = \Delta\mu$ ($\Delta\mu$ は具体的な数値)。

中心極限定理: モデル内確率変数としての2つの標本平均達の分布について、中心極限定理による正規分布近似が使えると仮定する。

\bar{X}, \bar{Y} の平均(期待値)と分散は以下のようになる:

$$E[\bar{X}] = \mu_x, \quad E[\bar{Y}] = \mu_y, \quad \text{var}(\bar{X}) = \frac{\sigma_x^2}{m}, \quad \text{var}(\bar{Y}) = \frac{\sigma_y^2}{n}.$$

さらに、 \bar{X} と \bar{Y} が確率変数として独立であることより、

$$E[\bar{X} - \bar{Y}] = \mu_x - \mu_y, \quad \text{var}(\bar{X} - \bar{Y}) = \frac{\sigma_x^2}{m} + \frac{\sigma_y^2}{n}.$$

さらに、中心極限定理より、次の近似が使える:

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim \text{Normal}\left(\mu_x - \mu_y, \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{m} + \frac{\sigma_y^2}{n}}\right), \quad \text{approximately.}$$

すなわち、

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{m} + \frac{\sigma_y^2}{n}}} \sim \text{Normal}(0, 1), \quad \text{approximately.}$$

大数の法則: モデル内確率変数としての不偏分散 S_x^2, S_y^2 でモデルの分散 σ_x^2, σ_y^2 がよく近似されていると仮定する。

このとき、次の近似が使える。

$$T := \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{S_x^2}{m} + \frac{S_y^2}{n}}} \sim \text{Normal}(0, 1), \quad \text{approximately.}$$

P値の定義: これを用いて、具体的に与えられた数値 $\Delta\mu$ に関する仮説「 $\mu_x - \mu_y = \Delta\mu$ 」のP値を以下のように定義する。まず、データの数値の t 値 $t = t(\Delta\mu)$ を次のように定義する:

$$t = t(\Delta\mu) = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \Delta\mu}{\sqrt{\frac{s_x^2}{m} + \frac{s_y^2}{n}}}.$$

仮説「 $\mu_x - \mu_y = \Delta\mu$ 」のP値を、その仮説下のモデル内の確率変数としての t 値 T の値の絶対値がデータから計算した t 値 $t = t(\Delta\mu)$ の絶対値以上になる確率の近似値として定義する:

$$\text{pvalue}_{\text{Normal}}(\bar{x}, \bar{y}, s_x^2, s_y^2 | m, n, \mu_x - \mu_y = \Delta\mu) = 2(1 - \text{cdf}(\text{Normal}(0, 1), |t(\Delta\mu)|)).$$

しかし、実際に使用されるのは次に定義する t 分布を使って定義されたP値の方である。

t分布を使って補正されたP値の定義: 上のP値の t 分布版を定義しよう。

天下り的になってしまふが、自由度 ν を次のように定義する(これの導出は別の節で行う):

$$\nu = \frac{\left(\frac{s_x^2}{m} + \frac{s_y^2}{n}\right)^2}{\frac{(s_x^2/m)^2}{m-1} + \frac{(s_y^2/n)^2}{n-1}}.$$

仮に $s_x^2 = s_y^2, m = n$ だとすると、 $\nu = 2n - 2$ となる。

一般にこの ν は整数にならないがそのまま用いる。

この ν を用いて t 分布を使って計算されるP値を次のように定める:

$$\text{pvalue}_{\text{Welch}}(\bar{x}, \bar{y}, s_x^2, s_y^2 | m, n, \mu_x - \mu_y = \Delta\mu) = 2(1 - \text{cdf}(\text{TDist}(\nu), |t(\Delta\mu)|)).$$

以下ではこれを使うことにする。このP値は **Welchの t 検定** のP値である。

ν の定義を覚える必要はない。 m, n が大きいならば、 ν も大きくなり、自由度 ν の t 分布 $\text{TDist}(\nu)$ は標準正規分布 $\text{Normal}(0, 1)$ でよく近似されるようになるので、 ν の値がどうであるかを実質的に気にする必要がなくなることにも注意せよ。この t 分布による補正が有効なのは特別な場合に限るが、有効でない場合にも害はないのでこちらの方を使うことにする。

信頼区間: Welchの t 検定のP値から定まる信頼区間は以下のように書ける。

まず、自由度 ν の t 分布において $t_{\nu, \alpha/2}$ 以上になる確率は $\alpha/2$ になると仮定する：

$$t_{\nu, \alpha/2} = \text{quantile}(\text{TDist}(\nu), 1 - \alpha/2).$$

このとき、平均の差 $\mu_x - \mu_y$ の信頼度 $1 - \alpha$ の信頼区間が次のように定義される：

$$\text{confint}_{\text{Welch}}(\bar{x}, \bar{y}, s_x^2, s_y^2 | m, n, \alpha) = \left[\bar{x} - \bar{y} - t_{\nu, \alpha/2} \sqrt{\frac{s_x^2}{m} + \frac{s_y^2}{n}}, \bar{x} - \bar{y} + t_{\nu, \alpha/2} \sqrt{\frac{s_x^2}{m} + \frac{s_y^2}{n}} \right].$$

2 データサイズを大きくしたときの信頼区間の収束の視覚化


```
In [7]: 1 # テストデータの生成
2 # 後で使う函数との相性で平均が0の分布で標本を生成する必要がある。
3
4 Random.seed!(845145105963) # はよこい しごと ごくろうさん
5 distx, disty = Gamma(2,1), Gamma(5,1)
6 distx, disty = distx-mean(distx), disty-mean(disty)
7 x = rand(distx, 320)
8 y = rand(disty, 640)
9 a, b = extrema([x; y])
10 xlim = (a - 0.05(b - a), b + 0.05(b-a))
```

Out[7]: (-4.849858804201334, 10.08008066780289)

2.1 信頼区間のみを静的にプロット


```
In [8]: 1 plot_confint_of_diffmeans(x[1:5], y[1:10]; xlim)
```

Out[8]: 95.0% confidence interval of $\Delta\mu$ for data of size $m=5, n=10$




```
In [9]: 1 plot_confint_of_diffmeans(x[1:20], y[1:40]; xlim)
```

Out[9]: 95.0% confidence interval of $\Delta\mu$ for data of size $m=20, n=40$




```
In [10]: 1 plot_confint_of_diffmeans(x[1:80], y[1:160]; xlim)
```

Out[10]: 95.0% confidence interval of $\Delta\mu$ for data of size $m=80, n=160$



```
In [11]: 1 plot_confint_of_diffmeans(x[1:320], y[1:640]; xlim)
```


Out[11]: 95.0% confidence interval of $\Delta\mu$ for data of size $m=320, n=640$



2.2 信頼区間とP値函数を同時に静的にプロット


```
In [12]: 1 plot_confint_of_diffmeans(x[1:5], y[1:10]; xlim, plot_pvaluefunc=true)
```

Out[12]: P-value func. and 95.0% conf. int. of $\Delta\mu$ for data of size m=5, n=10




```
In [13]: 1 plot_confint_of_diffmeans(x[1:20], y[1:40]; xlim, plot_pvaluefunc=true)
```

Out[13]: P-value func. and 95.0% conf. int. of $\Delta\mu$ for data of size m=20, n=40




```
In [14]: 1 plot_confint_of_diffmeans(x[1:80], y[1:160]; xlim, plot_pvaluefunc=true)
```

Out[14]: P-value func. and 95.0% conf. int. of $\Delta\mu$ for data of size m=80, n=160



```
In [15]: 1 plot_confint_of_diffmeans(x[1:320], y[1:640]; xlim, plot_pvaluefunc=true)
```


Out[15]: P-value func. and 95.0% conf. int. of $\Delta\mu$ for data of size m=320, n=640



2.3 動画

```
In [16]: 1 L = length(x)
2 anim = @animate for m in [fill(5, 20); 10:L; fill(L, 20)]
3 plot_confint_of_diffmeans(x[1:m], y[1:2m]; xlim, plot_pvaluefunc=true)
4 end
5 gif(anim, "images/confint_of_diffmeans.gif")
[ Info: Saved animation to
fn = D:\OneDrive\work\Statistics\2022\images\confint_of_diffmeans.gif
@ Plots D:\.julia\packages\Plots\MzLN\src\animation.jl:130
```

Out[16]: P-value func. and 95.0% conf. int. of $\Delta\mu$ for data of size $m=5, n=10$



このノートのPDF版で上の動画をみることはできない。しかし、以下の場所でみることができる:

- https://github.com/genkuroki/Statistics/blob/master/2022/images/confint_of_diffmeans.gif
(https://github.com/genkuroki/Statistics/blob/master/2022/images/confint_of_diffmeans.gif)

3 Welchの t 検定のP値と信頼区間の計算例

3.1 必修問題: Welchの t 検定のP値と信頼区間の計算

サイズが $m = 20, n = 30$ のデータ

```
x = [19.2, 22.7, 7.8, 138.5, 70.5, 44.3, 84.0, 35.6, 72.4, 23.9,
11.7, 26.6, 73.8, 118.3, 54.2, 57.6, 40.5, 117.4, 102.3, 67.6]
```

```
y = [44.3, 66.9, 62.9, 78.4, 71.2, 32.5, 111.4, 38.2, 68.2, 50.7,
74.5, 46.2, 65.7, 58.7, 42.5, 57.4, 63.0, 67.9, 72.1, 117.7,
124.1, 48.9, 91.8, 80.8, 60.2, 76.8, 76.3, 59.9, 70.7, 46.4]
```

について以下を求めよ。

- (1) 仮説 $\mu_x - \mu_y = 0$ のP値.
- (2) 仮説 $\mu_x - \mu_y = -30$ のP値.
- (3) Welchの t 検定に付随する 95% 信頼区間.

3.1.1 WolframAlphaによるWelchの t 検定のP値と信頼区間の計算の必修問題の解答例

```
mean {19.2, 22.7, 7.8, 138.5, 70.5, 44.3, 84.0, 35.6, 72.4, 23.9, 11.7, 26.6, 73.8, 118.3, 54.2,
57.6, 40.5, 117.4, 102.3, 67.6} → 実行(https://www.wolframalpha.com/input?i=mean+%7B19.2%2C+22.7%2C+7.8%2C+138.5%2C+70.5%2C+44.3%2C+84.0%2C+35.6%2C+72.4%2C+23.9%2C+11.7%2C+26.6%2C+40.5%2C+117.4%2C+102.3%2C+67.6%2C+54.2%2C+118.3%2C+73.8%2C+138.5%2C+7.8%2C+22.7%2C+19.2%2C%7D)
→ 59.445 =  $\bar{x}$ 
```

```
var {19.2, 22.7, 7.8, 138.5, 70.5, 44.3, 84.0, 35.6, 72.4, 23.9, 11.7, 26.6, 73.8, 118.3, 54.2,
57.6, 40.5, 117.4, 102.3, 67.6} → 実行(https://www.wolframalpha.com/input?i=var+%7B19.2%2C+22.7%2C+7.8%2C+138.5%2C+70.5%2C+44.3%2C+84.0%2C+35.6%2C+72.4%2C+23.9%2C+11.7%2C+26.6%2C+40.5%2C+117.4%2C+102.3%2C+67.6%2C+54.2%2C+118.3%2C+73.8%2C+138.5%2C+7.8%2C+22.7%2C+19.2%2C%7D)
→ 1448.48 =  $s_x^2$ 
```

```
mean {44.3, 66.9, 62.9, 78.4, 71.2, 32.5, 111.4, 38.2, 68.2, 50.7, 74.5, 46.2, 65.7, 58.7, 42.5,
57.4, 63.0, 67.9, 72.1, 117.7, 124.1, 48.9, 91.8, 80.8, 60.2, 76.8, 76.3, 59.9, 70.7, 46.4} → 実行(https://www.wolframalpha.com/input?i=mean+%7B44.3%2C+66.9%2C+62.9%2C+78.4%2C+71.2%2C+32.5%2C+111.4%2C+38.2%2C+68.2%2C+50.7%2C+74.5%2C+46.2%2C+65.7%2C+58.7%2C+42.5%2C+57.4%2C+63.0%2C+67.9%2C+72.1%2C+117.7%2C+124.1%2C+48.9%2C+91.8%2C+80.8%2C+60.2%2C+76.8%2C+76.3%2C+59.9%2C+70.7%2C+46.4%2C%7D)
```

i=mean+%7B44.3%2C+66.9%2C+62.9%2C+78.4%2C+71.2%2C+32.5%2C+111.4%2C+38.2%2C+68.2%2C+50.7%2C+74.5%2C+4
→ 67.5433 = \bar{y}

var {44.3, 66.9, 62.9, 78.4, 71.2, 32.5, 111.4, 38.2, 68.2, 50.7, 74.5, 46.2, 65.7, 58.7, 42.5,
57.4, 63.0, 67.9, 72.1, 117.7, 124.1, 48.9, 91.8, 80.8, 60.2, 76.8, 76.3, 59.9, 70.7, 46.4} → 実行 (<https://www.wolframalpha.com/input?i=var+%7B44.3%2C+66.9%2C+62.9%2C+78.4%2C+71.2%2C+32.5%2C+111.4%2C+38.2%2C+68.2%2C+50.7%2C+74.5%2C+46.4>)

→ 479.481 = s_y^2

(v/m+w/n)^2/((v/m)^2/(m-1)+(w/n)^2/(n-1)) where {m=20, x=59.445, v=1448.48, n=30, y=67.5433,
w=479.481} → 実行 ([https://www.wolframalpha.com/input?i=\(v/m+w/n\)^2/\(\(v/m\)^2/\(m-1\)+\(w/n\)^2/\(n-1\)\)%20where%20{m=20,%20x=59.445,%20v=1448.48,%20n=30,%20y=67.5433,%20w=479.481}](https://www.wolframalpha.com/input?i=(v/m+w/n)^2/((v/m)^2/(m-1)+(w/n)^2/(n-1))%20where%20{m=20,%20x=59.445,%20v=1448.48,%20n=30,%20y=67.5433,%20w=479.481}))

i=%28v%2Fm%2Bw%2Fn%29%5E2%2F%28v%2Fm%29%5E2%2F%28m-1%29%2B%28w%2Fn%29%5E2%2F%28n-
1%29%29+where+%7Bm%3D20%2C+x%3D59.445%2C+v%3D1448.48%2C+n%3D30%2C+y%3D67.5433%2C+w%3D479.481%7
→ 27.4358 = ν (自由度)

(1)

(x-y-0)/sqrt(v/m+w/n) where {m=20, x=59.445, v=1448.48, n=30, y=67.5433, w=479.481} → 実行
([https://www.wolframalpha.com/input?i=\(x-y-0\)/sqrt\(v/m+w/n\)%20where%20{m=20,%20x=59.445,%20v=1448.48,%20n=30,%20y=67.5433,%20w=479.481}](https://www.wolframalpha.com/input?i=(x-y-0)/sqrt(v/m+w/n)%20where%20{m=20,%20x=59.445,%20v=1448.48,%20n=30,%20y=67.5433,%20w=479.481}))
→ -0.861294 = t (t値)

2(1 - cdf(TDistribution(27.4358), 0.861294)) → 実行 (<https://www.wolframalpha.com/input?i=2%281+-cdf%28TDistribution%2827.4358%29%2C+0.861294%29%29>) → 0.396541 ((1)のP値)

(2)

(x-y+30)/sqrt(v/m+w/n) where {m=20, x=59.445, v=1448.48, n=30, y=67.5433, w=479.481} → 実行
([https://www.wolframalpha.com/input?i=\(x-y+30\)/sqrt\(v/m+w/n\)%20where%20{m=20,%20x=59.445,%20v=1448.48,%20n=30,%20y=67.5433,%20w=479.481}](https://www.wolframalpha.com/input?i=(x-y+30)/sqrt(v/m+w/n)%20where%20{m=20,%20x=59.445,%20v=1448.48,%20n=30,%20y=67.5433,%20w=479.481}))
→ 2.32935 = t (t値)

2(1 - cdf(TDistribution(27.4358), 2.32935)) → 実行 (<https://www.wolframalpha.com/input?i=2%281+-cdf%28TDistribution%2827.4358%29%2C+2.32935%29%29>) → 0.0274389 ((2)のP値)

(3)

quantile(TDistribution(27.4358), 0.975) → 実行 (<https://www.wolframalpha.com/input?i=quantile%28TDistribution%2827.4358%29%2C+0.975%29>) → 2.05031 = $t_{\nu,\alpha/2}$

{x-y-2.05031*sqrt(v/m+w/n), x-y+2.05031*sqrt(v/m+w/n)} where {m=20, x=59.445, v=1448.48, n=30,
y=67.5433, w=479.481} → 実行 ([https://www.wolframalpha.com/input?i=%7Bx-y-2.05031*sqrt\(v/m+w/n\),x-y+2.05031*sqrt\(v/m+w/n\)%7D+where%20{m=20,%20x=59.445,%20v=1448.48,%20n=30,%20y=67.5433,%20w=479.481}](https://www.wolframalpha.com/input?i=%7Bx-y-2.05031*sqrt(v/m+w/n),x-y+2.05031*sqrt(v/m+w/n)%7D+where%20{m=20,%20x=59.445,%20v=1448.48,%20n=30,%20y=67.5433,%20w=479.481}))
→ {-27.3763, 11.1797} ((3)の信頼区間)

3.1.2 Julia言語によるWelchのt検定のP値と信頼区間の計算の必修問題の解答例

函数の定義についてはこのノートの最初の方を見よ。

In [17]:

```
1 x = [19.2, 22.7, 7.8, 138.5, 70.5, 44.3, 84.0, 35.6, 72.4, 23.9,  
2 11.7, 26.6, 73.8, 118.3, 54.2, 57.6, 40.5, 117.4, 102.3, 67.6]  
3 y = [44.3, 66.9, 62.9, 78.4, 71.2, 32.5, 111.4, 38.2, 68.2, 50.7,  
4 74.5, 46.2, 65.7, 58.7, 42.5, 57.4, 63.0, 67.9, 72.1, 117.7,  
5 124.1, 48.9, 91.8, 80.8, 60.2, 76.8, 76.3, 59.9, 70.7, 46.4]  
6 @show length(x)  
7 @show mean(x)  
8 @show std(x)  
9 @show length(y)  
10 @show mean(y)  
11 @show std(y)  
12 @show degree_of_freedom_welch(x, y);
```

```
length(x) = 20  
mean(x) = 59.44499999999999  
std(x) = 38.05893594496774  
length(y) = 30  
mean(y) = 67.54333333333334  
std(y) = 21.897058270907998  
degree_of_freedom_welch(x, y) = 27.43582631782945
```

```
In [18]: 1 # (1)
2 @show tvalue_welch(x, y; Δμ = 0)
3 @show pvalue_welch(x, y; Δμ = 0);
```

tvalue_welch(x, y; Δμ = 0) = -0.8612965858138025
 pvalue_welch(x, y; Δμ = 0) = 0.39653998689489345

```
In [19]: 1 # (2)
2 @show tvalue_welch(x, y; Δμ = -30)
3 @show pvalue_welch(x, y; Δμ = -30);
```

tvalue_welch(x, y; Δμ = -30) = 2.3293472801356576
 pvalue_welch(x, y; Δμ = -30) = 0.027439073239531347


```
In [20]: 1 # (3)
2 @show confint_welch(x, y; α=0.05);
```

confint_welch(x, y; α = 0.05) = [-27.376321534615272, 11.179654867948585]

3.1.3 Julia言語による必修問題のデータの視覚化

```
In [21]: 1 ecdf_x, ecdf_y = ecdf(x), ecdf(y)
2 plot(; legend=:bottomright, ytick=0:0.1:1)
3 plot!(x → ecdf_x(x), -10, 170; label="ecdf of x")
4 plot!(x → ecdf_y(x), -10, 170; label="ecdf of y")
```

Out[21]:



x に対してデータ中の x 以下の要素の個数の割合を対応させる函数をデータの経験累積分布函数(empirical cumulative distribution function, ecdf)と呼ぶ. 上のグラフはデータ x, y の経験累積分布函数のプロットである.


経験分布函数のプロットには、ヒストグラムと違って、BIN(横軸の分割)の仕方に神経を使わずにプロットしても問題がないという利点がある. 欠点は直観的に意味を把握できず、少し考えなければグラフを適切に解釈できないことである.

上のecdf達のグラフからデータxはデータyよりも広く分布していることがわかる.

3.1.4 Julia言語による必修問題のP値函数の視覚化

```
In [22]: 1 plot(Δμ → pvalue_welch(x, y; Δμ), -40, 30; label="P-value function")
2 vline!([mean(x)-mean(y)]; label="x̄ - ȳ", ls=:dash)
3 plot!(; xtick=-100:10:100, ytick=0:0.1:1)
```

Out[22]:



3.1.5 R言語によるWelchのt検定のP値と信頼区間の計算の必修問題の解答例

```
In [23]: 1 # (1), (3)
2 @rput x y
3 R"""\t.test(x, y)"""
```

```
Out[23]: RObject{VecSxp}
```

```
Welch Two Sample t-test

data: x and y
t = -0.8613, df = 27.436, p-value = 0.3965
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-27.37632 11.17965
sample estimates:
mean of x mean of y
59.44500 67.54333
```

```
In [24]: 1 # (2), (3)
2 R"""\t.test(x, y, mu=-30)"""
```

```
Out[24]: RObject{VecSxp}
```

```
Welch Two Sample t-test

data: x and y
t = 2.3293, df = 27.436, p-value = 0.02744
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to -30
95 percent confidence interval:
-27.37632 11.17965
sample estimates:
mean of x mean of y
59.44500 67.54333
```

3.1.6 Welchのt検定のP値と信頼区間の計算の必修問題の解答例

- (1) 0.3965
- (2) 0.02744
- (3) [-27.38, 11.18]

3.2 必修問題: 12歳の男子と女子の平均身長の差

国民健康・栄養調査14 身長・体重の平均値及び標準偏差 (<https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003224177>)における2012年と2018年の12歳の男女のデータによれば、男子 m 人の身長のデータの標本平均 \bar{x} と標本分散の平方根 s_x と女子 n 人の身長のデータの標本平均 \bar{y} と不偏分散の平方根 s_y は以下の値になった。

	m	\bar{x}	s_x	n	\bar{y}	s_y
2012	111	149.9 cm	7.1 cm	131	151.1 cm	6.3 cm
2018	31	153.1 cm	7.9 cm	19	150.1 cm	5.7 cm

このデータについて以下を計算せよ:

- (1) 2012年のデータについて、仮説「平均の差は $\mu_x - \mu_y = 0$ である」に関するWelchのt検定のP値.
- (2) 2012年のデータについて、平均の差 $\mu_x - \mu_y$ に関するWelchのt検定に付随する 95% 信頼区間.
- (3) 2018年のデータについて、仮説「平均の差は $\mu_x - \mu_y = 0$ である」に関するWelchのt検定のP値.
- (4) 2018年のデータについて、平均の差 $\mu_x - \mu_y$ に関するWelchのt検定に付随する 95% 信頼区間.
- (5) 信頼区間の幅がどのようにどのような理由で変わったか?

3.2.1 WolframAlphaによる12歳の男子と女子の平均身長の差に関する必修問題の解答例

以下 $\bar{x}, s_x^2, \bar{y}, s_y^2$ をそれぞれ x, v, y, w と書く。

- (1)

$(x-y)/\sqrt{v/m+w/n}$ where $\{m=111, x=149.9, v=7.1^2, n=131, y=151.1, w=6.3^2\} \rightarrow$ 実行
<https://www.wolframalpha.com/input/?i=%28x-y%29%2Fsqrt%28v%2Fm%2Bw%2Fn%29+where+%7Bm%3D111+x%3D149.9%2C+v%3D7.1%5E2%2C+n%3D131%2C+y%3D15>
 $\rightarrow -1.37911 = t$ (t値)

$(v/m+w/n)^2/((v/m)^2/(m-1)+(w/n)^2/(n-1))$ where $\{m=111, x=149.9, v=7.1^2, n=131, y=151.1, w=6.3^2\} \rightarrow$ 実行
<https://www.wolframalpha.com/input/?i=%28v%2Fm%2Bw%2Fn%29%29%5E2%2F%28v%2Fm%29%5E2%2F%28m-1%29%2B%28w%2Fn%29%5E2%2F%28n-1%29%29+where+%7Bm%3D111+x%3D149.9%2C+v%3D7.1%5E2%2C+n%3D131%2C+y%3D151.1%2C+w%3D6.3%5E2%7D>
 $\rightarrow 222.089 = \nu$ (自由度)

$2(1 - cdf(TDistribution(222.089), 1.37911)) \rightarrow$ 実行
<https://www.wolframalpha.com/input/?i=2%281+-cdf%28TDistribution%28222.089%29%2C+1.37911%29%29> $\rightarrow 0.169248$ (P値)

(2)

$quantile(TDistribution(222.089), 0.975) \rightarrow$ 実行
<https://www.wolframalpha.com/input/?i=quantile%28TDistribution%28222.089%29%2C+0.975%29> $\rightarrow 1.9707 = t_{\nu,\alpha/2}$

$\{x-y-1.9707*\sqrt{v/m+w/n}, x-y+1.9707*\sqrt{v/m+w/n}\}$ where $\{m=111, x=149.9, v=7.1^2, n=131, y=151.1, w=6.3^2\} \rightarrow$ 実行
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%7Bx-y-1.9707*sqrt%28v%2Fm%2Bw%2Fn%29%29+where+%7Bm%3D111+x%3D149.9%2C+v%3D7.1%5E2%2C+n%3D131%2C+y%3D151.1%2C+w%3D6.3%5E2%7D
 $\rightarrow \{-2.91476, 0.51476\}$ (95%信頼区間)

(3)

$(x-y)/\sqrt{v/m+w/n}$ where $\{m=31, x=153.1, v=7.9^2, n=19, y=150.1, w=5.7^2\} \rightarrow$ 実行
<https://www.wolframalpha.com/input/?i=%28x-y%29%2Fsqrt%28v%2Fm%2Bw%2Fn%29+where+%7Bm%3D31+x%3D153.1%2C+v%3D7.9%5E2%2C+n%3D19%2C+y%3D150.1%2C+w%3D5.7%5E2%7D>
 $\rightarrow 1.55475 = t$ (t値)

$(v/m+w/n)^2/((v/m)^2/(m-1)+(w/n)^2/(n-1))$ where $\{m=31, x=153.1, v=7.9^2, n=19, y=150.1, w=5.7^2\} \rightarrow$ 実行
<https://www.wolframalpha.com/input/?i=%28v%2Fm%2Bw%2Fn%29%29%5E2%2F%28v%2Fm%29%5E2%2F%28m-1%29%2B%28w%2Fn%29%5E2%2F%28n-1%29%29+where+%7Bm%3D31+x%3D153.1%2C+v%3D7.9%5E2%2C+n%3D19%2C+y%3D150.1%2C+w%3D5.7%5E2%7D>
 $\rightarrow 46.5881 = \nu$ (自由度)

$2(1 - cdf(TDistribution(46.5881), 1.55475)) \rightarrow$ 実行
<https://www.wolframalpha.com/input/?i=2%281+-cdf%28TDistribution%2846.5881%29%2C+1.55475%29%29> $\rightarrow 0.126773$ (P値)

(4)

$quantile(TDistribution(46.5881), 0.975) \rightarrow$ 実行
<https://www.wolframalpha.com/input/?i=quantile%28TDistribution%2846.5881%29%2C+0.975%29> $\rightarrow 2.01221 = t_{\nu,\alpha/2}$

$\{x-y-2.01221*\sqrt{v/m+w/n}, x-y+2.01221*\sqrt{v/m+w/n}\}$ where $\{m=31, x=153.1, v=7.9^2, n=19, y=150.1, w=5.7^2\} \rightarrow$ 実行
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%7Bx-y-2.01221*sqrt%28v%2Fm%2Bw%2Fn%29%29+where+%7Bm%3D31+x%3D153.1%2C+v%3D7.9%5E2%2C+n%3D19%2C+y%3D150.1%2C+w%3D5.7%5E2%7D
 $\rightarrow \{-0.882692, 6.88269\}$ (95%信頼区間)

3.2.2 Julia言語による12歳の男子と女子の平均身長の差に関する必修問題の解答例

函数の定義についてはこのノートの最初の方を見よ。

In [25]:

```
1 # (1), (2)
2 m, x̄, sx² = 111, 149.9, 7.1^2
3 n, ȳ, sy² = 131, 151.1, 6.3^2
4 @show tvalue_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; Δμ=0)
5 @show degree_of_freedom_welch(m, sx², n, sy²)
6 @show pvalue_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; Δμ=0)
7 @show confint_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; α=0.05);

tvalue_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; Δμ = 0) = -1.3791088014266908
degree_of_freedom_welch(m, sx², n, sy²) = 222.08949764026912
pvalue_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; Δμ = 0) = 0.16924845911510278
confint_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; α = 0.05) = [-2.9147622064129749, 0.5147622064129749]
```


```
In [26]: 1 # (3), (4)
2 m, x̄, sx² = 31, 153.1, 7.9^2
3 n, ȳ, sy² = 19, 150.1, 5.7^2
4 @show tvalue_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; Δμ=0)
5 @show degree_of_freedom_welch(m, sx², n, sy²)
6 @show pvalue_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; Δμ=0)
7 @show confint_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; α=0.05);

tvalue_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; Δμ = 0) = 1.5547535841186384
degree_of_freedom_welch(m, sx², n, sy²) = 46.58809963805082
pvalue_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; Δμ = 0) = 0.12677251777391707
confint_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; α = 0.05) = [-0.8826927055711793, 6.882692705571179]
```

3.2.3 Julia言語による12歳の男子と女子の平均身長の差のP値函数の視覚化

```
In [27]: 1 plot()
2 m, x̄, sx² = 111, 149.9, 7.1^2
3 n, ȳ, sy² = 131, 151.1, 6.3^2
4 plot!(Δμ → pvalue_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; Δμ), -5, 9; label="2012", c=1)
5 vline!([x̄-ȳ]; label="", ls=:dash, c=1)
6 m, x̄, sx² = 31, 153.1, 7.9^2
7 n, ȳ, sy² = 19, 150.1, 5.7^2
8 plot!(Δμ → pvalue_welch(m, x̄, sx², n, ȳ, sy²; Δμ), -5, 9; label="2018", c=2)
9 vline!([x̄-ȳ]; label="", ls=:dash, c=2)
10 plot!(; xtick=-100:1:100, ytick=0:0.1:1)
11 vline!([0]; label="", ls=:dot, c=:black)
12 title!("P-value functions")
```

Out[27]: P-value functions



3.2.4 R言語による12歳の男子と女子の平均身長の差に関する必修問題の解答例

以下のように与えられた m, \bar{x}, s_x^2 に対して、そのような標本平均と不偏分散を持つ擬似的なデータを構成すれば `t.test` フィルで簡単に計算できる。

```
In [28]: 1 function fakedata(m, x̄, sx²)
2   if isodd(m)
3     [(x̄ + (-1)^k*/sx² for k in 1:m-1)...; x̄]
4   else
5     [(x̄ + (-1)^k*/sx² for k in 1:m-2)...; x̄-√(sx²/2); x̄+√(sx²/2)]
6   end
7 end
8
9 @show x = fakedata(7, 10, 3^2)
10 @show length(x), mean(x), std(x)
11 println()
12 @show x = fakedata(6, 10, 3^2)
13 @show length(x), mean(x), std(x);
```

```
x = fakedata(7, 10, 3 ^ 2) = [7.0, 13.0, 7.0, 13.0, 7.0, 13.0, 10.0]
(length(x), mean(x), std(x)) = (7, 10.0, 3.0)
```

```
x = fakedata(6, 10, 3 ^ 2) = [7.0, 13.0, 7.0, 13.0, 7.878679656440358, 12.121320343559642]
(length(x), mean(x), std(x)) = (6, 10.0, 3.0)
```

```
In [29]: 1 # (1), (2)
2 m, x̄, sx² = 111, 149.9, 7.1^2
3 n, ȳ, sy² = 131, 151.1, 6.3^2
4 x = fakedata(m, x̄, sx²)
5 y = fakedata(n, ȳ, sy²)
6 @show length(x), mean(x), std(x)
7 @show length(y), mean(y), std(y)
8 @rput x y
9 R"""
10 t.test(x, y, conf.level=0.95)
11 """
```

```
(length(x), mean(x), std(x)) = (111, 149.89999999999998, 7.099999999999997)
(length(y), mean(y), std(y)) = (131, 151.1, 6.300000000000011)
```

Out[29]: RObject{VecSxp}

```
Welch Two Sample t-test

data: x and y
t = -1.3791, df = 222.09, p-value = 0.1692
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-2.9147622 0.5147622
sample estimates:
mean of x mean of y
149.9 151.1
```

```
In [30]: 1 # (3), (4)
2 m, x̄, sx² = 31, 153.1, 7.9^2
3 n, ȳ, sy² = 19, 150.1, 5.7^2
4 x = fakedata(m, x̄, sx²)
5 y = fakedata(n, ȳ, sy²)
6 @show length(x), mean(x), std(x)
7 @show length(y), mean(y), std(y)
8 @rput x y
9 R"""
10 t.test(x, y, conf.level=0.95)
11 """
```

```
(length(x), mean(x), std(x)) = (31, 153.1, 7.900000000000006)
(length(y), mean(y), std(y)) = (19, 150.1, 5.69999999999989)
```

Out[30]: RObject{VecSxp}

```
Welch Two Sample t-test

data: x and y
t = 1.5548, df = 46.588, p-value = 0.1268
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.8826927 6.8826927
sample estimates:
mean of x mean of y
153.1 150.1
```

3.2.5 12歳の男子と女子の平均身長の差に関する必修問題の解答例

- (1) 0.1692
- (2) [-2.9148, 0.5148]
- (3) 0.1268
- (4) [-0.8827, 6.8827]

(5) 後者の信頼区間の幅の方がかなり広くなっている。その理由はデータのサイズの違いになると考えられる。前者の2012年のデータは男子111人と女子131人のデータだったが、後者の2018年のデータは男子31人と女子19人のデータだった。

注意: このことから、データの要約値を報告する場合には必ずデータのサイズの情報も報告する必要があることがわかる。

注意: 以上の計算結果は通常「そのデータだけからは、2012年と2018年における12歳の男子と女子の平均身長に差があるかどうかは分からない」と解釈される。

4 Welchのt検定で使う自由度の式の導出

Welchのt検定の原論文:

- B. L. Welch, The Significance of the Difference Between Two Means when the Population Variances are Unequal, Biometrika, Vol. 29, No. 3/4 (Feb., 1938), pp. 350-362. [[Google Scholar](https://scholar.google.co.jp/scholar?cluster=10421437430510190115) (<https://scholar.google.co.jp/scholar?cluster=10421437430510190115>)]

Welchのt検定で使用される自由度は非常に大雑把な近似を使って導出される。

データサイズが十分に大きな場合には、自由度が大きな t 分布は標準正規分布でよく近似されるので、Welchの自由度の t 分布を使った補正是実践的には意味がなくなる。例えば m, n が100程度以上のデータを扱う場合には、以下の複雑な近似の過程をフォローしても益がない。

だから、この節は後の方に回されることになった。

しかし、Welchによる t 分布を使った補正是 **Brunner-Munzel 検定** のような他の検定法でも使われているので、興味がある人はフォローしておくとよいだろう。

- Edgar Brunner and Ullrich Munzel, The Nonparametric Behrens-Fisher Problem: Asymptotic Theory and a Small-Sample Approximation, Biometrical Journal, Volume 42, Issue 1, January 2000, Pages 17-25. [[Google Scholar](https://scholar.google.com/scholar?cluster=5072504718959959846) (<https://scholar.google.com/scholar?cluster=5072504718959959846>)]

以下で紹介する議論をフォローできた人はこのBrunner-Munzel(2000)にも挑戦してみると良いかもしれません。

4.1 2つの正規分布の標本分布の設定

X_1, \dots, X_m は各々が平均 μ_x と分散 σ_x^2 を持つ **正規分布** に従う独立同分布な確率変数達であると仮定する。

Y_1, \dots, Y_n は各々が平均 μ_y と分散 σ_y^2 を持つ **正規分布** に従う独立同分布な確率変数達であると仮定する。

X_i, Y_j の全体も独立であると仮定する。

X_1, \dots, X_m の不偏分散を S_x^2 と書き、 Y_1, \dots, Y_n の不偏分散を S_y^2 と書くことにする。

このとき、正規分布の標本分布に関する一般論より、次が成立している:

$$\frac{(m-1)S_x^2}{\sigma_x^2} \sim \text{Chisq}(m-1), \quad \frac{(n-1)S_y^2}{\sigma_y^2} \sim \text{Chisq}(n-1).$$

S_x^2 と S_y^2 も独立になることに注意せよ。正規分布の標本分布に関する一般論については

- 「標本分布について」のノート
[\(<https://nbviewer.org/github/genkuroki/Statistics/blob/master/2022/04%20Distribution%20of%20samples.ipynb>\).](https://nbviewer.org/github/genkuroki/Statistics/blob/master/2022/04%20Distribution%20of%20samples.ipynb)

における「正規分布の標本分布の場合」の節を参照せよ。ゆえに

$$S_\Delta^2 := \frac{S_x^2}{m} + \frac{S_y^2}{n} \sim \frac{\sigma_x^2}{m} \frac{\text{Chisq}(m-1)}{m-1} + \frac{\sigma_y^2}{n} \frac{\text{Chisq}(n-1)}{n-1}.$$

$\text{Chisq}(\nu)$ の平均と分散はそれぞれ $\nu, 2\nu$ なので、上のように S_Δ^2 とおくと、

$$\begin{aligned} E[S_\Delta^2] &= \frac{\sigma_x^2}{m} + \frac{\sigma_y^2}{n}, \\ \text{var}(S_\Delta^2) &= \left(\frac{\sigma_x^2}{m}\right)^2 \frac{2}{m-1} + \left(\frac{\sigma_y^2}{n}\right)^2 \frac{2}{n-1} \\ &= 2 \left(\frac{(\sigma_x^2/m)^2}{m-1} + \frac{(\sigma_y^2/n)^2}{n-1} \right). \end{aligned}$$

4.2 χ^2 分布で近似することによる自由度の式の導出

S_Δ^2 の分布を近似する χ^2 分布の定数倍 $a \text{Chisq}(\nu)$ を求めたい。そのために、 χ^2 分布の定数倍 $a \text{Chisq}(\nu)$ が S_Δ^2 と同じ平均と分散を持つような正定数 a と自由度 ν を求めよう。

その条件は a と ν に関する次の連立方程式になる:

$$a\nu = (\text{a Chisq}(\nu) \text{ の平均}) = E[S_\Delta^2] = \frac{\sigma_x^2}{m} + \frac{\sigma_y^2}{n},$$

$$2a^2\nu = (\text{a Chisq}(\nu) \text{ の分散}) = \text{var}(S_\Delta^2) = 2 \left(\frac{(\sigma_x^2/m)^2}{m-1} + \frac{(\sigma_y^2/n)^2}{n-1} \right).$$

この方程式を満たす a は後者の式の両辺を 2 で割って、さらに前者の式の両辺で割れば容易に得られる。この方程式を満たす ν はそうやって求めた a を前者に代入すれば得られる。その結果は次の通り：

$$a = \frac{\frac{(\sigma_x^2/m)^2}{m-1} + \frac{(\sigma_y^2/n)^2}{n-1}}{\frac{\sigma_x^2}{m} + \frac{\sigma_y^2}{n}}, \quad \nu = \frac{\left(\frac{\sigma_x^2}{m} + \frac{\sigma_y^2}{n} \right)^2}{\frac{(\sigma_x^2/m)^2}{m-1} + \frac{(\sigma_y^2/n)^2}}.$$

S_Δ^2 と同じ平均と分散を持つ χ^2 分布の定数倍における自由度はこの ν になる。

この ν の値の推定量として次を採用することにする：

$$\hat{\nu} = \frac{\left(\frac{S_x^2}{m} + \frac{S_y^2}{n} \right)^2}{\frac{(S_x^2/m)^2}{m-1} + \frac{(S_y^2/n)^2}}.$$

これは大数の法則によって $S_x^2 \approx \sigma_x^2$, $S_y^2 \approx \sigma_y^2$ という近似が成立しているならば、上の ν を近似することになる。

これが Welch の t 検定で使われる t 分布の自由度の式にちょうどなっている。

ポイントと注意: Welch の t 検定で使われる t 分布の自由度の式は、 $S_\Delta^2 = S_x^2/m + S_y^2/n$ の分布と同じ平均と分散を持つ χ^2 分布の定数倍 $a \text{ Chisq}(\nu)$ を求めることによって得られる。 S_Δ^2 の分布を $a \text{ Chisq}(\nu)$ で近似することはかなり大胆な近似であると考えられる。

4.3 t 分布による近似

X_i 達と Y_j 達は独立な正規分布に従う確率変数達であるという仮定から、次の確率変数 Z は標準正規分布に従うことがわかる：

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{m} + \frac{\sigma_y^2}{n}}}.$$

確率変数 W を次のように定める：

$$W = \frac{S_\Delta^2}{a} = \frac{1}{a} \left(\frac{S_x^2}{m} + \frac{S_y^2}{n} \right).$$

X_i 達と Y_j 達は独立な正規分布に従う確率変数達であるという仮定から、 $\bar{X}, S_x^2, \bar{Y}, S_y^2$ は独立な確率変数達になる。この点については、

- 「標本分布について」のノート
(<https://nbviewer.org/github/genkuroki/Statistics/blob/master/2022/04%20Distribution%20of%20samples.ipynb>).

における「正規分布の標本分布の場合」の節に書いてある正規分布の標本分布に関する一般論を参照せよ。

ゆえに、 Z, W は独立になる。そして、前節の結果より、

$$\frac{W}{\nu} = \frac{S_\Delta^2}{a\nu}, \quad a\nu = \frac{\sigma_x^2}{m} + \frac{\sigma_y^2}{n}, \quad S_\Delta^2 = \frac{S_x^2}{m} + \frac{S_y^2}{n}$$

なので、

$$\begin{aligned}
\frac{Z}{\sqrt{W/\nu}} &= \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{m} + \frac{\sigma_y^2}{n}}} \times \sqrt{\frac{a\nu}{S_\Delta^2}} \\
&= \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{S_\Delta^2}} \\
&= \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{S_x^2}{m} + \frac{S_y^2}{n}}} = T(\mu_x - \mu_y).
\end{aligned}$$

前節の結果より, W の分布を近似する χ^2 分布は $\text{Chisq}(\nu)$ になるので, $T(\mu_x - \mu_y)$ の分布を近似する t 分布の自由度も ν だと考えられる.

その ν を近似する統計量として,

$$\hat{\nu} = \frac{\left(\frac{S_x^2}{m} + \frac{S_y^2}{n} \right)^2}{\frac{(S_x^2/m)^2}{m-1} + \frac{(S_y^2/n)^2}{n-1}}.$$

を採用すれば, Welchの t 検定の方法が得られる.

5 Welchの t 検定での第一種の過誤の確率の視覚化

平均 $\mu_{x,0}$ の分布 D_x でサイズ m のサンプルを, 平均 $\mu_{y,0}$ の分布 D_y でサイズ n のサンプルを大量に生成して, そのサンプル達に関する「平均の差は $\mu_x - \mu_y = \mu_{x,0} - \mu_{y,0}$ である」という仮説の Welchの t 検定におけるP値が有意水準 α 以下(未満でも同じ)になる確率(第一種の過誤の確率と呼ばれる)を求めてプロットしてみよう.

理想的には第一種の過誤の確率は有意水準に等しくなって欲しいが, Welchの t 検定は中心極限定理や対数の法則を使った近似を使っているので, データのサイズが十分に大きくない場合には誤差が生じてしまう.

その様子をグラフで確認することが以下の目標である.

3×2 のプロットの内訳は以下の通り:







サイズ m のデータ X_i を生成する分布	サイズ n のデータ Y_i を生成する分布
T 統計量と自由度の分布	T 統計量の分布
第一種の過誤の確率 $0 < \alpha < 1$	第一種の過誤の確率 $0 < \alpha < 0.1$

5.1 異なる分散を持つ正規分布達の標本でのWelchの t 検定での第一種の過誤の確率の視覚化

```
In [31]: 1 plot_welch(distx=Normal(0,1), m=10, disty=Normal(0,2), n=10)
```

```
m = 10,  mu_x = 0.000,  sigma_x = 1.000,  skewness_x = 0.000,  kurtosis_x = 0.000
n = 10,  mu_y = 0.000,  sigma_y = 2.000,  skewness_y = 0.000,  kurtosis_y = 0.000
Delta_mu = 0.0
v_bar = mean(df) = 13.540037126888508
```







Out[31]: Normal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), m=10



```
In [32]: 1 plot_welch(distx=Normal(0,1), m=10, disty=Normal(0,2), n=40)
```

```
m = 10,  mu_x = 0.000,  sigma_x = 1.000,  skewness_x = 0.000,  kurtosis_x = 0.000
n = 40,  mu_y = 0.000,  sigma_y = 2.000,  skewness_y = 0.000,  kurtosis_y = 0.000
Delta_mu = 0.0
v_bar = mean(df) = 31.1515464432953
```







Out[32]: Normal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), m=10



```
In [33]: 1 plot_welch(distx=Normal(0,1), m=40, disty=Normal(0,2), n=10)
```

```
m = 40,  mu_x = 0.000,  sigma_x = 1.000,  skewness_x = 0.000,  kurtosis_x = 0.000
n = 10,  mu_y = 0.000,  sigma_y = 2.000,  skewness_y = 0.000,  kurtosis_y = 0.000
Delta_mu = 0.0
v_bar = mean(df) = 10.501568177803936
```

Out[33]: Normal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), m=40




5.2 異なる分散を持つ一様分布達の標本でのWelchのt検定での第一種の過誤の確率の視覚化






2つのサンプル x_i と y_j のサイズ m, n のアンバランスは誤差増大の原因になり得る。

```
In [34]: 1 plot_welch(distx=Uniform(-1,1), m=10, disty=Uniform(-2,2), n=10,
2           distxlim=(-2.5, 2.5), distylim=(-2.5, 2.5))
m = 10,  mu_x = 0.000,  sigma_x = 0.577,  skewness_x = 0.000,  kurtosis_x = -1.200
n = 10,  mu_y = 0.000,  sigma_y = 1.155,  skewness_y = 0.000,  kurtosis_y = -1.200
Delta_mu = 0.0
v_bar = mean(df) = 13.44142252050102
```

Out[34]: Uniform(a=-1.0, b=1.0), m=10






Uniform(a=-2.0, b=2.0), n=10






```
In [35]: 1 plot_welch(distx=Uniform(-1,1), m=10, disty=Uniform(-2,2), n=40,
2           distxlim=(-2.5, 2.5), distylim=(-2.5, 2.5))
m = 10,  mu_x = 0.000,  sigma_x = 0.577,  skewness_x = 0.000,  kurtosis_x = -1.200
n = 40,  mu_y = 0.000,  sigma_y = 1.155,  skewness_y = 0.000,  kurtosis_y = -1.200
Delta_mu = 0.0
v_bar = mean(df) = 30.333388674084826
```

Out[35]: Uniform(a=-1.0, b=1.0), m=10




Uniform(a=-2.0, b=2.0), n=40








```
In [36]: 1 plot_welch(distx=Uniform(-1,1), m=40, disty=Uniform(-2,2), n=10,
2           distxlim=(-2.5, 2.5), distylim=(-2.5, 2.5))
m = 40,  mu_x = 0.000,  sigma_x = 0.577,  skewness_x = 0.000,  kurtosis_x = -1.200
n = 10,  mu_y = 0.000,  sigma_y = 1.155,  skewness_y = 0.000,  kurtosis_y = -1.200
Delta_mu = 0.0
v_bar = mean(df) = 10.319694128395549
```

Out[36]: Uniform(a=-1.0, b=1.0), m=40



Uniform(a=-2.0, b=2.0), n=10




5.3 正規分布とガンマ分布の標本でのWelchの t 検定での第一種の過誤の確率の視覚化

正規分布の標本と左右非対称な分布の平均を比較したい場合には、後者の左右非対称な分布の側のサンプルサイズを大きくした方が誤差が小さくなり易そうなことを以下の計算は示唆している。






```
In [37]: 1 plot_welch(distx=Normal(0,1), m=10, disty=Gamma(2,3), n=10)
```

```
m = 10,  mu_x = 0.000,  sigma_x = 1.000,  skewness_x = 0.000,  kurtosis_x = 0.000
n = 10,  mu_y = 6.000,  sigma_y = 4.243,  skewness_y = 1.414,  kurtosis_y = 3.000
Delta_mu = -6.0
v_bar = mean(df) = 10.507446436415803
```

Out[37]: Normal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), m=10









Gamma($\alpha=2.0, \theta=3.0$), n=10



```
In [38]: 1 plot_welch(distx=Normal(0,1), m=10, disty=Gamma(2,3), n=40)
```

```
m = 10,  mu_x = 0.000,  sigma_x = 1.000,  skewness_x = 0.000,  kurtosis_x = 0.000
n = 40,  mu_y = 6.000,  sigma_y = 4.243,  skewness_y = 1.414,  kurtosis_y = 3.000
Delta_mu = -6.0
v_bar = mean(df) = 45.92679392427271
```


Out[38]: Normal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), m=10



```
In [39]: 1 plot_welch(distx=Normal(0,1), m=10, disty=Gamma(2,3), n=160)
```

```
m = 10,  mu_x = 0.000,  sigma_x = 1.000,  skewness_x = 0.000,  kurtosis_x = 0.000
n = 160,  mu_y = 6.000,  sigma_y = 4.243,  skewness_y = 1.414,  kurtosis_y = 3.000
Delta_mu = -6.0
v_bar = mean(df) = 47.349959632075056
```







Out[39]:



```
In [40]: 1 plot_welch(distx=Normal(0,1), m=40, disty=Gamma(2,3), n=10)
```

```
m = 40,  mu_x = 0.000,  sigma_x = 1.000,  skewness_x = 0.000,  kurtosis_x = 0.000
n = 10,  mu_y = 6.000,  sigma_y = 4.243,  skewness_y = 1.414,  kurtosis_y = 3.000
Delta_mu = -6.0
v_bar = mean(df) = 9.401955759038113
```







Out[40]: Normal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), m=40



```
In [41]: 1 plot_welch(distx=Normal(0,1), m=160, disty=Gamma(2,3), n=10)
```

```
m = 160,  mu_x = 0.000,  sigma_x = 1.000,  skewness_x = 0.000,  kurtosis_x = 0.000
n = 10,  mu_y = 6.000,  sigma_y = 4.243,  skewness_y = 1.414,  kurtosis_y = 3.000
Delta_mu = -6.0
v_bar = mean(df) = 9.099512063767147
```

Out[41]: Normal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), m=160




5.4 一様分布とガンマ分布の標本でのWelchのt検定での第一種の過誤の確率の視覚化

```
In [42]: 1 plot_welch(distx=Uniform(-2,2), m=10, disty=Gamma(2,3), n=10,
2           distxlim=(-2.5, 2.5))
```

$m = 10, \mu_x = 0.000, \sigma_x = 1.155, \text{skewness}_x = 0.000, \text{kurtosis}_x = -1.200$
 $n = 10, \mu_y = 6.000, \sigma_y = 4.243, \text{skewness}_y = 1.414, \text{kurtosis}_y = 3.000$
 $\Delta\mu = -6.0$
 $\bar{v} = \text{mean}(df) = 10.982748150653544$


Out[42]:



```
In [43]: 1 plot_welch(distx=Uniform(-2,2), m=10, disty=Gamma(2,3), n=40,
2           distxlim=(-2.5, 2.5))
```

$m = 10, \mu_x = 0.000, \sigma_x = 1.155, \text{skewness}_x = 0.000, \text{kurtosis}_x = -1.200$
 $n = 40, \mu_y = 6.000, \sigma_y = 4.243, \text{skewness}_y = 1.414, \text{kurtosis}_y = 3.000$
 $\Delta\mu = -6.0$
 $\bar{v} = \text{mean(df)} = 45.401533049798104$


Out[43]:



```
In [44]: 1 plot_welch(distx=Uniform(-2,2), m=40, disty=Gamma(2,3), n=10,
2           distxlim=(-2.5, 2.5))
```

$m = 40, \mu_x = 0.000, \sigma_x = 1.155, \text{skewness}_x = 0.000, \text{kurtosis}_x = -1.200$
 $n = 10, \mu_y = 6.000, \sigma_y = 4.243, \text{skewness}_y = 1.414, \text{kurtosis}_y = 3.000$
 $\Delta\mu = -6.0$
 $\bar{v} = \text{mean(df)} = 9.537927066646965$


Out[44]:



```
In [45]: 1 plot_welch(distx=Uniform(-2,2), m=40, disty=Gamma(2,3), n=40,
2           distxlim=(-2.5, 2.5))
```

$m = 40, \mu_x = 0.000, \sigma_x = 1.155, \text{skewness}_x = 0.000, \text{kurtosis}_x = -1.200$
 $n = 40, \mu_y = 6.000, \sigma_y = 4.243, \text{skewness}_y = 1.414, \text{kurtosis}_y = 3.000$
 $\Delta\mu = -6.0$
 $\bar{v} = \text{mean}(df) = 45.43798535525495$


Out[45]:



```
In [46]: 1 plot_welch(distx=Uniform(-2,2), m=40, disty=Gamma(2,3), n=160,
2           distxlim=(-2.5, 2.5))
```

$m = 40$, $\mu_x = 0.000$, $\sigma_x = 1.155$, $\text{skewness}_x = 0.000$, $\text{kurtosis}_x = -1.200$
 $n = 160$, $\mu_y = 6.000$, $\sigma_y = 4.243$, $\text{skewness}_y = 1.414$, $\text{kurtosis}_y = 3.000$
 $\Delta\mu = -6.0$
 $\bar{v} = \text{mean}(df) = 194.60051887802356$

Out[46]:




5.5 同一のガンマ分布達の標本でのWelchのt検定での第一種の過誤の確率の視覚化

X_i 達と Y_j 達が同一の左右非対称な分布のサンプルであるとき, 2つのサンプルサイズを同じにした方が誤差が小さくなりそういうことを以下の計算結果は示唆している。

```
In [47]: 1 plot_welch(distx=Gamma(2,3), m=10, disty=Gamma(2,3), n=10)
```

```
m = 10,  mu_x = 6.000,  sigma_x = 4.243,  skewness_x = 1.414,  kurtosis_x = 3.000
n = 10,  mu_y = 6.000,  sigma_y = 4.243,  skewness_y = 1.414,  kurtosis_y = 3.000
Delta_mu = 0.0
v_bar = mean(df) = 15.799269001324523
```


Out[47]:



```
In [48]: 1 plot_welch(distx=Gamma(2,3), m=10, disty=Gamma(2,3), n=40)
```

```
m = 10,  mu_x = 6.000,  sigma_x = 4.243,  skewness_x = 1.414,  kurtosis_x = 3.000
n = 40,  mu_y = 6.000,  sigma_y = 4.243,  skewness_y = 1.414,  kurtosis_y = 3.000
Delta_mu = 0.0
v_bar = mean(df) = 16.687696645629813
```


Out[48]:



```
In [49]: 1 plot_welch(distx=Gamma(2,3), m=10, disty=Gamma(2,3), n=160)
```

```
m = 10,  mu_x = 6.000,  sigma_x = 4.243,  skewness_x = 1.414,  kurtosis_x = 3.000
n = 160,  mu_y = 6.000,  sigma_y = 4.243,  skewness_y = 1.414,  kurtosis_y = 3.000
Delta_mu = 0.0
v_bar = mean(df) = 10.921556361918844
```


Out[49]:



```
In [50]: 1 plot_welch(distx=Gamma(2,3), m=40, disty=Gamma(2,3), n=160)
```

```
m = 40,  mu_x = 6.000,  sigma_x = 4.243,  skewness_x = 1.414,  kurtosis_x = 3.000
n = 160,  mu_y = 6.000,  sigma_y = 4.243,  skewness_y = 1.414,  kurtosis_y = 3.000
Delta_mu = 0.0
v_bar = mean(df) = 62.91931721573467
```


Out[50]:



```
In [51]: 1 plot_welch(distx=Gamma(2,3), m=160, disty=Gamma(2,3), n=160)
```

```
m = 160,  mu_x = 6.000,  sigma_x = 4.243,  skewness_x = 1.414,  kurtosis_x = 3.000
n = 160,  mu_y = 6.000,  sigma_y = 4.243,  skewness_y = 1.414,  kurtosis_y = 3.000
Delta_mu = 0.0
v_bar = mean(df) = 313.4552897349271
```

Out[51]:




5.6 異なるガンマ分布達の標本でのWelchのt検定での第一種の過誤の確率の視覚化

```
In [52]: 1 plot_welch(distx=Gamma(6,2), m=10, disty=Gamma(2,6), n=10)
```

```
m = 10,  mu_x = 12.000,  sigma_x = 4.899,  skewness_x = 0.816,  kurtosis_x = 1.000
n = 10,  mu_y = 12.000,  sigma_y = 8.485,  skewness_y = 1.414,  kurtosis_y = 3.000
Delta_mu = 0.0
v_bar = mean(df) = 14.517640411168712
```


Out[52]:



```
In [53]: 1 plot_welch(distx=Gamma(6,2), m=10, disty=Gamma(2,6), n=40)
```

```
m = 10,  mu_x = 12.000,  sigma_x = 4.899,  skewness_x = 0.816,  kurtosis_x = 1.000
n = 40,  mu_y = 12.000,  sigma_y = 8.485,  skewness_y = 1.414,  kurtosis_y = 3.000
Delta_mu = 0.0
v_bar = mean(df) = 27.18576226375518
```


Out[53]:



```
In [54]: 1 plot_welch(distx=Gamma(6,2), m=40, disty=Gamma(2,6), n=10)
```

```
m = 40, mu_x = 12.000, sigma_x = 4.899, skewness_x = 0.816, kurtosis_x = 1.000  
n = 10, mu_y = 12.000, sigma_y = 8.485, skewness_y = 1.414, kurtosis_y = 3.000  
Delta_mu = 0.0  
v_bar = mean(df) = 11.532330677616473
```

Out[54]:




5.7 正規分布と対数正規分布の標本でのWelchのt検定での第一種の過誤の確率の視覚化

```
In [55]: 1 plot_welch(distx=Normal(0,1), m=10, disty=LogNormal(), n=10)
```

```
m = 10,  mu_x = 0.000,  sigma_x = 1.000,  skewness_x = 0.000,  kurtosis_x = 0.000
n = 10,  mu_y = 1.649,  sigma_y = 2.161,  skewness_y = 6.185,  kurtosis_y = 110.936
Delta_mu = -1.6487212707001282
v_bar = mean(df) = 14.485474368552183
```


Out[55]:



```
In [56]: 1 plot_welch(distx=Normal(0,1), m=10, disty=LogNormal(), n=40)
```

```
m = 10,  mu_x = 0.000,  sigma_x = 1.000,  skewness_x = 0.000,  kurtosis_x = 0.000
n = 40,  mu_y = 1.649,  sigma_y = 2.161,  skewness_y = 6.185,  kurtosis_y = 110.936
Delta_mu = -1.6487212707001282
v_bar = mean(df) = 28.555399482642507
```


Out[56]:



```
In [57]: 1 plot_welch(distx=Normal(0,1), m=10, disty=LogNormal(), n=160)
```

```
m = 10,  mu_x = 0.000,  sigma_x = 1.000,  skewness_x = 0.000,  kurtosis_x = 0.000
n = 160,  mu_y = 1.649,  sigma_y = 2.161,  skewness_y = 6.185,  kurtosis_y = 110.936
Delta_mu = -1.6487212707001282
v_bar = mean(df) = 17.402741365856087
```

Out[57]:




5.8 同一の対数正規分布達の標本でのWelchのt検定での第一種の過誤の確率の視覚化

```
In [58]: 1 plot_welch(distx=LogNormal(), m=10, disty=LogNormal(), n=10)
```

```
m = 10,  μ_x = 1.649,  σ_x = 2.161,  skewness_x = 6.185,  kurtosis_x = 110.936
n = 10,  μ_y = 1.649,  σ_y = 2.161,  skewness_y = 6.185,  kurtosis_y = 110.936
Δμ = 0.0
v̄ = mean(df) = 14.114896151322853
```


Out[58]:



```
In [59]: 1 plot_welch(distx=LogNormal(), m=10, disty=LogNormal(), n=40)
```

```
m = 10,  mu_x = 1.649,  sigma_x = 2.161,  skewness_x = 6.185,  kurtosis_x = 110.936
n = 40,  mu_y = 1.649,  sigma_y = 2.161,  skewness_y = 6.185,  kurtosis_y = 110.936
Delta_mu = 0.0
v_bar = mean(df) = 22.14784395106809
```


Out[59]:








```
In [60]: 1 plot_welch(distx=LogNormal(), m=40, disty=LogNormal(), n=40)
```

```
m = 40,  μ_x = 1.649,  σ_x = 2.161,  skewness_x = 6.185,  kurtosis_x = 110.936
n = 40,  μ_y = 1.649,  σ_y = 2.161,  skewness_y = 6.185,  kurtosis_y = 110.936
Δμ = 0.0
v̄ = mean(df) = 67.11277328855677
```

Out[60]: LogNormal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), m=40




LogNormal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), n=40








```
In [61]: 1 plot_welch(distx=LogNormal(), m=40, disty=LogNormal(), n=160)
```

```
m = 40,  μ_x = 1.649,  σ_x = 2.161,  skewness_x = 6.185,  kurtosis_x = 110.936
n = 160,  μ_y = 1.649,  σ_y = 2.161,  skewness_y = 6.185,  kurtosis_y = 110.936
Δμ = 0.0
v̄ = mean(df) = 76.55500798158911
```

Out[61]: LogNormal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), m=40




LogNormal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), n=160








```
In [62]: 1 plot_welch(distx=LogNormal(), m=160, disty=LogNormal(), n=160)
```

```
m = 160,  mu_x = 1.649,  sigma_x = 2.161,  skewness_x = 6.185,  kurtosis_x = 110.936
n = 160,  mu_y = 1.649,  sigma_y = 2.161,  skewness_y = 6.185,  kurtosis_y = 110.936
Delta_mu = 0.0
v_bar = mean(df) = 293.3332485524279
```

Out[62]: LogNormal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), m=160



LogNormal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), n=160




5.9 異なる対数正規分布達の標本でのWelchの t 検定での第一種の過誤の確率の視覚化

以下はWelchの t 検定およびそれに付随する信頼区間の使用が危険になる場合があることがわかる計算例になっている。

```
In [63]: 1 plot_welch(distx=LogNormal(), m=10, disty=LogNormal(1), n=10)
```

```
m = 10,  mu_x = 1.649,  sigma_x = 2.161,  skewness_x = 6.185,  kurtosis_x = 110.936
n = 10,  mu_y = 4.482,  sigma_y = 5.875,  skewness_y = 6.185,  kurtosis_y = 110.936
Delta_mu = -2.8329677996379363
v_bar = mean(df) = 12.305907287778117
```


Out[63]:








```
In [64]: 1 plot_welch(distx=LogNormal(), m=10, disty=LogNormal(1), n=40)
```

```
m = 10,  mu_x = 1.649,  sigma_x = 2.161,  skewness_x = 6.185,  kurtosis_x = 110.936
n = 40,  mu_y = 4.482,  sigma_y = 5.875,  skewness_y = 6.185,  kurtosis_y = 110.936
Delta_mu = -2.8329677996379363
v_bar = mean(df) = 38.24579164803262
```

Out[64]: LogNormal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), m=10









LogNormal($\mu=1.0, \sigma=1.0$), n=40



```
In [65]: 1 plot_welch(distx=LogNormal(), m=40, disty=LogNormal(1), n=40)
```

```
m = 40,  mu_x = 1.649,  sigma_x = 2.161,  skewness_x = 6.185,  kurtosis_x = 110.936
n = 40,  mu_y = 4.482,  sigma_y = 5.875,  skewness_y = 6.185,  kurtosis_y = 110.936
Delta_mu = -2.8329677996379363
v_bar = mean(df) = 52.60583836725731
```


Out[65]: LogNormal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), m=40








```
In [66]: 1 plot_welch(distx=LogNormal(), m=40, disty=LogNormal(1), n=160)
```

```
m = 40,  μ_x = 1.649,  σ_x = 2.161,  skewness_x = 6.185,  kurtosis_x = 110.936
n = 160,  μ_y = 4.482,  σ_y = 5.875,  skewness_y = 6.185,  kurtosis_y = 110.936
Δμ = -2.8329677996379363
v̄ = mean(df) = 165.3019258372765
```

Out[66]: LogNormal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), m=40









LogNormal($\mu=1.0, \sigma=1.0$), n=160



```
In [67]: 1 plot_welch(distx=LogNormal(), m=160, disty=LogNormal(1), n=160)
```

```
m = 160,  mu_x = 1.649,  sigma_x = 2.161,  skewness_x = 6.185,  kurtosis_x = 110.936
n = 160,  mu_y = 4.482,  sigma_y = 5.875,  skewness_y = 6.185,  kurtosis_y = 110.936
Delta_mu = -2.8329677996379363
v_bar = mean(df) = 208.6607725137111
```







Out[67]: LogNormal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), m=160



```
In [68]: 1 plot_welch(distx=LogNormal(), m=160, disty=LogNormal(1), n=640)
```

```
m = 160,  mu_x = 1.649,  sigma_x = 2.161,  skewness_x = 6.185,  kurtosis_x = 110.936
n = 640,  mu_y = 4.482,  sigma_y = 5.875,  skewness_y = 6.185,  kurtosis_y = 110.936
Delta_mu = -2.8329677996379363
v_bar = mean(df) = 684.2386220164234
```

Out[68]: LogNormal($\mu=0.0, \sigma=1.0$), m=160




In [69]:

```
1 plot_welch(distx=LogNormal(), m=640, disty=LogNormal(1), n=640)

m = 640,  mu_x = 1.649,  sigma_x = 2.161,  skewness_x = 6.185,  kurtosis_x = 110.936
n = 640,  mu_y = 4.482,  sigma_y = 5.875,  skewness_y = 6.185,  kurtosis_y = 110.936
Delta_mu = -2.8329677996379363
v_bar = mean(df) = 821.3712069009249
```

Out[69]:



In []:

```
1
```