

Van der Pol 振動子

- Author: 黒木玄
- Date: 2019-04-05~2019-04-15
- Repository: <https://github.com/genkuroki/DifferentialEquations> (<https://github.com/genkuroki/DifferentialEquations>)

このファイルは [nbviewer](https://nbviewer.jupyter.org/github/genkuroki/DifferentialEquations/blob/master/01-1%20Van%20der%20Pol%20oscillator.ipynb) (<https://nbviewer.jupyter.org/github/genkuroki/DifferentialEquations/blob/master/01-1%20Van%20der%20Pol%20oscillator.ipynb>) でも閲覧できる。

[Julia言語](https://julialang.org/) (<https://julialang.org/>) と [Jupyter環境](https://jupyter.org/) (<https://jupyter.org/>) の簡単な解説については次を参照せよ:

- [JuliaとJupyterのすすめ](https://nbviewer.jupyter.org/github/genkuroki/msfd28/blob/master/msfd28genkuroki.ipynb?flush_cached=true) (https://nbviewer.jupyter.org/github/genkuroki/msfd28/blob/master/msfd28genkuroki.ipynb?flush_cached=true)

[Julia言語](https://julialang.org/) (<https://julialang.org/>) 環境の整備の仕方については次を参照せよ:

- [Julia v1.1.0 の Windows 8.1 へのインストール](https://nbviewer.jupyter.org/github/genkuroki/msfd28/blob/master/install.ipynb) (<https://nbviewer.jupyter.org/github/genkuroki/msfd28/blob/master/install.ipynb>)

目次

- 1 [Van der Pol 振動子](#)
- 2 [Van der Pol 方程式のベクトル場と流れの図](#)
 - 2.1 [μ = 0 の場合](#)
 - 2.2 [μ が正の場合](#)
 - 2.3 [μ が負の場合](#)
- 3 [Van der Pol 方程式の数値解](#)
 - 3.1 [μ = 0](#)
 - 3.2 [μ = 0.1](#)
 - 3.3 [μ = 0.5](#)
 - 3.4 [μ = 1](#)
- 4 [正弦波による強制力付きの場合](#)

```
In [1]: 1 using PyPlot: PyPlot, plt
```

```

In [2]: 1 ▼ function plot_stream(f, g;
2         x = range(-4, 4, length=201),
3         y = range(-4, 4, length=201),
4         density = 1.2, figtitle="", sign=1.0)
5
6         # meshgrid
7         xx = repeat(x', length(y), 1)
8         yy = repeat(y, 1, length(x))
9         XX = f.(xx, sign*yy)
10        YY = g.(xx, sign*yy) * sign
11
12        plt.streamplot(xx, yy, XX, YY, linewidth=0.5, density=density, color="blue")
13        plt.xlim(extrema(x)...)
14        plt.ylim(extrema(y)...)
15        plt.grid(ls=":")
16        figtitle == "" || plt.title(figtitle)
17    end
18
19 ▼ function plot_vector_field(f, g;
20         x = range(-4, 4, length=21),
21         y = range(-4, 4, length=21),
22         figtitle="", scale=2.0, sign=1.0)
23
24         # meshgrid
25         xx = repeat(x', length(y), 1)
26         yy = repeat(y, 1, length(x))
27         XX = f.(xx, sign*yy)
28         YY = g.(xx, sign*yy) * sign
29         MM = maximum(@. (sqrt(XX^2+YY^2)))
30         #println(MM) # for debug
31
32        plt.quiver(xx, yy, XX, YY, scale=scale*MM, color="red")
33        plt.xlim(extrema(x)...)
34        plt.ylim(extrema(y)...)
35        plt.grid(ls=":")
36        figtitle == "" || plt.title(figtitle)
37    end

```

Out[2]: plot_vector_field (generic function with 1 method)

1 Van der Pol 振動子

Van der Pol (ファン・デル・ポル) 振動子 (https://en.wikipedia.org/wiki/Van_der_Pol_oscillator) とは以下の非線形常微分方程式で記述される系のことである:

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0.$$

ここで $x = x(t)$ の時刻 t に関する1階と2階の導関数を \dot{x}, \ddot{x} と表した. この微分方程式を **Van der Pol 方程式** と呼ぶ.

2 Van der Pol 方程式のベクトル場と流れの図

$v = \dot{x}$ とおくと, Van der Pol 方程式は次の連立常微分方程式に書き直される:

$$\begin{cases} \dot{x} = v, \\ \dot{v} = \mu(1 - x^2)v - x. \end{cases}$$

この微分方程式は位置 x と速度 v を平面上の点 (x, v) で表すとき, その点の動きの速度ベクトルが $(v, \mu(1 - x^2)v - x)$ となることを意味している. 平面上の各点にその点における速度ベクトルを対応させる関数を平面上の **ベクトル場** と呼ぶ. 上の連立常微分方程式はベクトル場に沿って平面上の点が流れて行く様子を表している.

```

In [3]: 1 function plot_Van_der_Pol(μ; scale=1/√abs(μ), sign=1.0)
2         # Van der Pol equation
3         f(x,v) = v
4         g(x,v) = μ*(1-x^2)*v - x
5
6         plt.figure(figsize=(7,3.5))
7         plt.subplot("121")
8         plot_stream(f, g, figtitle="Van der Pol: μ = $μ", sign=sign)
9         plt.subplot("122")
10        plot_vector_field(f, g, figtitle="Van der Pol: μ = $μ", scale=scale, sign=sign)
11        plt.tight_layout()
12    end

```

Out[3]: plot_Van_der_Pol (generic function with 1 method)

2.1 $\mu = 0$ の場合

$\mu = 0$ のとき, Van der Pol 方程式は

$$\begin{cases} \dot{x} = v, \\ \dot{v} = -x. \end{cases}$$


の形になる. これが定める流れは時計回りで回転する流れになる. その一般解は, $r \geq 0$ と実数 a を使って次のように書ける:

$$\begin{cases} \dot{x} = r \sin(t - a), \\ \dot{v} = r \cos(t - a). \end{cases}$$

```


In [4]: 1 plot_Van_der_Pol(0.0, scale=10.0)

```




2.2 μ が正の場合


```
In [5]: 1 plot_Van_der_Pol(0.1)
```



```
In [6]: 1 plot_Van_der_Pol(0.5)
```



```
In [7]: 1 plot_Van_der_Pol(1.0)
```



2.3 μ が負の場合

Van der Pol 方程式

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0.$$


で時刻 t が進む向きを逆転させると、すなわち、 t に $-t$ を代入すると、

$$\ddot{x} + \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0.$$


の形になる。すなわち、時間の向きを逆転させることと、パラメーター μ をその -1 倍で置き換えることは等しい。

以下の $\mu = 0.2$ と $\mu = -0.2$ の場合のプロットを比較すると、矢印の向きが逆になっていることがわかる。

```
In [8]: 1 plot_Van_der_Pol(0.2)
```



```
In [9]: 1 plot_Van_der_Pol(-0.2, sign=-1.0)
```



注意: 上のセルの `sign=-1.0` はプロットするときに縦軸(v 軸)の向きを反転してプロットすることを意味している。

3 Van der Pol 方程式の数値解

```
In [10]: 1 using DifferentialEquations
2 using Plots
3 default(:bglegend, plot_color(default(:bg), 0.7))
4 default(:fglegend, plot_color(ifelse(isdark(plot_color(default(:bg))), :white, :black), 0.6))
5
6 gr()
7 ENV["PLOTS_TEST"] = "true";
```

```

In [11]: 1 ▼ ### Van der Pol 方程式の記述
          2 ▼ function vanderpol!(du, u, p, t)
          3     # u[1] = x
          4     # u[2] = v
          5     # du[1] = dx/dt
          6     # du[2] = dv/dt
          7     # p[1] =  $\mu$ 
          8
          9     # dx/dt = v
         10     du[1] = u[2]
         11     # dv/dt =  $\mu (1 - x^2) v - x$ 
         12     du[2] = p[1]*(1 - u[1]^2)*u[2] - u[1]
         13 end
         14
         15 ▼ function solve_vanderpol( $\mu$ , x0, v0, tmax)
         16     u0 = [x0, v0] # initial values
         17     p = [ $\mu$ ] # parameters
         18     tspan = (0.0, tmax) # time span
         19     prob = ODEProblem(vanderpol!, u0, tspan, p) # ordinary differential equation problem
         20     solve(prob)
         21 end
         22
         23 ▼ function plot_vanderpol_sol(sol,  $\mu$ ; l1=:best, l2=:best)
         24     plot(size=(600, 250))
         25     plot!(sol, label=["x", "v"], legend=l1, lw=1)
         26     title!("Van der Pol equation ( $\mu = \$\mu$ )", titlefontsize=12) ;> display
         27
         28     plot(size=(300, 300))
         29     plot!(sol, vars=(1,2), label="(x,v)", legend=l2, lw=1)
         30     title!("Van der Pol equation ( $\mu = \$\mu$ )", titlefontsize=12) ;> display
         31 end
         32
         33 ▼ function solve_and_plot_vanderpol(;  $\mu=0.5$ , x0=0.1, v0=0.0, tmax=50.0, l1=:topleft, l2=:best)
         34     sol = solve_vanderpol( $\mu$ , x0, v0, tmax)
         35     plot_vanderpol_sol(sol,  $\mu$ ; l1=l1, l2=l2)
         36 end



```

Out[11]: solve_and_plot_vanderpol (generic function with 1 method)

3.1 $\mu = 0$

$\mu = 0$ の場合に van der Pol 方程式の解は (x, v) 平面上の円運動になる。


```
In [12]: 1 solve_and_plot_vanderpol(; μ=0.0, x0=1.0, v0=0.0, tmax=10.0, l1=:topright)
```




3.2 $\mu = 0.1$


$\mu = 0.1$ の場合に, van der Pol 方程式の解は (x, v) 平面上の歪んだ円に内側と外側から巻き付くような運動になる. 巻き付く先の歪んだ円は **limit cycle** と呼ばれる.

In [13]: 1 `solve_and_plot_vanderpol(; $\mu=0.1$, $x_0=0.1$, $v_0=0.0$, $t_{\max}=100.0$)`

Van der Pol equation ($\mu = 0.1$)




Van der Pol equation ($\mu = 0.1$)




In [14]: 1 `solve_and_plot_vanderpol(; $\mu=0.1$, $x_0=-8.0$, $v_0=0.0$, $t_{\max}=40.0$, $l1=:bottomright$, $l2=:bottomleft$)`

Van der Pol equation ($\mu = 0.1$)





Van der Pol equation ($\mu = 0.1$)





3.3 $\mu = 0.5$

μ を大きくすると limit cycle の形が円から離れて行く.

```
In [15]: 1 solve_and_plot_vanderpol(;  $\mu=0.5$ ,  $x0=0.01$ ,  $v0=0.0$ ,  $tmax=60.0$ ,  $l2=:topleft$ )
```



```
In [16]: 1 solve_and_plot_vanderpol(; μ=0.5, x0=-8.0, v0=0.0, tmax=60.0, l1=:bottomright, l2=:bottomleft)
```




3.4 $\mu = 1$


$\mu = 1$ での limit cycle は斜めに傾いた平行四辺形に近い形になる.

In [17]: 1 `solve_and_plot_vanderpol(; $\mu=1.0$, $x_0=0.1$, $v_0=0.0$, $t_{\max}=30.0$, $l_2=:topleft$)`

Van der Pol equation ($\mu = 1.0$)




Van der Pol equation ($\mu = 1.0$)




In [18]: 1 `solve_and_plot_vanderpol(; $\mu=1.0$, $x_0=-8.0$, $v_0=0.0$, $t_{\max}=60.0$, $l_1=:bottomright$, $l_2=:topleft$)`

Van der Pol equation ($\mu = 1.0$)



Van der Pol equation ($\mu = 1.0$)



4 正弦波による強制力付きの場合



$$\begin{cases} \dot{x} = v, \\ \dot{v} = \mu(1 - x^2)v - x + A \sin \omega t. \end{cases}$$

```
In [19]: 1 using DifferentialEquations
2 using Plots
3 default(:bglegend, plot_color(default(:bg), 0.7))
4 default(:fglegend, plot_color(ifelse(isdark(plot_color(default(:bg))), :white, :black), 0.6))
5
6 gr()
7 ENV["PLOTS_TEST"] = "true";
```

```
In [20]: 1 ▼ ### sin による強制力付きの Van der Pol 方程式の記述
2 ▼ function vanderpolsin!(du, u, p, t)
3     # x = u[1]
4     # v = u[2]
5     # dx/dt = du[1]
6     # dv/dt = du[2]
7     # μ = p[1]
8     # A = p[2]
9     # ω = p[3]
10
11     # dx/dt = v
12     du[1] = u[2]
13     # dv/dt = μ (1 - x^2) v - x + A sin ωt
14     du[2] = p[1]*(1 - u[1]^2)*u[2] - u[1] + p[2]*sin(p[3]*t)
15 end
16
17 ▼ function solve_vanderpolsin(; μ=1.0, A=1.2, ω=2π/10, x0=0.1, v0=0.0, tmax=100)
18     u0 = [x0, v0] # initial values
19     p = [μ, A, ω] # parameters
20     tspan = (0.0, tmax) # time span
21     prob = ODEProblem(vanderpolsin!, u0, tspan, p) # ordinary differential equation problem
22     solve(prob)
23 end
24
25 ▼ function plot_vanderpol_sol(sol, μ, A, ω; l1=:best, l2=:best)
26     plot(size=(600, 200))
27     plot!(sol, vars=(0,1), label="x", legend=l1, lw=1)
28     title!("Forced Van der Pol (μ = $μ, A = $A, omega = $(round(ω, digits=2)))", titlefontsize=10) |> display
29
30     sleep(0.1)
31     plot(size=(300, 300))
32     plot!(sol, vars=(1,2), label="(x,v)", legend=l2, lw=1)
33     title!("μ = $μ, A = $A, omega = $(round(ω, digits=2))", titlefontsize=10) |> display
34 end
35
36 ▼ function solve_and_plot_vanderpolsin(; μ=1.0, A=1.2, ω=2π/5, x0=0.1, v0=0.0, tmax=50.0, l1=false, l2=false)
37     sol = solve_vanderpolsin(μ=μ, A=A, ω=ω, x0=x0, v0=v0, tmax=tmax)
38     plot_vanderpol_sol(sol, μ, A, ω; l1=l1, l2=l2)
39 end
```

```
Out[20]: solve_and_plot_vanderpolsin (generic function with 1 method)
```

```
In [21]: 1 solve_and_plot_vanderpolsin(; μ=8.53, A=1.2, ω=2π/10, x0=0.1, v0=0.0, tmax=300.0)
```

Forced Van der Pol ($\mu = 8.53$, $A = 1.2$, $\omega = 0.63$) $\mu = 8.53$, $A = 1.2$, $\omega = 0.63$ 

カオス的な動き方をしている。