

농림축산검역본부예규 제237호

식물방역법 제18조 및 같은 법 시행규칙 제18조제8항에 따른 「병해충 분류동정 및 표본관리 요령」을 다음과 같이 제정합니다.

2026년 8월 24일

농림축산검역본부장

병해충 분류동정 및 표본관리 요령

제정 2026. 8. 24. 농림축산검역본부예규 제237호

제1조(목적) 이 요령은 「식물방역법」 제18조, 같은 법 시행규칙 제18조제8항의 규정에 따라 현장검역 및 실험실정밀검역 과정에서 발견된 병해충(잡초를 포함한다)에 대한 분류동정 및 병해충 표본관리 등의 업무를 원활히 수행하기 위해 필요한 절차와 방법을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "병해충 전문가풀"이란 식물검역과정에서 검출된 병해충에 대하여 병해충 전문가간 상호 분류동정 의뢰를 할 수 있도록 하기 위하여 농림축산검역본부장(이하 "검역본부장"이라 한다)이 정한 병해충 전문가 그룹을 말한다.
2. "비검역병해충"이란 제5조제4항제2호에 해당하는 병해충으로서, 국내에 분포하는 병해충(국내의 일부 지역에 분포되어 있지만 발생예찰 등 조치를 취하고 있는 병해충과 국내분포 여부가 불분명한 병해충을 제외) 또는 법 제6조에 따른 병해충위험분석 결과 비검역병해충으로 평가된 병해충을 말한다.
3. "공동분류동정"이란 영상회의 등을 활용하여 병해충 전문가들이 공동으로 참여하여 분류동정하는 것을 말한다.

제3조(병해충 전문가풀의 운영) ① 농림축산검역본부장은 정확하고 신속한 병해충 분류동정을 위하여 다음 각 호에 해당하는 병해충 전문가로 구성된 병해충 전문가풀을 운영할 수 있다.

1. 농림축산검역본부(이하 "검역본부"라 한다) 근무자로서 근무경력, 전공 분야 등을 감안할 때 분류동정의 전문성을 갖추었다고 인정하는 자(이하 "내부전문가"라 한다)
2. 대학 또는 연구소 등에서 병해충을 연구하는 자로서 분류동정에 관한 전문성을 갖추었다고 인정하는 자(이하 "외부전문가"라 한다)

② 병해충 전문가풀의 세부적인 운영 및 관리는 검역본부 위험관리과장이 담당한다.

제4조(병해충 발견통지) ① 현장검역을 담당하는 식물검역관(이하 "현장검역관"이라 한다)은 다음 각 호에 해당하는 경우 실험실정밀검역을 담당하는 식물검역관(이하 "실험실정밀검역관"이라 한다)과 협의하여 분류동정기간 또는 사육 후 분류동정기간을 정하고, 식물검역통합정보시스템에서 별지 제1호 서식의 발견통지서를 발급하여 해당 화물의 소유자 또는 그 대리인에게 교부한다.

1. 현장검역 과정에서 병해충이 발견된 경우
2. 실험실 정밀검역 과정에서 발견된 해충이 미성숙 상태로 분류동정을 위한 사육과정이 필요한 경우

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 병해충에 대해서는 발급을 제외한다.

1. 독자처분해충
2. 1차 선상검역을 한 식물에서 검출된 병해충
3. 농림축산검역본부 고시 「식물별 현장검역방법과 실험실정밀검역방법」의 실험실정밀검역 대상식물에서 검출된 병해충(사육하여야 하는 미성숙 해충은 제외한다)

③ 농림축산검역본부 지역본부장 또는 사무소장(이하 "지역본부장 또는 사무소장"이라 한다)은 소유자 또는 그 대리인이 병해충 분류동정 완료 전에

농림축산검역본부 고시 「수출입식물검역소독처리규정」 별지 제1호서식의 소독계획서 또는 폐기·반송요청서를 제출하는 경우 관리병해충에 준하여 처분할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우는 소독계획서를 인정하지 않는다.

1. 금지병해충 그룹에 해당될 수 있다고 판단될 경우
2. 수입금지제외기준에 따라 수입 허용된 식물에서 검출된 병해충이 요건에 부적합한 것으로 판단될 경우

제5조(병해충 분류동정 절차와 방법) ① 현장검역관은 수입검역과정에서 발견된 병해충에 대하여 소유자 또는 그 대리인이 제4조제3항에 따른 소독계획서 또는 폐기·반송요청서를 제출하지 않은 경우에는 실험실정밀검역관에게 분류동정을 의뢰한다. 다만, 독자처분해충은 제외할 수 있다.

② 실험실정밀검역관은 제1항에 따라 분류동정 의뢰된 병해충과 실험실정밀검역 과정에서 발견된 병해충에 대하여 분류동정을 실시한다.

③ 실험실정밀검역관은 자체 분류동정이 어렵다고 판단되는 경우에는 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 사무소장은 자체 분류동정이 어려울 경우 식물검역통합정보시스템을 이용하여 해당 지역본부 시험분석과에 분류동정을 의뢰한다.
2. 지역본부장은 자체 분류동정이 어려울 경우 병해충정보시스템을 활용하여 내·외부전문가에게 분류동정을 의뢰할 수 있으며, 그 절차·방법 및 관련조치는 제7조제1항부터 제5항까지의 규정을 준용한다.

④ 실험실정밀검역관은 제2항 또는 제3항의 분류동정 결과 다음 각 호에 해당되지 않거나 분류동정이 불가능한 것으로 판단되는 알·유충·번데기 또는 성충의 경우는 잠정규제병해충으로 결정한다. 이 경우 알·유충·번데기 등 미성숙태해충의 분류동정 불가능 여부 판단은 제5항의 규정에 따른다.

1. 규제병해충(금지병해충·관리병해충·규제비검역병해충)으로 지정된 종
2. 다음 각 목에 기록되어 있는 병해충(이하 "비검역병해충"이라 한다). 다만, 다음에 기록되어 있더라도 국내·외 학술지 등에 국내 미분포 사실이 발표되었거나 국내분포 근거가 불분명한 경우에는 위험관리과에 확인을 요청할 수 있다.

가. 별표 1의 곤충, 응애, 선충, 달팽이 중 식물에 피해를 주지 않는 그룹에 해당되는 종

나. 선충·응애 : 한국동물명집(1996, 한국동물분류학회)

다. 병원체 : 한국식물병명목록 제6판(2022, 한국식물병리학회)

라. 잡초 : 농림축산검역본부 누리집에 게재된 잡초확인목록의 잡초 중 ‘국내 분포종’(잡초확인목록은 누리집에 게시된 최신 목록을 따른다)

마. 병해충위험분석 결과 비검역병해충으로 평가된 종(비검역병해충 종은 누리집에 게시된 최신 목록을 따른다)

3. 농림축산검역본부 누리집에 게재된 잡초확인목록 중 잡초에 해당되지 않는 식물 또는 누리집에 게재된 위험평가 기준이 되는 주요문헌에 잡초기록이 없고 외국의 검역잡초에 해당되지 않는 식물

⑤ 알·유충·번데기 등의 미성숙태 해충에 대해서는 다음 각 호와 같이 분류동정한다.

1. 미성숙태 상태로 종(種) 동정이 가능한 경우에는 분류동정 결과에 따라 처리한다.
2. 미성숙태 상태로 종 동정이 불가능한 경우에는 사육하여 분류동정 할 수 있으며, 사육 시에는 식물검역통합정보시스템에 해충사육 내역을 기록한다. 다만, 사육 중 소유자 또는 그 대리인이 「수출입식물검역소독처리규정」 별지 제1호서식의 소독계획서 또는 폐기·반송요청서를 제출하거나 해충의 발육이 중단 또는 사멸된 경우에는 사육을 중단한다.
3. 제1호 및 제2호에 근거하여 종 동정이 불가능하다고 판단되는 경우에는 잠정규제해충으로 결정한다.

⑥ 실험실정밀검역관은 제2항 또는 제3항의 분류동정 결과 확인된 별표 2의 기타 무척추동물 중 식물에 피해를 주지 않는 그룹에 대해서는 병해충에 해당되지 않는 종으로 처리한다.

⑦ 제4항제2호단서 규정의 학술지 등은 다음 각 호의 어느 하나를 말하며, 국내 미분포 사실이 발표되었는지 확인이 어려운 경우에는 위험관리과장에게 확인을 받아 처리한다.

1. 한국연구재단 등재학술지 또는 등재후보학술지로 인정된 학술지
2. 과학기술정보통신부, 농림축산식품부, 기후에너지환경부, 농촌진흥청, 산림청 및 그 산하 연구기관의 연구보고서
3. 국외학술지(SCIE, SCOPUS, MEDLINE 등재지 등)

⑧ 실험실정밀검역관은 분류동정된 병해충이 제4항제2호의 비검역병해충에 해당되는지가 명확하지 아니한 경우에는 위험관리과장에게 병해충위험분석을 의뢰하고 그 결과에 따라 처분한다.

제6조(분류동정 결과 처리) 실험실정밀검역관은 수입검역과정에서 발견된 병해충의 분류동정 결과를 식물검역통합정보시스템에 등록하여 현장검역관에게 통보한다.

제7조(잠정규제병해충 등에 대한 사후조치) ① 실험실정밀검역관은 제4조 제3항의 관리병해충에 준하여 처분한 병해충과 제5조제4항에 따라 잠정규제병해충으로 처분한 병해충 중 사육이 완료된 해충에 대하여는 사후 분류동정(당초 분류동정이 불가능하여 잠정규제병해충으로 판정한 병해충은 제외)을 실시한다. 다만, 자체 분류동정이 어려운 병해충은 제5조제3항에 따라 처리하되, 공동분류동정을 하거나 병해충정보시스템의 ‘병해충 분류동정’ 서식을 이용하여 다음 각 호와 같이 내부전문가에게 분류동정을 의뢰한다.

1. 분류동정 시료는 내부전문가에게 별도로 송부하여야 한다. 다만, 병해충정보시스템을 통한 영상자료 등에 의해 분류동정이 가능한 경우에는 표본(시료)을 별도로 송부하지 않을 수 있다.
2. 분류동정 의뢰 시 정책부서 또는 사무소에 근무하는 전문가에게는 가급적 의뢰를 지양한다.

② 공동분류동정을 의뢰한 자는 분류동정 결과를 병해충정보시스템에 입력한다. 분류동정을 의뢰받은 내부전문가는 병해충정보시스템에 의뢰서가 접수된 후 30일 이내에 분류동정한 결과를 병해충정보시스템을 통해 회신한다.

③ 제1항 단서에 의한 병해충 분류동정을 의뢰할 적합한 내부전문가가 없어

외부전문가에게 분류동정을 의뢰할 필요가 있는 경우에는 별지 제2호서식의 병해충 분류동정 의뢰서를 첨부하여 문서로 위험관리과장에게 의뢰하고 필요 시 표본은 외부전문가에게 별도로 송부한다.

④ 제1항 및 제3항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 병해충은 내·외부전문가에 대한 분류동정 의뢰를 생략할 수 있다.

1. 앞서 분류동정 의뢰되어 분류동정 진행 중인 병해충과 형태학적으로 동일한 것으로 판단되는 병해충. 이 경우 분류동정 의뢰가 생략된 병해충의 분류학적 명칭은 앞서 분류동정 의뢰된 병해충의 분류동정 결과에 따른다.
2. ‘이전에 분류동정이 완료된 병해충으로서 속 단위로만 분류동정된 병해충’과 형태학적으로 동일한 것으로 판단되는 병해충
3. 해당 내부전문가 또는 외부전문가와 협의한 결과 분류동정이 불가능한 것으로 판단되는 병해충

⑤ 위험관리과장은 제1항부터 제3항까지 또는 제5조제3항의 내·외부전문가에 대한 분류동정 의뢰와 관련하여 다음 각 호와 같은 조치를 하여야 한다.

1. 제3항의 규정에 따라 외부전문가에 대한 분류동정 의뢰서를 접수한 경우 별지 제3호서식의 병해충 분류동정 결과통보서를 첨부하여 외부전문가에게 분류동정 자문을 요청한다.
2. 분류동정 자문 요청에 따라 회신된 분류동정 결과는 지역본부장·사무소장에게 통보하고, 외부전문가에게 자문료를 지급한다.
3. 제1항 또는 제3항에 따라 분류동정된 병해충의 코드가 없는 경우에는 신규 코드를 부여하여 식물검역통합정보시스템에 등록한다.

제8조(병해충 표본 등록 및 관리) ① 식물검역과정에서 발견된 병해충에 대해 분류동정을 실시한 경우 다음 각 호와 같이 병해충명 및 표본번호를 해당 식물검역통합정보시스템에 등록한다. 다만, 분자생물학적검사 또는 혈청학적검사에서 검출된 병해충과 비검역병해충은 해당 병해충명만 입력하고 별도 표본제작은 하지 않는다.

1. 독자처분해충의 표본은 현장검역관이 식물검역통합정보시스템에 등록

하고 부여된 표본관리번호를 명시하여 실험실에 인계한다.

2. 독자처분 이외 병해충은 실험실정밀검역관이 식물검역통합정보시스템에 등록한다.

② 등록이 끝난 표본에 대해서는 다음 각 호와 같이 관리한다. 다만, 분자생물학적검사 또는 혈청학적검사의 경우 규제병해충 또는 잠정규제병해충으로 분류동정된 검사결과 자료는 해당 검사 건에 첨부하고 그 외의 검사결과 자료는 자동기록장치 및 실험노트에 검사 건별로 구분이 가능하도록 기록하고 2년간 보관한다.

1. 표본관리는 표본정보를 등록한 기관에서 관리한다. 다만, 내부전문가가 다른 지역본부로부터 분류동정을 의뢰받아 분류동정한 경우에는 해당 내부전문가가 소속된 기관에서 관리(표본정보는 분류동정을 의뢰한 기관에서 등록)하되 자신이 소속된 기관에서 검출한 병해충과 별도로 구분하여 관리하고, 외부전문가가 분류동정한 경우에는 표본정보를 등록한 기관에서 반납 받아 관리한다.

2. 제1호에도 불구하고 표본정보가 등록된 표본 중 식물검역과정에서 최초로 발견된 병해충의 표본은 문서에 의해 종 동정 시점으로부터 3개월 이내에 식물검역기술개발센터에 관리를 이관하고, 식물검역기술개발센터는 이를 표본관리시스템에 의하여 준영구적으로 관리하여야 한다.

3. 알, 유충, 번데기 등의 형태로 발견된 표본은 100% 알콜에 넣어 보관한다.

4. 실험실정밀검역관은 제2호의 최초로 발견된 병해충 외의 표본은 1개월간 보관하여야 한다. 다만, 각 지역본부 또는 사무소는 보관기간이 지난 표본을 대조표본으로 업무에 활용하거나 식물검역기술개발센터 또는 타 지역본부·사무소에서 업무에 활용할 수 있도록 제공할 수 있다.

5. 제1호부터 제4호까지의 규정에도 불구하고 소송과 관련(보관기간 종료 이전에 소송과 관련된 건임을 인지한 경우에 한한다)된 표본은 소송 종료시까지 관리한다.

6. 제1호부터 제5호까지의 규정에도 불구하고 관리기간 중 표본이 장기보관 등으로 인해 손상·훼손되어 표본의 가치가 상실된 경우에는 해당 표본의

관리를 종료할 수 있다.

제9조(결과활용) ① 위험관리과장은 제5조제3항, 제7조제1항에서 제3항에 따른 전문가별 병해충 분류동정 의뢰·회신실적을 반기별로 집계하고 그 결과를 각 지역본부와 공유한다.

② 위험관리과장은 제1항에 따른 분류동정 회신실적이 우수한 실험실정밀 검역관 및 내부전문가, 공동분류동정 참여자는 국외훈련 등 해외출장 대상자로 우선 추천할 수 있다.

제10조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령)에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표1]

곤충, 응애, 선충, 달팽이의 식물피해 여부

가. 곤충(절지동물문, 육각아문, 곤충강)

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
돌좀목(Archaeognatha)	-	돌좀목(Archaeognatha)
좀목(Zygentoma)	좀목(Zygentoma)	-
하루살이목(Ephemeroptera)	-	하루살이목(Ephemeroptera)
잠자리목(Odonata)	-	잠자리목(Odonata)
바퀴목(Blattodea)	Archotermopsidae, 왕바퀴과(Blattidae), 바퀴과(Ectobiidae), Heterotermitidae, Hodotermitidae, Hodotermopsidae, 마른나무흰개미과(Kalotermitidae), Macrotermitidae, Mastotermitidae, Psammotermitidae, 흰개미과(Rhinotermitidae), Serritermitidae, Stolotermitidae, Stylotermitidae, Termitidae	Blaberidae, Corydiidae, 갑옷바퀴과(Cryptocercidae), Lamproblattidae, Nocticolidae, Tryonicidae
사마귀목(Mantodea)	-	사마귀목(Mantodea)
집게벌레목(Dermaptera)	집게벌레과(Forficulidae)	민집게벌레과(Anisolabididae), Apachelytridae, Apachyidae, Archelytridae, Arixeniidae, Bardocoleidae, Bellodermatidae, Chelisochidae, Dermelytridae, Diplatyidae, Elytroneuridae, Haplodiplatyidae, Hemimeridae, Labidelytridae, 큰집게벌레과(Labiduridae), Megelytridae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		Ocelliidae, Permelytridae, Permofulgoridae, Permophilidae, Planelytridae, Protelytridae, Protocoleidae, 긴가슴집게벌레과(Pygiicranidae), 꼬마집게벌레과(Spongiphoridae)
흰개미붙이목(Embiopoda)	흰개미붙이목(Embiopoda)	-
귀뚜라미붙이목(Grylloblattodea)	-	귀뚜라미붙이목(Grylloblattidae)
대벌레붙이목(Mantophasmatodea)	-	대벌레붙이목(Mantophasmatidae)
메뚜기목(Orthoptera)	메뚜기목(Orthoptera)	-
대벌레목(Phasmida)	대벌레목(Phasmida)	-
강도래목(Plecoptera)	메추리강도래과(Taeniopterygidae)	Austroperlidae, 흰배강도래과(Capniidae), Cavoperlidae, 녹색강도래과(Chloroperlidae), Crossoperlidae, Diamphipnoidae, Eustheniidae, Gripopterygidae, Kachinoperlidae, Kathroperlidae, 꼬마강도래과(Leuctridae), 민강도래과(Nemouridae), Notonemouridae, 넓은가슴강도래과(Peltoperlidae), 강도래과(Perlidae), 그물강도래과(Perlodidae), 큰그물강도래과(Pteronarcyidae), 민날개강도래과(Scopuridae), Styloperlidae
민벌레목(Zoraptera)	-	민벌레목(Zoraptera)
노린재목(Hemiptera)		
노린재아목(Heteroptera)		
머리목노린재하목	-	머리목노린재하목(Enicocephalomorpha)

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
(Enicocephalomorpha)		
좁쌀노린재하목 (Dipsocoromorpha)	-	좁쌀노린재하목(Dipsocoromorpha)
장구애비하목(Nepomorpha)	-	장구애비하목(Nepomorpha)
소금쟁이하목(Gerromorpha)	-	소금쟁이하목(Gerromorpha)
갯노린재하목(Leptopodomorpha)	-	갯노린재하목(Leptopodomorpha)
빈대하목(Cimicomorpha)	장님노린재과(Miridae), Thaumastocoridae, 방패벌레과(Tingidae), 꽃노린재과(Anthocoridae)의 <i>Paratriphleps</i> 속	빈대과(Cimicidae), Curaliidae, Joppeicidae, Lasiochilidae, 천적노린재과(Lyctocoridae), 췌기노린재과(Nabidae), Medocostidae, Microphysidae, Pachynomidae, Plokiophilidae, Polychtenidae, 침노린재과(Reduviidae), Velocipedidae, 꽃노린재과(Anthocoridae)의 <i>Paratriphleps</i> 속에 속하는 종 이외의 그룹
노린재하목(Pentatomomorpha)	노린재하목(Pentatomomorpha)	-
매미아목(Auchenorrhyncha)	매미아목(Auchenorrhyncha)	-
진딧물아목(Sternorrhyncha)	진딧물아목(Sternorrhyncha)	-
다듬이목(Psocodea)	책다듬이벌레과(Liposcelididae), 가루민다듬이벌레과 (Trogidae)	Amphientomidae, 털다듬이벌레과(Amphipsocidae), Ancistrionidae, Archipsocidae, Asiopsocidae, 털이과(Boopiidae), Bovicolidae, 깃털다듬이벌레과 (Caeciliusidae), Cladiopsocidae, Colpocephalidae, Compsocidae, Dasydemellidae, Dasyonygidae, Dolabellopsocidae, Echinophthiriidae, Echinoponidae, 외다듬이벌레과

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		(Ectopsocidae), Elipsocidae, Embidopsocidae, 다람쥐이과(Enderleinellidae), Epipsocidae, Gliricolidae, Gonioididae, 쥐털이과(Gyropidae), Haematomyzidae, 돼지이과(Haematopinidae), Hamophthiriidae, Hemipsocidae, Heptapsogastridae, 발쥐이과(Hoplopleuridae), Hybophthiridae, 애기털다듬이벌레과(Lachesillidae), Laemobothriidae, Lepidopsocidae, Lesneiidae, 개이과(Linognathidae), Lipeuridae, Manicapsocidae, 새털이과(Menoponidae), Mesopsocidae, Microthoraciidae, Musapsocidae, Myopsocidae, Neolinognathidae, Pachytroctidae, Paracaeciliidae, Pecaroecidae, Pedicinidae, 이과(Pediculidae), 창다듬이벌레과(Peripsocidae), 참새털이과 (Ptilopteridae), Philotarsidae, 집이과(Polyplacidae), Prionoglarididae, Protroctopsocidae, 은털다듬이벌레과(Pseudocaeciliidae), Pseudomenoponidae, Psilopsocidae, 다듬이벌레과(Psocidae), Psoquillidae, Psyllipsocidae, 사면발이과(Pthiridae), Ptiloneuridae, Ratemiidae, Ricinidae, Sabulopsocidae, Somaphantidae, Spurostigmatidae, 연문다듬이벌레과(Stenopsocidae), Thoracotroctidae, 짐승털이과(Trichodectidae), Trichophilopteridae, Trichopsocidae, Trimenoponidae, Trinotonidae, Troctopsocidae
총채벌레목(Thysanoptera)	총채벌레목(Thysanoptera)	-

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
풀잠자리목(Neuroptera)	-	풀잠자리목(Neuroptera)
약대벌레목(Raphidioptera)	-	약대벌레목(Raphidioptera)
뱀잠자리목(Megaloptera)	-	뱀잠자리목(Megaloptera)
딱정벌레목(Coleoptera)		
원시딱정벌레아목(Archostemata)	원시딱정벌레아목(Archostemata)	-
식균아목(Myxophaga)	-	식균아목(Myxophaga)
식육아목(Adephaga)	딱정벌레과(Carabidae)의 조롱박먼지벌레아과(Scaritinae), 먼지벌레아과(Harpalinae) 중 둥글먼지벌레족(Zabrini)	백두벌레과(Amphizoidae), Aspidytidae, 물방개과(Dytiscidae), 물뱀이과(Gyrinidae), 물진드기과(Haliplidae), Hygrobiidae, Meruidae, 자색물방개과(Noteridae), 어리강변먼지벌레과(Trachypachidae), 등줄벌레과(Rhysodidae), 딱정벌레과(Carabidae)의 Apotominae, 폭탄먼지벌레아과(Brachininae), 딱정벌레불리아과(Broscinae), 딱정벌레아과(Carabinae), 길앞잡이아과(Cicindelinae), 길앞잡이불리아과(Elaphrinae), Hiletinae, 흑부리먼지벌레아과(Loricarinae), Melaeninae, Migadopinae, 가슴먼지벌레아과(Nebriinae), Nototylinae, Omphroninae, 습지먼지벌레아과(Patrobinae), Paussinae, Promecognathinae, Rhysodinae, Siagoninae, 꼬마먼지벌레아과(Trechinae), 먼지벌레아과(Harpalinae) 중 둥글먼지벌레족(Zabrini)에 속하지 않는 그룹
다식아목(Polyphaga)		

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
물땡땡이상과(Hydrophiloidea)	물땡땡이과(Hydrophilidae)	Epimetopidae, 모래살이과(Georissidae), 투구물땡땡이과(Helophoridae), 곰보물땡땡이과(Hydrochidae), Spercheidae
반날개상과(Staphylionoidea)	알버섯벌레과(Leiodidae), 송장벌레과(Silphidae)	먼지송장벌레과(Agyrtidae), Colonidae, 호리가슴땡땡이과(Hydraenidae), Jacobsoniidae, Ptiliidae, 반날개과(Staphylinidae)
풍뎅이붙이상과(Histeroidea)	-	풍뎅이붙이상과(Histeroidea)
풍뎅이상과(Scarabaeoidea)	Belohinidae, Diphylostomatidae, Glaphyridae, Glaresidae, 바가지촉각풍뎅이과(Hybosoridae), 사슴벌레과(Lucanidae), 붙이금풍뎅이과(Ochodaeidae), 사슴벌레붙이과(Passalidae), Pleocomidae, 풍뎅이과(Scarabaeidae)의 Aclopininae, 소똥구리붙이아과(Aegialiinae), Allidiostomatinae, 똥풍뎅이아과(Aphodiinae), Aulonocnerminae, 꽃무지아과(Cetoniinae), Chironinae, 장수풍뎅이아과(Dynastinae), Dynamopodinae, Eremazinae, Lichniinae, 검정풍뎅이아과(Melolonthinae), Oncerinae, Orphninae, Phaenomeridinae, Podolasiinae, 풍뎅이아과(Rutelinae), Sericinae, Sericoidinae, Termitotroginae	참금풍뎅이과(Bolboceratidae), 금풍뎅이과(Geotrupidae), 송장풍뎅이과(Trogidae), 풍뎅이과(Scarabaeidae)의 소똥구리아과(Scarabaeinae)
Dascilloidea	Dascillidae	Rhipiceridae
알꽃벼룩상과(Scirtoidea)	-	알꽃벼룩상과(Scirtoidea)
둥근가시벌레상과(Byrrhoidea)	-	둥근가시벌레상과(Byrrhoidea)
비단벌레상과(Buprestoidea)	비단벌레상과(Buprestoidea)	-

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
방아벌레상과(Elateroidea)	옛방아벌레과(Artematopodidae), Brachypsectridae, 병대벌레과(Cantharidae), 고목방아벌레과(Cerophytidae), Drilidae, 방아벌레과(Elateridae), 어리방아벌레과(Eucnemidae), Omalisidae, Omethidae, Plastoceridae, Sinopyrophoridae, 거짓방아벌레과(Throscidae)	반딧불이과(Lampyridae), 홍반디과(Lycidae), Phengodidae, Rhagophthalmidae
개나무좀상과(Bostrichoidea)	개나무좀상과(Bostrichoidea)	-
Derodontoidea	Derodontoidea	-
개미불이상과(Cleroidea)	쌀도적과(Trogossitidae), 개미불이과(Cleridae)의 <i>Necrobia</i>속	Acanthocnemidae, Chaetosomatidae, Mauroniscidae, 의병벌레과(Melyridae), Metaxinidae, Phloiophilidae, Phycosecidae, Prionoceridae, Thanerocleridae, 개미불이과(Cleridae)의 <i>Necrobia</i>속 이외의 그룹
통나무좀상과(Lymexyloidea)	통나무좀과(Lymexylonidae)	-
머리대장상과(Cucujoidea)	쭈시기불이과(Byturidae), 곡식쭈시기과(Cryptophagidae), 버섯벌레과(Erotylidae), 나무쭈시기과(Helotidae), 긴수염밀빠진벌레과(Kateretidae), 허리머리대장과(Laemophloeidae), 꽃알벌레과(Phalacridae), 가는납작벌레과(Silvanidae) 밀빠진벌레과(Nitidulidae)의 넓적밀빠진벌레아과(Carpophilinae), Cillaeinae,	Agapythidae, 배줄벌레과(Biphyllidae), Boganiidae, Cavognathidae, 머리대장과(Cucujidae), Cyclaxyridae, Hobartiidae, Lamingtoniidae, 톱가슴긴고목벌레과(Monotomidae), Myraboliidae, 대롱벌레과(Passandridae), Phloeostichidae, Priasilphidae, Propalticidae, Protocucujidae, Smicripidae, 둥근아기벌레과(Sphindidae), Tasmosalpingidae, 밀빠진벌레과(Nitidulidae)의 Amphilcrossinae, Calonecrinae, Cryptarchinae, Cybocephalinae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
	Epuraeinae, 알밑빠진벌레아과(Meligethinae), 밑빠진벌레아과(Nitidulinae), 큰턱밑빠진벌레아과(Prometopiinae)	Maynipeplinae,
무당벌레상과(Coccinelloidea)	애고목벌레과(Cerylonidae), 무당벌레과(Coccinellidae)의 무당벌레아과 (Coccinellinae) 중 무당벌레불이족(Epilachnini), 무당벌레불이과(Endomychidae)의 <i>Mycetaea</i> 속, <i>Saula</i> 속, <i>Holoparamecus</i> 속	Akalypptoischiidae, Alexiidae, 마른가지벌레과(Bothrideridae), 고목둥근벌레과(Corylophidae), 아기쪽박벌레과(Discolomatidae), 설패벌레과(Latridiidae), Teredidae, 무당벌레과(Coccinellidae)의 Microweiseinae, Monocoryninae, 무당벌레아과(Coccinellinae) 중 무당벌레불이족(Epilachnini)에 속하지 않는 그룹 무당벌레불리아과(Epilachninae)의 <i>Mycetaea</i> 속, <i>Saula</i> 속, <i>Holoparamecus</i> 속 이외의 그룹
거저리상과(Tenebrionoidea)	애기버섯벌레과(Ciidae), 긴썩덩벌레과(Melandryidae), 가뢰과(Meloidae), 꽃벼룩과(Mordellidae), 애버섯벌레과(Mycetophagidae), 하늘소불이과 (Oedemeridae), 거저리과(Tenebrionidae), 흑거저리과(Zopheridae)	뿔벌레불이과(Aderidae), 뿔벌레과(Anthicidae), 나무껍질벌레과(Archeocrypticidae), Chalcodryidae, Ischaliidae, Mycteridae, Perimylopidae, 작은발머리대장과(Prostomidae), Pterogeniidae, 홍날개과(Pyrochroidae), 납작거저리과(Pythidae), 왕꽃벼룩과(Rhipiphoridae), 썩덩벌레불이과(Salpingidae), 꽃벼룩불이과(Scraptiidae), 목대장과(Stenotrachelidae), 넓적썩덩벌레과(Synchroidae), 애버섯벌레불이과(Tetratomidae), Trachelostenidae, 사슴하늘소불이과(Trictenotomidae), Ulodidae

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
잎벌레상과(Chrysomeloidea)	잎벌레상과(Chrysomeloidea)	-
바구미상과(Curculionoidea)	바구미상과(Curculionoidea)	-
부채벌레목(Strepsiptera)	-	부채벌레목(Strepsiptera)
파리목(Diptera)		
모기아목(Nematocera)	Axymyiidae, 털파리과(Bibionidae), 혹파리과(Cecidomyiidae), 등에모기과(Ceratopogonidae), 갈따구과(Chironomidae), 버섯파리과(Mycetophilidae), Nymphomyiidae, 산모기파리과(Pachyneuridae), 털파리붙이과(Scatopsidae), 검정날개버섯파리과 (Sciaridae), 각다귀과(Tipulidae), 어리각다귀과 (Trichoceridae)	모기파리과(Anisopodidae), 멧모기과(Blephariceridae), Bolitophilidae, Canthyloscelidae, 털모기과(Chaoboridae), Corethrellidae, 모기과(Culicidae), 어리멧모기과(Deuterophlebiidae), Diadocidiidae, Ditomyiidae, 별모기과(Dixidae), 긴수염버섯파리과(Hesperinidae), Keroplatidae, Lygistorrhinidae, 장수각다귀과(Pediciidae), Perissommatidae, 나방파리과(Psychodidae), 다리무늬각다귀붙이과(Ptychopteridae), Rangomaramidae, 먹파리과(Simuliidae), 어리모기각다귀붙이과(Tanyderidae), Thaumaleidae
등에아목(Brachycera)	굴파리과(Agromyzidae), 꽃파리과(Anthomyiidae), 풀파리과(Anthomyzidae), 꼬마파리과(Asteiidae), 노랑굴파리과(Chloropidae), Clusiidae, 초파리과(Drosophilidae), 물가파리과(Ephydriidae), 가시날개파리과(Heleomyzidae), 큰날개파리과 (Lauxaniidae), 감장파리과(Lonchaeidae), 뽕죽날개파리과(Lonchopteridae),	Acartophthalmidae, 꼽추등에과(Acroceridae), Apioceridae, Apsilocephalidae, Apystomyiidae, 파리매과 (Asilidae), Atelestidae, Athericidae, 두메파리과 (Aulacigastridae), Australimyziidae, Austroleptidae, Bolbomyiidae, 재니등에과(Bombyliidae), Braulidae, 검정파리과(Calliphoridae), Camillidae, 해변파리과 (Canacidae), Carnidae, Celyphidae, 진디파리과

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
	죽마파리과(Micropezidae), Odiniidae, Opomyzidae, 신선파리과 (Pallopteridae), 벼룩파리과(Phoridae), Platypezidae, 알락파리과(Platystomatidae), 녹파리과(Psilidae), Richardiidae, Ropalomeridae, 똥파리과(Scathophagidae), 애기똥파리과(Sphaeroceridae), 동애등에과(Stratiomyidae), 꽃등에과(Syrphidae), 과실파리과(Tephritidae), 띠날개파리과(Ulidiidae, Otitidae)	(Chamaemyiidae), Chyromyidae, 해초파리과 (Coelopidae), 벌불이파리과(Conopidae), Cremifaniidae, Cryptochaetidae, Curtonotidae, Cypselosomatidae, 산파리과(Diastatidae), Diopsidae, 대모파리과(Dryomyzidae), 춤파리과(Empididae), Evocoidae, 딸집파리과(Fanniidae), Fergusoninidae, Glossinidae, Gobryidae, Helcomyzidae, Helosciomyzidae, Heterocheilidae, Hilarimorphidae, 이파리과(Hippoboscidae), 춤파리불이과(Hybotidae), Inbiomyiidae, Ironomyiidae, Marginidae, 길쭉파리과 (Megamerinidae), Mesembrinellidae, 불청객파리과 (Milichiidae), Mydidae, Mystacinobiidae, Mythicomyiidae, Nannodastiidae, 어리재니등에과 (Nemestrinidae), Neminidae, 좀파리과(Neriidae), Neurochaetidae, Nothybidae, 거미파리과 (Nycteribiidae), 쇠파리과(Oestridae), Opetiidae, Oreoleptidae, Pantophthalmidae, Pelecorhynchidae, Periscelididae, 팔랑파리과(Piophilidae), 머리파리과(Pipunculidae), 풍뎡이파리과(Pyrgotidae), 노랑등에과(Rhagionidae), 초록파리과(Rhiniidae), 쥐며느리파리과(Rhinophoridae), 쉬파리과(Sarcophagidae), Scenopinidae, 들파리과(Sciomyzidae), 꼭지파리과 (Sepsidae), Somatiidae, 박쥐파리과(Strebliidae), 긴다리파리과(Strongylophthalmyiidae), Syringogastridae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
	장다리파리과(Dolichopodidae)의 <i>Thrypticus</i> 속 집파리과(Muscidae)의 <i>Atherigona</i> 속	등에과(Tabanidae), 기생파리과(Tachinidae), Tanypeziidae, Teratomyzidae, 좀파리매과(Therevidae), Ulurumyiidae, Vermileonidae, Xenasteiidae, 점밀들이파리매과(Xylomyidae), 밀들이파리매과(Xylophagidae) 장다리파리과(Dolichopodidae)의 <i>Thrypticus</i> 속 이외의 그룹 집파리과(Muscidae)의 <i>Atherigona</i> 속 이 외의 그룹
밀들이목(Mecoptera)	-	밀들이목(Mecoptera)
벼룩목(Siphonaptera)	-	벼룩목(Siphonaptera)
날도래목(Trichoptera)	네모집날도래과(Lepidostomatidae), 나비날도래과(Leptoceridae), 우묵날도래과(Limnephilidae)	Anomalopsychidae, Antipodoeciidae 애우묵날도래과(Apataniidae), Atriplectididae, Barbarochthonidae, Beraeidae, 등근얼굴날도래과(Brachycentridae), 채다리날도래과(Calamoceratidae), Calocidae, Chathamidae, Conoesucidae, Dipseudopsidae, 별날도래과(Ecnomidae), 광택날도래과(Glossosomatidae), 가시날도래과(Goeridae), Helicophidae, 달팽이날도래과(Helicopsychidae), 긴발톱물날도래과(Hydrobiosidae), 줄날도래과(Hydropsychidae), 애날도래과(Hydroptilidae), Hydrosalpingidae, Kokiriidae, Limnocentropodidae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		날개날도래과(Molannidae), 바수염날도래과(Odontoceridae), Oeconesidae, Petrothrincidae, 입술날도래과(Philopotamidae), Philorheithridae, 날도래과(Phyrganeidae), 둥근날개날도래과(Phyrganopsychidae), Pisuliidae, Plectrotarsidae, 깃날도래과(Polycentropodidae), 통날도래과(Psychomyiidae), Ptilocolepidae, 물날도래과(Rhyacophilidae), Rossianidae, 털날도래과(Sericostomatidae), 각날도래과(Stenopsychidae), Tasimiidae, 가시우묵날도래과(Uenoidae), Xiphocentronidae
나비목(Lepidoptera)	나비목(Lepidoptera)	-
벌목(Hymenoptera)		
잎벌아목(Symphyta)	Anaxyelidae, 등에잎벌과(Argidae), 고사리줄기잎벌과(Blasticotomidae), 나무벌과(Cephidae), 수중다리잎벌과(Cimbicidae), 솔잎벌과(Diprionidae), 빗니수염잎벌과(Megalodontesidae), 납작잎벌과(Pamphiliidae), Pergidae, 송곳벌과(Siricidae), 잎벌과(Tenthredinidae), 목대장송곳벌과(Xiphydriidae), 칼잎벌과(Xyelidae)	벌레살이송곳벌과(Orussidae)
벌아목(Apocrita)		
수염먹좀벌상과(Ceraphronoidea)	-	수염먹좀벌상과(Ceraphronoidea)
좀벌상과(Chalcidoidea)	좀벌과(Eulophidae), Epichrysomallidae, 씨살이좀	Agaonidae, 면충좀벌과(Aphelinidae), Azotidae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
	벌과(Eurytomidae), 왕꼬리좀벌과(Megastigmidae), 금 좀벌과(Pteromalidae), 꼬리좀벌과(Torymidae) 몽푹혹좀벌과(Tanaostigmatidae),	Baeomorphidae, Boucekiidae, Calesidae, Ceidae, Cerocephalidae, Chalcedectidae, 수중다리좀벌과(Chalcididae), Chrysolampidae, Cleonymidae, Coelocybidae, Cynipencyrtidae, Diparidae, 갯충좀벌과(Encyrtidae), 개미살이좀벌과(Eucharitidae), Eunotidae, 벼룩좀벌과(Eupelmidae), Eutrichosomatidae, Herbertiidae, Hetreulophidae, Heydeniidae, Idioporidae, 밑들이좀벌과(Leucospidae), Lyciscidae, Macromesidae, Melanosomellidae, Metapelmatidae, Moranilidae, 총채벌과(Mymaridae), Neanastatidae, Neodiparidae, Ooderidae, 남색꼬리좀벌과(Ormyridae), Pelecinellidae, Perilampidae, Pirenidae, Signiphoridae, Spalangiidae, Systasidae, Tetracampidae, 알벌과(Trichogrammatidae)
혹벌상과(Cynipoidea)	혹벌과(Cynipidae)	Austrocynipidae, 기생혹벌과(Figitidae), 납작혹벌과(Ibaliidae), 큰기생혹벌과(Liopteridae)
염주벌상과(Diaprioidea)	-	염주벌상과(Diaprioidea)
호리벌상과(Evanioidea)	-	호리벌상과(Evanioidea)
맵시벌상과(Ichneumonidea)	고치벌과(Braconidae) 의 Mesostoinae아과 및 Doryctinae아과	맵시벌과(Ichneumonidae), 고치벌과(Braconidae) 의 Mesostoinae아과 및 Doryctinae아과 이외의 그룹
Megalyroidea상과	-	Megalyroidea상과
Mymarommatoidea상과	-	Mymarommatoidea상과
납작먹좀벌상과(Platygastroidea)	-	납작먹좀벌상과(Platygastroidea)

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
먹좀벌상과(Proctotrupoidea)	-	먹좀벌상과(Proctotrupoidea)
Stephanoidea상과	-	Stephanoidea상과
갈고리벌상과(Trigonaloidea)	-	갈고리벌상과(Trigonaloidea)
꿀벌상과(Apoidea)	가위벌과(Megachilidae), 꿀벌과(Apidae)의 어리호박벌아과(Xylocopinae)	는쟁이벌과(Ampulicidae), 애꽃벌과(Andrenidae), 어리꿀벌과(Colletidae), 은주둥이벌과(Crabronidae), 꼬마꽃벌과(Halictidae), Heterogynaidae, 털보애꽃벌과(Melittidae), 구멍벌과(Sphecidae), Stenotritidae, 꿀벌과(Apidae)의 어리호박벌아과(Xylocopinae)에 속하는 종 이외의 그룹
청벌상과(Chrysidoidea)	-	청벌상과(Chrysidoidea)
말벌상과(Vespoidea)	말벌과(Vespidae)	Bradynobaenidae, 개미벌과(Mutillidae), 대모벌과(Pompilidae), Rhopalosomatidae, 무당벌과(Sapygidae), 배벌과(Scoliidae), Sierolomorphidae, 굽뿔이벌과(Tiphiidae)
개미상과(Formicoidea)	개미과(Formicidae)	-

나. 응애(절지동물문, 협각아문, 거미강)

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
응애아강(Acari)		
Opilioacarida목	-	Opilioacarida목
사기문응애목(Holothyrida)	-	사기문응애목(Holothyrida)

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
후기문목응애목(Ixodida)	-	후기문목응애목(Ixodida)
중기문응애목(Mesostigmata)	딱지응애과(Ameroseiidae), Antennochelidae, 둥지좁진드기과·떠돌이응애과(Ascidae), Melicharidae	Aenictequidae, Antennophoridae, Arctacaridae, Asternoseiidae, Baloghjaskazabiidae, 납작응애과(Blattisociidae), Brasiluropodidae, Celaenopsidae, Cercomegistidae, Cillibidae, Clausiadinychidae, Coprozerconidae, Costacaridae, Cyllibulidae, Dasyponyssidae, Davacaridae, Deraiphoridae, 새진드기과(Dermanyssidae), Diarthrophallidae, Digamasellidae, 꼭지응애과(Dinychidae), Diplogyniidae, 돈응애과(Discourellidae), Discozerconidae, 뱀허파진드기과(Entonyssidae), 둥굴좁진드기과(Epicriidae), Euphysalozzerconidae, Eutrachytidae, Euzerconidae, 대창응애과(Eviphididae), Fedrizziidae, 털보좁진드기과(Haemogamasidae), Halarachnidae, Heatherellidae, Heterozzerconidae, Hoplomegistidae, Hutufeideriidae, Hystrichonyssidae, Ichthyostomatogasteridae, Iphiopsididae, 뱀비늘진드기과(Ixodorhynchidae), Kaszabjbaloghiidae, Klinckowstroemiidae, 가시진드기과(Laelapidae), Laelaptonyssidae, Larvanimidae, Leptolaelapidae, 파리응애과(Macrochelidae), Macrodynychidae, 가위집게진드기과(Macronyssidae), Manitherionyssidae, Megacelaenopsidae, Megisthanidae, Messoracaridae, Metagynuridae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		Microgyniidae, 털귀둥근응애과(Nenteriidae), Neotenogyniidae, Nothogynidae, 두판호리응애과(Ologamasidae), Omentolaelapidae, 개미접시응애과(Oplitidae), Otopheidomenidae, 포수응애과(Pachylaelapidae), Paramegistidae, Parantennulidae, 기생응애과(Parasitidae), 창응애과(Parholaspididae), Philodanidae, Phymatodiscidae, 이리응애과(Phytoseiidae), 팔응애과(Podocinidae), Polyaspididae, Prodinychidae, Promegistidae, Protodinychidae, Ptochacaridae, Pyrosejidae, Raillietiidae, Reginacharlottiidae, Rhinonyssidae, 호리응애과(Rhodacaridae), Rotundabaloghiidae, Saltiseiidae, Schizogyniidae, Seiodidae, 쌍꼬리응애과(Sejidae), Spelaeorhynchidae, 박쥐응애과(Spinturnicidae), Teranyssidae, Tetrasejaspidae, Thinozerconidae, 느림보가죽응애과(Trachytidae), 이랑접시응애과(Trachyuropodidae), Trematuridae, Trichocyllibidae, 털접시응애과(Trichuropodidae), Trichouropodellidae, 남방접시응애과(Trigonuropodidae), Triplogyniidae, Uroactiniidae, Urodiaspididae, Urodinychidae, Uropodellidae, 둥근접시응애과(Uropodidae), 꿀벌응애과(Varroidae), 잘록응애과 (Veigaiidae), Vitzthumegistidae, 구멍응애과 (Zerconidae)

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
Trombidiformes목		
Sphaerolichida아목	-	Sphaerolichida아목
전기문응애아목(Prostigmata)	Allochaetophoridae, Cocceupodidae, Dendrochaetidae, Diptilomiopidae, 흑응애과(Eriophyidae), Eriorhynchidae, Eupodidae, Linotetranidae, Microdispidae, Neopygmephoridae, Pentapalpidae, Penthaleidae, Penthlodidae, 숲흑응애과(Phytoptidae), Podapolipidae, 물집진드기과(Pyemotidae), 둥지먼지진드기과(Pygmephoridae), 흙응애과 (Rhagidiidae), 바가지응애과(Scutacaridae), 마름응애과(Stigmaeidae), Strandtmanniidae, 먼지진드기과· 먼지응애과(Tarsonemidae), 애응애과(Tenuipalpidae), 잎응애과(Tetranychidae), 조개치레응애과(Tuckerellidae), 애기응애과(Tydeidae)	Acalyptonotidae, Acarophenacidae, Achaemenothrombiidae, Acherontacaridae, Acucapitidae, Adamystidae, Allotanaupodidae, Amoenacaridae, Amphotrombiidae 알몸물응애과(Anisitsiellidae), 게응애과(Anystidae), Apheviderulicidae, Arenohydracaridae, 민등왕물응애과 (Arrenuridae), Astacocrotonidae, Athienemanniidae, Athyreacaridae, 갑물응애과(Aturidae), Audyanidae, Bandakiopsidae, Barbutiidae, 코응애과(Bdellidae), Bogatiidae, 가죽응애과 (Caeculidae), Caligonellidae, Calyptostomatidae, Camerobiidae, Caraboacaridae, Chappuisidae, 발톱진드기과(Cheyletidae), Chyzeriidae, Cloacaridae, Crotalomorphidae, 면사포응애과 (Cryptognathidae), Ctenothyadidae, 뽕죽응애과(Cunaxidae), Dasythyreidae, Demodecidae, Dolichocybidae, Dytiscacaridae, Epimyodidae Ereyetidae, 잔털응애과(Erythraeidae),

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		Erythraeidae, Eupalopsellidae, Eylaidae, 이끼물응애과(Feltriidae), Ferradasiidae, Frontipodopsidae, Halacaridae, Harpagopalpidae, Harpirhynchidae, Heterocheylidae, Homocaligidae, Hungarohydracaridae, 질주물응애과(Hydrodromidae), Hydrovolziidae, 느림보물응애과(Hydryphantidae), 날쌔물응애과 (Hygrobatidae), Iolinidae, Johnstonianidae, Kantacaridae, Krendowskiidae, 갑옷응애과 (Labidostommatidae), Laversiidae, Lebertiidae,쌍털진드기과(Leeuwenhoekiidae), Lethaxonidae, 색정물응애과(Limnesiidae), Limnocharidae, Malgasacaridae, Mecognathidae, Microdispidae, Microtrombidiidae, Mideidae, 납작물응애과(Mideopsidae), 못난물응애과(Momoniidae), 뿔진드기과(Myobiidae), Neoacaridae, Neopygmephoridae, Neothrombiidae, Nipponacaridae, Nudomideopsidae, Omartacaridae, Oxidae, Pezidae, Piersigiidae, Pionidae, Pomerantziidae, 갯물응애과 (Pontarachnidae), Pseudocheylidae, Psorergatidae, 흡윤개선충과(Psoroptidae), Pterygosomatidae, 배주머니응애과(Pyemotidae), Pygmephoridae, Raphignathidae, Resinacaridae, Rhynchohydracaridae, Rutripalpidae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		부식가루진드기과(Saproglyphidae), 옴진드기과 (Sarcoptidae), Smarididae, 사마귀물응애과 (Sperchontidae), Stigmocheylidae, Stygothrombiidae, Stygotoniidae, Syringophilidae, Tarsocheylidae, Teneriffiidae, Teratothyadidae, Teutoniidae, Thermacaridae, 급류물응애과(Torrenticolidae), Triophtydeidae, Trochometridiidae, Trombellidae, 털진드기과(Trombiculidae), 우단응애과(Trombidiidae), 말조개물응애과 (Unionicolidae) Wettinidae, Xenocaligonellididae, Yurebillidae, Zelandothyadidae
Sarcoptiformes목		
Endeostigmata아목	Nanorchestidae	Alicorhagiidae, Alycidae, Grandjeanicidae, Micropsammidae, Nematalycidae, Oehserchestidae, Protonematalycidae, Proterorhagiidae, Terpnacaridae
날개응애아목(Oribatida)	가루진드기과·가루응애과(Acaridae), Aeroglyphidae, Algophagidae, 설탕진드기과·설탕응애과 (Carpoglyphidae), 잔날개응애과 (Ceratozetidae), 닷응애과(Chaetodactylidae), 마루진드기과(Chortoglyphidae), 왕응애과(Crotoniidae=Camisiidae) Echimyopodidae, Euglycyphagidae, Gaudiellidae, Glycacaridae,	Acaronychidae, 뽕족날개응애과(Achipteriidae), Adelphacaridae, Adhaesozetidae, Aleurodamaeidae, 판깃털진드기과(Alloptidae), 민동정응애과 (Ameridae), Amerobelbidae, Ameronothridae, Ametroproctidae, 깃털진드기과(Analgidae), Anderemaeidae, Apionacaridae, Arborichthoniidae, Arceremaeidae, Aribatidae, Ascouracaridae, 달마응애과(Astegistidae),

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
	고기진드기과(Glycyphagidae), Hemisarcoptidae, Hyadesiidae, Lardoglyphidae, Meliponocoptidae, 사다리응애과(Mycobatidae), 팔자지게응애과(Oribatulidae), Pedetopodidae, 장수응애과(Perlohmanniidae), Rosensteiniidae, Scatoglyphidae, Suidasiidae, Winterschmidtidae	선녀응애과(Atopochthoniidae), 털살이응애과(Atopomelidae), 철로응애과(Auto gnetidae), 날개깃진드기과(Avenzoariidae), Basilobelbidae, 마디응애과(Brachychthoniidae), 알통다리응애과 (Caleremaeidae), Caloppiidae, Canestriniidae, 검둥이응애과(Carabodidae), Caudiferidae, Cepheusidae, Ceratokalummidae, 톱니머리응애과(Ceratoppiidae), Cerocephidae, Chamobatidae, Charassobatidae, Chetochelacaridae, Cheylabididae, Chirodiscidae, Chirorhynchobiidae, Collohmanniidae, 장식띠응애과(Cosmochthoniidae), Crypturoptidae, Ctenacaridae, 가시털염주응애과 (Ctenobelbidae), Cuneoppiidae, 자라응애과 (Cymbaeremaeidae), Cytoditidae, 염주응애과 (Damaeidae), 쟁인응애과(Damaeolidae), Dampfiellidae, Decoroppiidae, Dendroeremaeidae, Dermationidae, Dermoglyphidae, Drymobatidae, Elliptochthoniidae, 두줄띠응애과(Eniochthoniidae), Epactozetidae, Epidermoptidae, 배흙응애과 (Epilohmanniidae), Epimerellidae, 다리차양응애과 (Eremaeidae), Eremaeozetidae, Eremellidae, 귀응애과(Eremobelbidae),

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		동아줄응애과(Eremulidae), 유령응애과(Eulohmanniidae), 배꼽조개응애과 (Euphthiracaridae), Eustathiidae, Eutegaeidae, Falculiferidae, Fortuyniidae, 등근깃사이진드기과 (Freyanidae), Gabuciniidae, 큰나비응애과 (Galumnellidae), 나비응애과(Galumnidae), Gastronyssidae, Gaudoglyphidae, 명주응애과 (Gehypochthoniidae), Granuloppiidae, Guanolichidae, 싯톱응애과(Gustaviidae), 정강이응애과 (Gymnodamaeidae), 세마디응애과(Haplochthoniidae), 소매응애과(Haplozetidae), 주머니응애과(Hemileiidae), 호리병응애과(Hermanniellidae), 인왕응애과 (Hermanniidae), 허물응애과(Heterobelbidae), Heterochthoniidae, Heterocoptidae, Histiotomatidae, 콧등날개응애과(Humerobatidae), 털무더기응애과(Hungarobelbidae), 물날개응애과(Hydrozetidae), 띠응애과(Hypochthoniidae), Hypoderatidae, Kiwilichidae, Kodiakellidae, 부엉이깃털진드기과(Kramerellidae), Lamellareidae, Laminosioptidae, Lemurnyssidae, 달걀응애과(Liacaridae), 두꺼비날개응애과(Licneremaeidae),

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		Licnobelbidae, 이끼응애과(Licnodamaeidae), Liebstadiidae, 물소매응애과(Limnozetidae), Listropsoralgidae, Lobalgidae, 팽이응애과(Lohmanniidae), Lophonotacaridae, Lyropiidae, Machadobelbidae, Machuelliidae, 장님응애과(Malaconothridae), Maudheimiidae, 어리조개응애과(Mesoplophoridae), 꼬마자라응애과(Micreremidae), Microtegeidae, 깨알지게응애과(Microzetidae), 넓은지게응애과 (Mochlozetidae), Multoribulidae, Myocoptidae, 해면응애과(Nanhermanniidae), Nanohystricidae, Nehypochthoniidae, 고등응애과(Neoliodidae), Nesozetidae, 줄검둥이응애과(Niphocephidae), Nippobodidae, Nodocephidae, Nosybeidae, 그물왕응애과(Nothridae), Ochrolichidae, Oconnoriidae, 좁쌀응애과(Oppiidae), 판지게응애과(Oribatellidae), 방패응애과(Oribot ritiidae), Oribellidae, Oribotritiidae, 뚜껑응애과(Oripodidae), 오징어응애과(Otocephidae), Oxyameridae, 옛응애과 (Palaeacaridae), Papillonotidae, 주머니나비응애과 (Parakalummidae), Parhypochthoniidae, Passalozetidae, Pediculochelidae, Peloppiidae, 염마응애과 (Phenopelopidae), Pheroliodidae, 조개응애과 (Phthiracaridae), Plasmobatidae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		아교무늬응애과(Plateremaeidae), Platyameridae, Pneumocoptidae, 판다리응애과(Podopterotegaeidae), Polypterozetidae, 앞꼬리깃털진드기과 (Proctophyllodidae), Protoplophoridae, 반소매응애과(Protoribatidae), Psammochthoniidae, Pseudoppiidae, Psoroptidae, 고리깃털응애과 (Psoroptoididae), 깃사이진드기과(Pterolichidae), 깃털응애과(Pteronyssidae), 깃표면진드기과 (Ptiloxenidae), Ptyssalgidae, 빨사다리응애과 (Punctoribatidae), 집먼지진드기과(Pyroglyphidae), Quadroppiidae, Rectijanuidae, Rhynchoribatidae, Rhyncoptidae, Rioppiidae, Salvidae, Sarcoptidae, 판날개응애과(Scheloribatidae), Schizoglyphidae, Scutoverticidae, Selenoribatidae, Sphaerochthoniidae, Spinozetidae, Staurobatidae, Sternoppiidae, 유리창응애과(Suctobelbidae), Symbioribatidae, Synichotritiidae, 깃촉진드기과(Syringobiidae), 사각머리응애과(Tectocephidae), Tegeocranelli dae, 가면응애과(Tegoribatidae), 쌍가시응애과 (Tenuialidae), Teratoppiidae, 길쭉머리응애과 (Tetracondylidae), Thoracosathesidae, Thyrisomidae, Thysanocercidae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		어리오징어응애과 (Tokunocephidae), 쌍무늬응애과 (Trhypochthoniidae), 깃털띠응애과(Trichthoniidae), Trizetidae, 큰깃털진드기과(Trouessartiidae), Tubulozetidae, Tuparezetidae, Turbinoptidae, 파도날개응애과(Unduloribatidae), Vexillariidae, 곰보응애과(Xenillidae), Zetomotrichidae, 깡충응애과(Zetorchestidae)

다. 선충*

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
선충문(Nematoda, Nemata)		
Adenophorea강(綱)		
Enoplia아강(亞綱)	창선충목(Dorylaimida)의 바늘선충과(Longidoridae), 궁침선충과(Trichodoridae)	Enoplida목, Oncholaimida목, Tripylida목, Isolaimida목, Mononchida목, Stichosomida목, 창선충목(Dorylaimida)의 바늘선충과(Longidoridae), 궁침선충과(Trichodoridae) 이외의 그룹
Chromadoria아강	-	Araeolaimida목, Chromadorida목, Desmoscolecida목, Desmodorida목, Monhysterida목
Secernentea강		
Rhabditia아강	-	간선충목(Rhabditida), Strongylida목

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
Spiruria아강	-	Ascaridida목, Spirurida목
Diplogasteria아강	참선충목(Tylenchida)의 참선충과(Tylenchidae), 씨알선충과(Anguinae), Dolichodoridae과, 위축선충과(Belonolaimidae), 뿌리썩이선충과(Pratylenchidae), 나선선충과(Hoplolaimidae), 씨스트선충과(Heteroderidae), 주름선충과(Criconematidae), 감귤선충과(Tylenchulidae), 둥근꼬리선충과(Aphelenchidae), 어리둥근꼬리선충과(Paraphelenchidae), 잎선충과(Aphelenchoididae), Fergusobiidae과	Diplogasterida목, 참선충목(Tylenchida)의 Seinuridae과, Entaphelenchidae과, Sphaerulariidae과, 나무좀선충과(Allantonematidae), 이치포식선충과(Iotonchidae)

* 선충 참고문헌: William R. N., 1991, Manual of Agricultural Nematology.

라. 달팽이(연체동물문, 복족강)

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
복족강(Gastropoda)		
Caenogastropoda(신생복족아강)	Ampullariidae, Viviparidae	Aciculidae, Amnicolidae, Amphimelaniidae, Ampullinidae, Annulariidae, Ascorhiidae, Assimineidae, Baicaliidae, Barleeiidae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		Batillariidae, Beddomeiidae, Bithyniidae, Buccinidae, Bythinellidae, Caecidae, Calopiidae, Cerithiidae, Cerithiopsidae, Clenchiellidae, Cochliopidae, Cochlostomatidae, Columbellidae, Craspedopomatidae, Cyclophoridae, Diplommatinidae, Drilliidae, Emmericiidae, Erhaiidae, Falsicingulidae, Fontigentidae, Hainesiidae, Hemisinidae, Hydrobiidae, Hydrococcidae, Iravadiidae, Lithoglyphidae, Litthabitellidae, Littorinidae, Maizaniidae, Megalomastomatidae, Melanopsidae, Melongenidae, Moitessieriidae, Muricidae, Nassariidae, Naticidae, Neocyclotidae, Pachychilidae, Paludomidae, Planaxidae, Pleuroceridae, Pollicariidae, Pomatiidae, Pomatiopsidae, Potamididae, Pupinidae, Rissoidae, Semisulcospiridae, Squamapicidae, Stenothyridae, Tateidae, Teinostomatidae, Thiaridae, Tomichiidae, Tornidae, Truncatellidae, Turritellidae, Velutinidae, Zebinidae, Zemelanopsidae
Heterobranchia(이 새아강)	Achatinellidae, Achatinidae, Acroloxidae, Agardhiellidae, Agriolimacidae, Aillyidae, Amastridae, Amphibulimidae, Anadenidae, Argnidae, Ariolimacidae, Arionidae, Ariophantidae, Binneyidae, Boettgerillidae,	Acavidae, Acochlidiidae, Aglajidae, Aitengidae, Akeridae, Amphibolidae, Athoracophoridae, Azecidae, Caryodidae, Cepolidae, Cerionidae, Charopidae, Chilinidae, Chondrinidae, Clavatoridae, Coelociontidae,

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
	Bothriembryontidae, Bulimulidae, Bulinidae, Burnupiidae, Camaenidae, Canariellidae, Cerastidae, Chronidae, Clausiliidae, Cochlicopidae, Cyclodontinidae, Draparnaudiidae, Dyakiidae, Elonidae, Enidae, Epiphragmophoridae, Euconulidae, Fauxulidae, Ferussaciidae, Gastrocoptidae, Gastrodontidae, Geomitridae, Geotrochidae, Helicarionidae, Helicidae, Helicodontidae, Hygromiidae, Hypselostomatidae, Labyrinthidae, Lauriidae, Limacidae, Lymnaeidae, Megaspiridae, Micractaeonidae, Microcystidae, Milacidae, Odontocycladidae, Oopeltidae, Orculidae, Orthalicidae, Oxychilidae, Pagodulinidae, Partulidae, Philomycidae, Physidae, Planorbidae, Pleurodiscidae, Pleurodontidae, Polygyridae, Pristilomatidae, Pupillidae, Pyramidulidae, Rathouisiidae, Sagdidae, Simpulopsidae, Solaropsidae, Spelaeoconchidae, Spelaeodiscidae, Sphincterochilidae, Staffordiidae, Strobilopsidae, Succineidae, Thysanophoridae, Tomogeridae, Trichodiscinidae, Trissexodontidae, Trochomorphidae, Urocyclidae, Valloniidae, Veronicellidae, Vertiginidae, Vitrinidae, Xanthonychidae, Zachrysiidae, Zonitidae	Cuthonidae, Cystopeltidae, Diapheridae, Dironidae, Discidae, Dorcasiidae, Ellobiidae, Endodontidae, Epirobiidae, Eubbranchidae, Eucalodiidae, Glacidorbidae, Haminoeidae, Haplotrematidae, Helicodiscidae, Holospiridae, Latiidae, Limapontiidae, Macrocyclidae, Megomphicidae, Odontostomidae, Oleacinidae, Onchidiidae, Onchidorididae, Oreohelicidae, Otinidae, Papillodermatidae, Parmacellidae, Plakobbranchidae, Plectopylidae, Polyceridae, Punctidae, Pyramidellidae, Retusidae, Rhytididae, Scolodontidae, Sculptariidae, Siphonariidae, Spiraxidae, Streptaxidae, Strophocheilidae, Strubelliidae, Tantulidae, Testacellidae, Tornatinidae, Trigonochlamydidae, Trinchesiidae, Tritoniidae, Truncatellinidae, Urocoptidae, Valvatidae

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
Neritimorpha아강	-	Helicinidae, Hydrocenidae, Neritidae, Neritiliidae, Proserpinellidae, Proserpinidae
Vetigastropoda아강	-	Bathyphytophilidae, Phasianellidae, Trochidae, Turbinidae

* 단, 바다에 서식하는 달팽이는 식물방역법 제2조제2호나목에 해당하는 병해충으로 보지 아니한다.

[별표2]

기타 무척추동물의 식물피해 여부

가. 비(非)응애 거미(절지동물문, 협각아문, 거미강)

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
거미강(협각아문)		
통거미목(Opiliones)	-	통거미목(Opiliones)
피일목(Solifugae, 낙타거미)	-	피일목(Solifugae, 낙타거미)
얹은뱅이목(Pseudoscorpiones)	-	얹은뱅이목(Pseudoscorpiones)
수각목(Palpigradi)	-	수각목(Palpigradi)
절복목(Ricinulei)	-	절복목(Ricinulei)
거미목(Araneae)	-	거미목(Araneae)
무편목(Amblypygi)	-	무편목(Amblypygi)
미갈목(Thelyphonida, 채찍전갈)	-	미갈목(Thelyphonida, 채찍전갈)
단미목(Schizomida)	-	단미목(Schizomida)

나. 기타 무척추동물

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
환형동물문(Annelida)		
거머리강(Hirudinea)	-	거머리강(Hirudinea)
절지동물문(Anthropod)		
다지아문(Myriapoda)		
지네강(Chilopoda, 순각강)	-	지네강(Chilopoda)
결합강(Symphyla)	-	결합강(Symphyla)
소각강(Pauropoda)	-	소각강(Pauropoda)
노래기강(Diplopoda, 배각강)	갈퀴노래기목(Julida), 띠노래기목(Polydesmida), 나사노래기목(Spirostreptida)	Callipodida, Chordeumatida, 구슬노래기목(Glomerida), Glomeridesmida, 넓적노래기목(Platydesmida), 털노래기목(Polyxenida), Polyzoniida, Siphoniulida, Siphonocryptida, Siphonophorida, Sphaerotheriida, Spirobolida, Stemmiulida
육각아문(Hexapoda)		
톡토기강(Collembola)	등근톡토기과(Sminthuridae), 알톡토기과(Bourletiellidae), 어리톡토기과(Onychiuridae)	Actaletidae, 장님알톡토기과(Arrhopalitidae), 등근턱무늬톡토기과(Brachystomellidae), Coenaletidae, Collophoridae, 툽니등근톡토기과(Dicyrtomidae), 털보톡토기과(Entomobryidae), 참굴톡토기과(Gulgastruridae), 보라톡토기과(Hypogastruridae), Isotogastruridae, 마디톡토기과(Isotomidae), 가시등근톡토기과(Katiannidae),

분 류 군	식물에 피해를 주는 그룹	식물에 피해를 주지 않는 그룹
		Mackenziellidae, Microfalculidae, 흑무늬톡토기과(Neanuridae), Neelidae, 턱무늬톡토기과(Odontellidae), 민고리톡토기과(Oncopoduridae), Pachytullbergiidae, Paleotullbergiidae, Paronellidae, 물톡토기과(Poduridae), 알둥근톡토기과(Sminthurididae), Spinothecidae, Sturmiidae, 가시톡토기과(Tomoceridae), Tullbergiidae
낮발이강(Protura)	-	낮발이강(Protura)
좀붙이강(Diplura)	-	좀붙이강(Diplura)
갑각아문(Crustacea)		
연갑강(Malacostaca)		
등각목(Isopoda)	Armadillidium nasatum Armadillidium vulgare Hemilepistus reaumuri Oniscus asellus Porcellio laevis Porcellio scaber Porcellionides pruinosus Australiodillo bifrons Porcellio dilatatus	좌항 9종을 제외한 종

발급번호 : 제 호(수입식물검역신청번호 : 제 - 호)			
(☐ 병해충, ☐ 사육대상해충) 발견통지서			
검역신청사항			
수 입 자	상 호		성 명
	주 소		
순 번	품 목 명	수 량	비 고
병해충 발견사항(사육 이외의 경우)			
병해충분류군	발육태	분류동정방법	예상기간
		☐ 직접 검경 ☐ 배양 등 ☐ 기타()	☐ 3일 이내 ☐ 4~9일 ☐ 10일 이상
병해충 발견사항(사육하는 경우)			
병해충분류군	발육태	예상기간	
		☐ 1개월 이내 ☐ 7개월~1년 ☐ 2~3개월 ☐ 1년 이상 ☐ 4~6개월	
귀하께서 검역신청한 식물검역대상물품에서 위의 병해충이 검출되어 분류동정(또는 사육 후 분류동정) 절차가 진행될 예정입니다. 이에 분류동정이 완료될 때까지 해당 화물에 대한 합격, 소독 또는 폐기·반송 등의 처분이 보류됨을 알려드리니 식물검역이 완료될 때까지 검역물품을 피복하는 등 병해충 비산 방지조치를 하여 주시기 바랍니다. 만약, 병해충 분류동정 완료 전에 해당 화물에 대한 자진 소독 또는 폐기·반송 처분을 원하는 경우에는 ‘수출입식물검역소독처리규정(농림축산검역본부 고시) 별지 제1호서식의 소독계획서’ 또는 폐기·반송요청서를 제출하여 주시기 바랍니다. 다만, 소독계획서에 의하여 소독을 하였더라도 폐기 대상 병해충이 추가로 검출될 경우 폐기·반송 등을 명령할 수 있습니다.			
년 월 일			
농림축산검역본부 ()지역본부(사무소) 식물검역관 성명 (서명)			

병해충 발견사항(사육 이외의 경우)					
순번	품목명	병해충분류군	발육태	분류동정방법	예상기간
				☐ 직접 검경 ☐ 배양 등 ☐ 기타()	☐ 3일 이내 ☐ 4~9일 ☐ 10일 이상
				☐ 직접 검경 ☐ 배양 등 ☐ 기타()	☐ 3일 이내 ☐ 4~9일 ☐ 10일 이상
				☐ 직접 검경 ☐ 배양 등 ☐ 기타()	☐ 3일 이내 ☐ 4~9일 ☐ 10일 이상
				☐ 직접 검경 ☐ 배양 등 ☐ 기타()	☐ 3일 이내 ☐ 4~9일 ☐ 10일 이상
				☐ 직접 검경 ☐ 배양 등 ☐ 기타()	☐ 3일 이내 ☐ 4~9일 ☐ 10일 이상
병해충 발견사항(사육하는 경우)					
순번	품목명	병해충분류군	발육태	예상기간	
				☐ 1개월 이내 ☐ 2~3개월 ☐ 4~6개월	☐ 7개월~1년 ☐ 1년 이상
				☐ 1개월 이내 ☐ 2~3개월 ☐ 4~6개월	☐ 7개월~1년 ☐ 1년 이상
				☐ 1개월 이내 ☐ 2~3개월 ☐ 4~6개월	☐ 7개월~1년 ☐ 1년 이상
				☐ 1개월 이내 ☐ 2~3개월 ☐ 4~6개월	☐ 7개월~1년 ☐ 1년 이상
				☐ 1개월 이내 ☐ 2~3개월 ☐ 4~6개월	☐ 7개월~1년 ☐ 1년 이상

병해충 분류동정 의뢰서

1. 검역개요

- 검역신청서 번호 :
- 현장검역기관 :
- 현장검역일자 :

2. 대상식물

- 품 명 :
- 검역수량 :
- 수입국(원산지) :

3. 분류동정 대상 시료(표본)

- 병해충의 종류¹⁾ :
- 송부하는 표본 수량 :
- 표본 송부 방법 :

4. 검역지 분류동정 결과

- 검역지 분류동정 담당자 :
- 분류동정 담당자의 분류동정 의견 :

5. 기타 참고사항(표본 이미지 등)

○

1) 목명, 과명, 속명 등 분류동정 담당자가 알 수 있는 병해충의 분류단위를 말함

병해충 분류동정 결과통보서

1. 병해충 분류동정 자문사항

병해충명 (성숙상태)	의뢰일자	의뢰수량	검출 식물명	수입국 (원산지)	비고
	년.월.일	()점			

2. 분류동정 결과

○ 병해충명

- 학명(이명) :
- 일반명 :
- 분류학적 위치 :

○ 병해충 특성

- 분포(국가) :
- 기주(식물) :
- 형태(사진 자료 등) :
- 생태 :
- 피해 :
- 방제 :
- 기타 :
- 참고문헌 :

※ 주의사항

- 본 통보서를 접수한 후 가급적 빠른 시일 내에 회신하여 주시고, 검역현장에서 활용될 수 있도록 ‘병해충 특성’ 정보를 충실히 기재하여 주시기 바랍니다.