



이용·미용기구별 소독기준 및 방법

[시행 2024. 5. 22.] [보건복지부고시 제2024-86호, 2024. 5. 22., 일부개정.]

보건복지부(건강정책과), 044-202-2858

1. 공통기준

- 가. 소독을 한 기구와 소독을 하지 아니한 기구로 분리하여 보관한다.
- 나. 소독 전에는 브러쉬나 솔을 이용하여 표면에 붙어있는 머리카락 등의 이물질을 제거한 후, 소독액이 묻어있는 천이나 거즈를 이용하여 표면을 닦아낸다.
- 다. 사용 중 혈액이나 체액이 묻은 기구는 소독하기 전, 흐르는 물에 씻어 혈액 및 체액을 제거한 후 소독액이 묻어있는 일회용 천이나 거즈를 이용하여 표면을 닦아 물기를 제거한다.
- 라. 기타 사항
 - (1) 각 손님에게 세탁된 타올이나 가운(덧옷)을 제공하여야 하며, 한번 사용한 타올이나 가운(덧옷)은 사용 즉시 구별이 되는 용기에 세탁 전까지 보관하여야 한다.
 - (2) 사용한 타올이나 가운(덧옷)은 세제로 세탁한 후 건열멸균소독·증기소독·열탕소독 중 한 방법을 진행한 후 건조하거나, 0.1% 차아염소산나트륨용액(유효염소농도 1000 ppm)에 10분간 담가둔 후 세탁하여 건조하기를 권장한다.
 - (3) 혈액이 묻은 타올, 가운(덧옷)은 폐기하거나 0.1% 차아염소산나트륨용액(유효염소농도 1000 ppm)에 10분간 담가둔 후 세제로 세탁하고 열탕소독(100℃이상의 물속에 10분이상 끓여준다)을 실시한 후 건조하여 재사용해야 한다.
 - (4) 스티타올은 사용전 80℃이상의 온도에서 보관하고, 사용시 적정하게 식힌 후 사용하고 사용 후에는 타올 및 가운(덧옷)과 동일한 방법으로 소독한다.

2. 기구별 소독기준

가. 기구사용 후

기구명	위험도	소독 방법
• 가위 • 바리칸·클리퍼 • 푸셔 • 빗	피부감염 및 혈액으로 인한 바이러스 전파우려	① 표면에 붙은 이물질과 머리카락 등을 제거한다. ② 위생티슈 또는 소독액이 묻은 천이나 거즈로 날을 중심으로 표면을 닦는다. ③ 마른 천이나 거즈를 사용하여 물기를 제거한다.
• 토우세퍼레이터 • 라텍스 • 펌프 • 해면	감염매체의 전달이나 자체 감염 우려	① 천을 이용하여 표면의 이물질을 닦아 낸다. ② 세척후 소독액에 10분 이상 담근 후 흐르는 물에 행구고 물기를 제거한다. ③ 자외선 소독 후 별도의 용기에 보관한다.
• 브러쉬(화장·분장용)	감염매체의 전달이나 자체 감염 우려	① 표면의 이물질을 제거한다. ② 세척제를 사용하여 세척한다. ③ 자외선 소독 후 별도의 용기에 보관한다..

※ 기구명은 현재 일반적으로 이·미용업소에서 주로 사용·지칭하는 용어를 사용

나. 영업종료 후

이물질 등을 제거하고 일반기준에 의해 소독작업 후, 별도의 용기에 보관하여 위생적으로 관리하여야 한다.

3. 재검토기한 : 보건복지부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2024-86호, 2024. 5. 22.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.