

Perspectiva Climática Mensual Febrero 2026

PCM-202602

Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología - INSIVUMEH

Resumen

Durante el mes de febrero de 2026 inicia la transición de la temporada fría a la temporada cálida. La precipitación durante este periodo, se asocia principalmente al paso de sistemas frontales y a la entrada de humedad desde el mar Caribe.

El pronóstico mensual indica que los mayores volúmenes de lluvia se esperan en la región del Caribe, en los departamentos de Alta Verapaz, Petén y en municipios de Quiché y Huehuetenango con rangos de 25 mm a 150 mm, mientras que en regiones como Occidente, Altiplano Central, Pacífico y Valles de Oriente se prevén acumulados nulos o bajos, entre 0 mm y 25 mm.

Respecto al estado del ENOS, los modelos internacionales señalan condiciones neutras (86% de probabilidad) para el trimestre febrero-abril.

Se pronostican tres frentes fríos en febrero, igual al promedio histórico, con posibles lluvias y descensos de temperatura. Para marzo se esperan dos eventos.


En cuanto a la temperatura media, se prevén valores medios entre 10 °C y 29°C según la región, con anomalías moderadas respecto a la climatología. Las temperaturas mínimas podrían oscilar entre 3°C y 23°C en las zonas más frías para este mes.

En síntesis, febrero estará marcado por la influencia de frentes fríos, lluvias similares a la climatología y temperaturas bajas en el Altiplano y Occidente, lo que requiere atención especial de los sectores de gestión de riesgos, salud y agropecuario.

Estado de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)

En la figura 1 se presenta la anomalía de temperatura superficial del mar (TSM) en la región Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial) según la predicción del IRI emitida el 20 de enero de 2026. En esta figura se observa que para el trimestre enero-marzo (EFM) se espera una anomalía de TSM de -0.4°C , **lo que indica un escenario de condiciones Neutras**. También se observa que los modelos dinámicos y estadísticos predicen en promedio una anomalía de TSM de -0.2°C para el trimestre febrero-abril (FMA) y una anomalía de TSM de 0°C para el trimestre marzo-mayo (MAM).

Figura 1: Gráfico de predicciones de anomalías de TSM según modelos dinámicos (16) y estadísticos (9) para ENOS, publicado el 20 de enero de 2026. Las líneas con figuras sólidas indican la anomalía de temperatura superficial del mar según modelos dinámicos y las líneas con figuras contorneadas muestran los resultados de modelos estadísticos.




Highcharts.com

Fuente: IRI ENSO Forecast, 2026. Traducción: INSIVUMEH.

En la figura 2 se muestran las probabilidades de ocurrencia para cada estado de ENOS como barras verticales, en color azul para las condiciones de **La Niña**, en color gris para las condiciones **neutras** y en color rojo para las condiciones de **El Niño**. Esta indica que para el trimestre febrero-abril (FMA) hay un 13 % de probabilidad para las condiciones de La Niña, un 86 % de probabilidad para las condiciones neutras y un 1 % de probabilidad para las condiciones de El Niño. Para el trimestre marzo-mayo (MAM) hay un 5 % de probabilidad para las condiciones de La Niña, un 88 % para condiciones neutras y un 7 % para condiciones de El Niño. Según los modelos de ENOS, **se espera persistencia de las condiciones Neutras para el trimestre febrero-abril**.

Figura 2: Gráfico de probabilidad de ocurrencia para cada estado de ENOS por temporada, publicado el 20 de enero de 2026. Las barras verticales indican la probabilidad para cada temporada y estado de ENOS; las líneas continuas indican las probabilidades climatológicas.



Fuente: IRI ENSO Forecast, 2026. Traducción: INSIVUMEH.

Oscilación Ártica


En la temporada fría se considera el monitoreo de la Oscilación Ártica (OA). La Oscilación Ártica (AO, por sus siglas en inglés, Arctic Oscillation) es un patrón climático natural que se manifiesta en la variabilidad de la presión atmosférica en el Ártico y las latitudes medias del hemisferio norte. Esta variación puede influir en la formación y en el comportamiento de los frentes fríos en su intensidad, número y trayectoria. Cada fase de esta oscilación influye de forma distinta en la frecuencia e intensidad de los frentes fríos.

En la parte superior de la [figura 3](#), la línea negra representa el valor observado del índice de la Oscilación del Atlántico Norte (NAO, por sus siglas en inglés). A lo largo del periodo analizado, la NAO muestra cambios frecuentes en su signo, con valores predominantemente cercanos a la neutralidad, aunque con episodios negativos a inicios de enero. Esta variabilidad sugiere una circulación atmosférica cambiante, pero sin establecerse fases persistentemente intensas. El promedio del periodo (mean = -0.3899) indica una ligera inclinación hacia condiciones negativas, lo que ha podido favorecer incursiones ocasionales de aire frío en la región.

El panel inferior muestra el pronóstico a 14 días de la NAO, donde se observa que la media del ensamble tiende a mantenerse cercana a valores neutros, con una correlación moderada respecto a la serie observada. Aunque existe cierta incertidumbre hacia finales del periodo, el pronóstico sugiere una persistencia de condiciones cercanas a la neutralidad, lo que indica una influencia limitada, pero no despreciable, sobre la frecuencia de frentes fríos que podrían alcanzar a Guatemala.

Figura 3: Gráfica del Índice de la Oscilación del Atlántico Norte (NOA) desde finales de septiembre 2025 hasta enero 2026. La línea negra muestra las observaciones, la línea roja en el cuadro inferior indica los valores extremos de los modelos de pronóstico GEFS (NCEP) y la línea azul muestra el ensamble de dichos modelos.

Oscilación del Atlántico Norte: Observada y ensamble de pronósticos



Fuente: NOAA-NCEP, 2026

Frentes Fríos

Los frentes fríos son sistemas frontales que definen patrones de viento norte moderado a fuerte; es decir, aire frío que después de sobrepasar las planicies en la península de Yucatán, se ve forzado a ascender, condensando su humedad especialmente en la pendiente contraria al viento de las montañas del norte. A partir de este ascenso de humedad **se generan las lluvias estacionales en las regiones del Norte, Caribe y Franja Transversal del Norte**. También se pueden presentar algunos eventos aislados de lluvia en Bocacosta y en el sur de la región Occidente.

En Guatemala, la temporada fría inicia, normalmente, en la segunda quincena de octubre y finaliza en la primera quincena de marzo, aunque puede extenderse hasta abril en algunas regiones. La temporada fría comienza con la incursión de los primeros frentes fríos en el país. Cabe mencionar que, hasta la fecha, el recuento de frentes fríos que han afectado al territorio nacional se mantiene en once. Para los meses siguientes en el [cuadro 1](#), se presenta el número de frentes fríos pronosticados por mes, en comparación con la climatología histórica.

Cuadro 1: Pronóstico de frentes fríos para el período 2025-2026 según años análogos (1959, 1961, 1973, 2002 y 2003) y climatología 1991-2020.

Mes	Climatología 1991-2020	Pronóstico de Frentes Fríos	Observados
Octubre	1	1	1
Noviembre	2	2	3
Diciembre	4	3	3
Enero	4	4	4
Febrero	3	3	—
Marzo	3	2	—
Abril	1	1	—

Fuente: INSIVUMEH, 2026


En febrero se espera la ocurrencia de aproximadamente tres eventos, igualando el promedio histórico. Estos sistemas favorecerán un incremento de lluvias en las regiones Norte y Caribe, mientras que en las zonas montañosas se prevén descensos más marcados de la temperatura. Durante este mes, las regiones del Altiplano Central y Occidente podrían registrar las temperaturas más bajas del año, con riesgo de ocurrencia de heladas.

Precipitación Mensual

Respecto a la precipitación mensual, en el **cuadro 2** se presentan los acumulados de lluvia por región climática correspondiente a los sitios donde se ubican las estaciones meteorológicas de INSIVUMEH. Se incluyen los valores de la climatología 1991-2020 y el pronóstico según la metodología NextGen. Los mapas de la **figura 4** describen la distribución espacial de los acumulados mensuales de lluvia. La **figura 4a** muestra el mapa de acumulado de lluvia según la normal climatológica reglamentaria 1991-2020, mientras que en la **figura 4b** se presenta el mapa de acumulado de lluvia según el pronóstico NextGen.

Cuadro 2: Acumulados de lluvia por región climática en milímetros (mm) para la normal climatológica 1991-2020 y el pronóstico según modelos NextGen correspondiente al mes de febrero de 2026.

Región Climática	Zona de Interés	Climatología Feb 1991-2020 (mm)	Modelos NextGen Feb 2026 (mm)
Altiplano Central	Guatemala	5 - 10	5 - 10
	Sololá	5 - 15	5 - 15
Bocacosta	Retalhuleu	10 - 15	10 - 20
	Escuintla	10 - 15	15 - 20
Caribe	Puerto Barrios	140 - 170	150 - 185
	Lívingston	95 - 160	110 - 185
Franja Transversal del Norte	Cobán	60 - 120	70 - 135
	Nebaj	10 - 30	10 - 35
Occidente	Huehuetenango	5 - 10	5 - 15
	Quetzaltenango	5	5
Pacífico	San José	5	5
	Champerico	5 - 10	10
Norte	Flores	45 - 55	50 - 60
	Poptún	50 - 55	55 - 65
Valles de Oriente	Esquipulas	5 - 10	5 - 10
	Zacapa	0 - 15	0 - 15



Fuente: INSIVUMEH, 2026

Durante el mes de febrero, los mayores acumulados de precipitación se prevén en las regiones Caribe, Norte, y en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, en un rango desde 70 mm hasta 185 mm. En las regiones de Altiplano Central y Bocacosta se esperan acumulados de precipitación entre 5 mm y 20 mm; finalmente, para las regiones de Valles de Oriente, Pacífico y Occidente, se estiman acumulados entre 0 mm y 15 mm.




Figura 4: Mapas de climatología y pronóstico de precipitación. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de ENACTS¹ y NextGen, 2026.





Figura 5: Mapa de pronóstico de anomalía de precipitación en milímetros para el mes de febrero de 2026 utilizando la metodología NextGen. Elaboración: INSIVUMEH, 2026.

¹Datos de ENACTS disponibles en este enlace. Pronóstico de Precipitación NextGen disponible en este enlace.


Temperatura

La figura 6a presenta el mapa de pronóstico de temperatura media promedio para el mes de febrero de 2026 en el que se distinguen **las regiones con temperaturas medias más bajas, siendo estas: Occidente y Altiplano Central, con valores que oscilan entre 10°C y 22°C en promedio**. En las regiones con tonos naranjas oscuro se esperan temperaturas medias promedio entre 22°C y 29° C. En la **figura 6b** se muestra el pronóstico de anomalía de temperatura media. Se esperan anomalías de temperatura ligeramente por abajo del promedio climatológico (entre -0.5°C y -1.00°C), en la mayor parte del país. En contraste, en algunos sectores de Alta Verapaz, Baja Verapaz, y Chimaltenango podrían presentarse anomalías positivas (entre 0.5 °C y 3 °C).

Referente a la temperatura mínima, en la **figura 7a** se muestra el mapa de pronóstico de temperatura mínima promedio para el mes de febrero de 2026 , en donde se observa que **las regiones más frías esperadas son Occidente y Altiplano Central, donde las temperaturas mínimas oscilan entre 3°C y 15° C**. En las regiones con tonos naranja se espera que las temperaturas oscilen entre 18°C y 23°C. La **figura 7b** muestra el mapa de pronóstico de anomalía de temperatura mínima donde se observan anomalías arriba del promedio (entre 1 °C y 3 °C) en la mayor parte del país, a excepción de algunos sectores de los departamentos de Huehuetenango, Chimaltenango, Suchitepéquez, Sacatepéquez y Escuintla donde podrían presentarse anomalías negativas (entre -1 °C y -3 °C).



(a) Mapa de pronóstico de temperatura media promedio según NextGen.



(b) Mapa de pronóstico de anomalía de temperatura media promedio según NextGen.

Figura 6: Mapas de pronóstico de temperatura media promedio utilizando la metodología NextGen. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de NextGen² , 2026.

²Datos de ENACTS disponibles en este enlace. Pronóstico de Temperatura Media NextGen disponible en este enlace.




Figura 7: Mapas de pronóstico de temperatura mínima promedio utilizando la metodología NextGen. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de NextGen, 2026.³

Los valores promedio pronosticados hacen referencia a los valores más probables de las temperatura media y mínima en el mes. Aunque también es posible que se presenten valores por arriba o por debajo de estos.


Como referencia para el mes de febrero, en el **cuadro 3** se presentan datos del pronóstico de temperaturas media promedio y mínima promedio según la metodología NextGen y los registros absolutos de temperatura mínima durante el periodo climatológico 1991-2020 en las estaciones de INSIVUMEH. En cuanto a la temperatura media, **resaltan las regiones de la Franja Transversal del Norte y Occidente con los promedios más bajos**. Estos valores se enuncian como una referencia de algunos de los lugares más frescos para el mes de febrero.

Referente a la temperatura mínima, **resalta la estación de Nebaj que registró una temperatura mínima para el mes de febrero de -3.2°C en el año 2000**. En Huehuetenango y Quetzaltenango se registró una temperatura mínima de -2.00°C en los años 1998 y 2017 respectivamente.. Estos valores se enuncian como una referencia de algunos de los lugares más fríos para el mes de febrero.

³Datos de ENACTS disponibles en este enlace. Pronóstico de Temperatura Mínima NextGen disponible en este enlace.

Cuadro 3: Pronóstico de temperaturas media promedio y mínima promedio según años análogos para el mes de febrero de 2026 y registro de temperatura mínima absoluta en el mes de febrero según climatología 1991-2020.

Región Climática	Zona de Interés	Temperatura Media	Temperatura Mínima	
		Pronóstico Promedio (°C)	Pronóstico Promedio (°C)	Registro Absoluto (°C) (año)
Altiplano Central	Guatemala	18 - 21	11 - 15	7.2 (2006)
	Sololá	10 - 18	3 - 10	0.0 (1998)
Bocacosta	Retalhuleu	27 - 28	20 - 22	16.8 (1998)
	Escuintla	22 - 27	13 - 20	8.8 (2016)
Caribe	Puerto Barrios	24 - 25	20 - 21	13.6 (1998)
	Lívingston	24 - 26	19 - 20	12.5 (1998)
Franja Transversal del Norte	Cobán	18 - 19	11 - 12	2.5 (2006)
	Nebaj	14 - 18	7 - 10	-3.2 (2000)
Occidente	Huehuetenango	15 - 19	6 - 9	-2.0 (1998)
	Quetzaltenango	12 - 14	3 - 5	-2.0 (2017)
Pacífico	San José	27 - 28	20 - 21	14.4 (2005)
	Champerico	28	22 - 23	19.0 (2009)
Norte	Flores	23 - 24	18 - 19	9.0 (2017)
	Poptún	21 - 22	17 - 18	8.6 (2017)
Valles de Oriente	Esquipulas	20 - 23	14 - 18	7.5 (1991)
	Zacapa	26 - 29	19 - 22	11.4 (1992)



Fuente: INSIVUMEH, 2026

Recomendaciones

- A las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tomar en cuenta la información proporcionada en este documento para la planificación y ejecución de sus actividades.
- Al sector gestión de riesgos:
 - Prevenir a la población sobre la posibilidad de bajas temperaturas, en especial en las regiones de Occidente y Altiplano Central.
 - Considerar el descenso de temperatura que pueda presentarse durante este mes.
- Al sector salud:
 - Difundir información y recomendaciones a la población para evitar enfermedades debido a las bajas temperaturas que se podrían presentar durante la noche y horas de la madrugada, especialmente en las regiones de Altiplano Central y Occidente.
- A la población en general:
 - Se espera que en horas de la noche y madrugada de registren bajas temperaturas que podrían presentarse especialmente en las regiones más altas.
 - A las personas que practican el ascenso a volcanes, tomar en cuenta que algunas veces pueden presentarse lloviznas y/o lluvias intermitentes en las primeras horas de la noche y de la madrugada. También considerar las bajas temperaturas que se presentan por la elevación de los volcanes.
- Al sector agropecuario:
 - Al MAGA, emitir recomendaciones oportunas para fortalecer y prevenir al sector agropecuario ante las condiciones meteorológicas y climáticas presentadas en esta perspectiva.
 - Tomar en cuenta las recomendaciones emitidas para cada departamento del país en los boletines agroclimáticos elaborados por las Mesas Técnicas Agroclimáticas.
- A todos los sectores:
 - Se recomienda dar seguimiento a los boletines climatológicos, meteorológicos, sísmicos, vulcanológicos e hidrológicos emitidos por INSIVUMEH. Para consultar las perspectivas climáticas mensuales publicadas a inicio de cada mes ingrese al siguiente enlace:

<https://insivumeh.gob.gt/?p=13162/>