

Perspectiva Climática Mensual Agosto 2026

PCM-202608

Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología - INSIVUMEH

Resumen

El mes de agosto se distingue por el período de la canícula en el territorio nacional, caracterizado por la disminución de los niveles de las lluvias y el aumento de la temperatura dentro de la época lluviosa.

El pronóstico para el mes de agosto indica que los mayores acumulados de lluvia se esperan en la región Caribe, Norte, Bocacosta y en el departamento de Escuintla, con valores que podrían oscilar entre 110 mm y 400 mm. En contraste, los menores acumulados se prevén para las regiones de Occidente, Altiplano Central y en los departamentos de Zacapa y El Progreso, con valores entre 20 mm y 100 mm.

Respecto al Estado de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS, por sus siglas en inglés), los modelos internacionales señalan la posible continuación de la transición a condiciones de la fase El Niño, con un 100 % de probabilidad para los trimestres julio-septiembre (JAS) de 2026 hasta enero-marzo (EFM) de 2027.


En cuanto a la temperatura media, se prevén valores entre 13 °C y 32 °C según la región, con anomalías moderadas respecto a la climatología. Las temperaturas máximas podrían oscilar entre 28 °C y 38 °C en las zonas norte y sur, mientras que en el resto del país se espera que oscilen entre 19 °C y 29 °C.

En síntesis, agosto estará marcado por el período de la canícula, lluvias por debajo de la normal climatológica y temperaturas altas en las regiones de Bocacosta, Caribe, Pacífico y Valles de Oriente, lo que requiere atención especial de los sectores tomadores de decisión.

Estado de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)

En la figura 1 se presenta la anomalía de temperatura superficial del mar (TSM) en la región Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial) según la predicción de IRI emitida el 20 de julio de 2026. En esta figura se observa que para el trimestre julio-septiembre (JAS) se espera una anomalía de TSM entre 1.5 °C y 2.7 °C, **lo que indica una posible persistencia en la fase de transición hacia condiciones de El Niño**. También se observa que los modelos dinámicos predicen en promedio una anomalía de TSM que supera los 2.5 °C para el trimestre agosto-octubre (ASO), mientras que los modelos estadísticos proyectan anomalías ligeramente menores, aunque todavía sustanciales, en el rango de 1.5 °C a 2.3 °C para el mismo periodo. Para el trimestre octubre-diciembre (OND), el consenso de todos los modelos mantiene anomalías positivas por encima de 2.0 °C, aunque con una tendencia gradual a la baja hacia principios de 2027.


Figura 1: Gráfico de predicciones de anomalías de TSM según modelos dinámicos (15) y estadísticos (11) para ENOS, publicado el 20 de julio de 2026. Las líneas con figuras sólidas indican la anomalía de temperatura superficial del mar según modelos dinámicos y las líneas con figuras contorneadas muestran los resultados de modelos estadísticos.



Fuente: IRI ENSO Forecast, 2026. Traducción: INSIVUMEH.

En la figura 2 se muestran las probabilidades de ocurrencia para cada estado de ENOS mediante barras verticales, en color azul para las condiciones de **La Niña**, en color gris para las condiciones **neutras** y en color rojo para las condiciones de **El Niño**. La perspectiva de agosto de 2026 favorece fuertemente la persistencia de las condiciones de El Niño durante todo el período previsto. Las probabilidades de El Niño son del 100% de JAS 2026 a EFM 2027. De FMA a MAM 2027, las probabilidades siguen siendo excepcionalmente altas, con valores de 99% y 94%, respectivamente, con la probabilidad restante asignada a las condiciones neutras de ENSO. No se asigna ninguna probabilidad al desarrollo de La Niña durante este período. De acuerdo con los modelos de ENOS, **se espera que las condiciones de El Niño se mantengan con alta intensidad durante todo el período pronosticado, extendiéndose hasta principios de 2027.**

Figura 2: Gráfico de probabilidad de ocurrencia para cada estado de ENOS por temporada, publicado el 20 de julio de 2026. Las barras verticales indican la probabilidad para cada temporada y estado de ENOS; las líneas continuas indican las probabilidades climatológicas.




Fuente: IRI ENSO Forecast, 2026. Traducción: INSIVUMEH.

Precipitación Mensual

Respecto a la precipitación mensual, en el **cuadro 1** se presentan los acumulados de lluvia por región climática correspondiente a los sitios donde se ubican las estaciones meteorológicas de INSIVUMEH. Se incluyen los valores de la climatología 1991-2020 y el pronóstico según la metodología NextGen. Los mapas de la **figura 3** describen la distribución espacial de los acumulados mensuales de lluvia. En la **figura 3a** se presenta el mapa de acumulado de lluvia según el pronóstico NextGen, mientras que en la **figura 3b** se muestra el pronóstico de anomalía absoluta.

Cuadro 1: Acumulados de lluvia por región climática en milímetros (mm) para la normal climatológica 1991-2020 y el pronóstico según modelos NextGen correspondiente al mes de agosto de 2026.

Región Climática	Zona de Interés	Climatología Ago 1991-2020 (mm)	Pronóstico Modelos NextGen Ago 2026 (mm)
Altiplano Central	Guatemala	185 - 225	65 - 85
	Sololá	150 - 235	45 - 95
Bocacosta	Retalhuleu	365 - 570	245 - 400
	Escuintla	365 - 545	110 - 220
Caribe	Puerto Barrios	315 - 370	300 - 350
	Livingston	240 - 320	195 - 285
Franja Transversal del Norte	Cobán	210 - 315	105 - 170
	Nebaj	205 - 355	90 - 150
Occidente	Huehuetenango	120 - 180	20 - 55
	Quetzaltenango	110 - 170	55 - 100
Pacífico	San José	260 - 280	160 - 170
	Champerico	220 - 270	125 - 155
Norte	Flores	225 - 260	200 - 230
	Poptún	220 - 275	190 - 235
Valles de Oriente	Esquipulas	270 - 340	175 - 240
	Zacapa	105 - 150	25 - 50




Fuente: INSIVUMEH, 2026


Durante el mes de agosto, se esperan los mayores acumulados de precipitación en las regiones de Caribe, Norte y Bocacosta y en el departamento de Escuintla, con valores que podrían oscilar entre 110 mm y 400 mm. En contraste, los menores acumulados se prevén en la región Occidente, Altiplano Central y en los departamentos de Zacapa y El Progreso, con valores entre 20 mm y 100 mm. Por otra parte, se estiman acumulados intermedios en las regiones Pacífico y Franja Transversal del Norte, con valores que podrían variar entre 90 mm y 170 mm.

Para agosto, se prevé un déficit de precipitación a nivel nacional. En la **Figura 3b** se observa que los mayores déficits se pueden concentrar en las regiones de Bocacosta, Valles de Oriente, Altiplano Central y Occidente, donde se estiman anomalías negativas de precipitación entre -60 mm y -200 mm. De manera general, se espera una disminución de los acumulados de precipitación entre 25 % y 50 % respecto a los valores esperados para este mes

en el territorio nacional.



(a) Mapa de pronóstico de precipitación mensual según metodología NextGen elaborado para agosto de 2026.



(b) Mapa de pronóstico de anomalía de precipitación en milímetros para el mes de agosto de 2026 utilizando la metodología NextGen.

Figura 3: Mapas de pronóstico de precipitación y pronóstico de anomalía absoluta. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de ENACTS¹ y NextGen, 2026.

El **cuadro 2** presenta el pronóstico de la distribución porcentual de la precipitación semanal para las distintas regiones climáticas durante agosto de 2026, con base en los modelos dinámicos ejecutados por INSIVUMEH. En términos generales, se observa una marcada concentración de la precipitación durante la semana 4 en todas las regiones del país, indicando un incremento de la actividad lluviosa hacia el final del mes.

Los mayores aportes durante la cuarta semana se prevén en Pacífico (86%), Petén (74%), Bocacosta (55%) y Franja Transversal del Norte (50%). En contraste, Altiplano Central, Occidente, Valles de Oriente y Caribe, presentan una distribución más equilibrada entre las semanas 2, 3 y 4, aunque la última semana continúa siendo la de mayor aporte. En conjunto, el pronóstico sugiere una tendencia general hacia el fortalecimiento de las lluvias durante la última semana de agosto en todo el país.

Cuadro 2: Distribución porcentual de la lluvia por semana por región climática para agosto de 2026.

Región Climática	Semana 1 (%)	Semana 2 (%)	Semana 3 (%)	Semana 4 (%)
Petén	15	4	7	74
Franja Transversal del Norte	11	20	19	50
Pacífico	2	7	5	86
Bocacosta	6	22	17	55
Valles de Oriente	4	29	26	41
Occidente	2	27	27	44
Altiplano Central	3	34	20	43
Caribe	26	7	28	39

Temperatura

La figura 4a presenta el mapa de pronóstico de temperatura media promedio para el mes de agosto de 2026 en el que se distinguen **las regiones más frescas, siendo estas: Occidente, Altiplano Central y Franja Transversal del Norte, con valores que oscilan entre 13 °C y 23 °C en promedio**. En las regiones con tonos naranjas oscuro y rojos se esperan temperaturas medias promedio entre 22 °C y 32 °C. En la figura 4b se muestra el pronóstico de anomalía de temperatura media. Se esperan anomalías de temperatura por arriba del promedio climatológico (entre 0.5 °C y 2.0 °C), en la mayor parte del país.

Referente a la temperatura máxima, en la figura 5a se muestra el mapa de pronóstico de temperatura máxima promedio para el mes de agosto de 2026, en donde se observa que **las regiones más cálidas esperadas son Bocacosta, Caribe, Pacífico, Norte y Valles de Oriente, donde las temperaturas máximas podrían oscilar entre 28 °C y 38 °C**. En las regiones con tonos naranja se espera que las temperaturas oscilen entre 19 °C y 29 °C. La figura 5b muestra el mapa de pronóstico de anomalía de temperatura máxima donde se observan anomalías arriba del promedio (entre 0.5 °C y 3 °C) en la mayor parte del país.




Figura 4: Mapas de pronóstico de temperatura media promedio utilizando la metodología NextGen. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de NextGen², 2026.

¹Datos de ENACTS y Pronóstico de Precipitación NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.

²Datos de ENACTS y Pronóstico de Temperatura Media NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.




Figura 5: Mapas de pronóstico de temperatura máxima promedio utilizando la metodología NextGen. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de NextGen, 2026.³

Los valores promedio pronosticados hacen referencia a los valores con mayor probabilidad de la temperatura media y máxima en el mes. Aunque también es posible que se presenten valores por arriba o por debajo de estos.


Como referencia para el mes de agosto, en el **cuadro 3** se presentan datos del pronóstico de temperaturas media promedio y máxima promedio según la metodología NextGen y los registros absolutos de temperatura máxima durante el periodo climatológico 1991-2020 en las estaciones de INSIVUMEH. En cuanto a la temperatura media, **resaltan las regiones de la Franja Transversal del Norte, Altiplano Central y Occidente con los promedios más bajos**. Estos valores se enuncian como una referencia de algunos de los lugares más frescos para el mes de agosto.

Referente a la temperatura máxima, **resalta la estación de Zacapa que registró una temperatura máxima para el mes de agosto de 39.5 °C en el año 1998**. En Flores, municipio de Petén, se registró una temperatura máxima de 38.4 °C en el año 2019. Estos valores se enuncian como una referencia de algunos de los lugares más cálidos para el mes de agosto.

³Datos de ENACTS y Pronóstico de Temperatura Máxima NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.

Cuadro 3: Pronóstico de temperaturas media promedio y máxima promedio según modelos NextGen para el mes de agosto de 2026 y registro de temperatura máxima absoluta en el mes de agosto según climatología 1991-2020.

Región Climática	Zona de Interés	Temperatura Media	Temperatura Máxima	
		Pronóstico Promedio (°C)	Pronóstico Promedio (°C)	Registro Absoluto (°C) (año)
Altiplano Central	Guatemala	20 - 23	25 - 28	30.2 (1998)
	Sololá	13 - 20	19 - 26	25.0 (2019)
Bocacosta	Retalhuleu	28	34 - 35	36.6 (2015)
	Escuintla	22 - 28	28 - 35	34.8 (2020)
Caribe	Puerto Barrios	28 - 29	31 - 32	36.4 (2020)
	Lívingston	28 - 30	32 - 34	38.0 (2020)
Franja Transversal del Norte del Norte	Cobán	21 - 22	27 - 28	32.0 (2010)
	Nebaj	16 - 20	23 - 28	33.4 (2007)
Occidente	Huehuetenango	17 - 21	24 - 27	30.0 (2005)
	Quetzaltenango	15 - 16	21 - 23	27.9 (2013)
Pacífico	San José	28 - 30	34 - 36	36.0 (2019)
	Champerico	29 - 30	35	36.8 (2019)
Norte	Flores	26 - 27	31 - 32	38.4 (2019)
	Poptún	25 - 26	29 - 31	34.4 (2019)
Valles de Oriente	Esquipulas	22 - 26	28 - 32	32.4 (2019)
	Zacapa	29 - 32	35 - 38	39.5 (1998)



Fuente: INSIVUMEH, 2026

Es importante señalar que los valores consignados en la columna de registro absoluto corresponden a la **temperatura máxima absoluta observada durante el mes de agosto dentro del período climatológico de referencia 1991–2020**. En consecuencia, estos registros representan los valores extremos documentados únicamente a partir de la información disponible en ese intervalo temporal y no deben interpretarse como máximos absolutos históricos fuera de dicho período.

Temporada Ciclónica

La temporada ciclónica inicia el 15 de mayo en la cuenca del Pacífico y el 1 de junio en la cuenca del Atlántico. El pronóstico de actividad ciclónica se actualiza a lo largo de la temporada. En este documento se presenta la última actualización del pronóstico (22 de julio de 2026) para la cuenca del Atlántico y la última actualización (22 de julio de 2026) para la cuenca del Pacífico Oriental según el consenso de los integrantes del Foro del Clima de América Central.

En el **cuadro 4** se observa que, para la cuenca del Atlántico Norte se espera una temporada ligeramente menos activa que el promedio, durante la cual en la temporada se podrían formar de 8 a 11 tormentas (de un promedio de 14), de las que de 3 a 5 podrían convertirse en huracanes (de un promedio de 7) y, de estos, de 1 a 2 huracanes mayores (de un promedio de 3).

En el caso del Pacífico Oriental, se espera una temporada cercana o ligeramente más activa que el promedio. Para la temporada se espera la posible formación de 15 a 22 tormentas nombradas (de un promedio de 15), de las cuales de 9 a 14 podrían convertirse en huracanes (de un promedio de 8) y de estas, de 5 a 9 (de un promedio de 4), en huracanes mayores.

Hasta el 5 de agosto de 2026, en la región del Pacífico Oriental se han registrado siete tormentas tropicales de las cuales dos se convirtieron en huracanes y uno en huracán mayor. En la cuenca del Atlántico Norte se han registrado dos tormentas tropicales. **Es importante aclarar que, debido a la incertidumbre natural del pronóstico estacional, no es posible estimar las trayectorias de los ciclones previstos, previo a que estos se formen.**

Cuadro 4: Pronóstico de la temporada ciclónica. Se describen los parámetros de la temporada ciclónica para las cuencas del Atlántico Norte y del Pacífico Oriental. *El conteo de ciclones tropicales corresponde al total registrado en toda la cuenca del Atlántico Norte y del Pacífico Oriental, independientemente de si estos sistemas afectan o no el territorio nacional.*

Cuenca	Parámetro	Promedio 1991-2020	Pronóstico 2026	Observado	Resto de la temporada
Atlántico Norte	Tormentas nombradas	14	8-11	2	6-9
	Huracanes	7	3-5	-	3-5
	Huracanes mayores	3	1-2	-	1-2
Pacífico Oriental	Tormentas nombradas	15	15-22	7	8-15
	Huracanes	8	9-14	2	7-12
	Huracanes mayores	4	5-9	1	4-8

Fuente:Foro del Clima de América Central.

Recomendaciones

- A las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tomar en cuenta la información proporcionada en este documento para la planificación y ejecución de sus actividades.
- Al sector gestión de riesgos:
 - Prevenir a la población sobre la posibilidad de altas temperaturas, en especial en las regiones Norte, Caribe, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico.
 - Considerar las lluvias que pueden presentarse en la cadena volcánica puesto que pueden favorecer la presencia de lahares.
 - Mantenerse alerta y considerar posibles eventos de inundaciones y deslizamientos originados por las lluvias durante el mes de agosto.
 - Mantener vigilancia ante la posible formación o acercamiento de tormentas tropicales y huracanes, debido a que estos sistemas pueden generar lluvias intensas en periodos cortos, crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos, principalmente en áreas vulnerables.
- Al sector salud:
 - Difundir recomendaciones a la población que permitan mitigar efectos de enfermedades respiratorias.
 - Hacer un llamado a la población a evitar el estancamiento de agua innecesario, con el fin de disminuir la proliferación de vectores transmisores de enfermedades.
- Al sector de infraestructura vial:
 - Realizar inspecciones periódicas de la red de carreteras, que incluya la limpieza de drenajes, revisión de puentes y otras estructuras clave, antes y durante la temporada de lluvias. Es fundamental garantizar que las vías de comunicación se mantengan en buenas condiciones y libres de obstrucciones, para prevenir inundaciones y otros inconvenientes.
- A la población en general:
 - Tomar en cuenta que pueden presentarse lluvias con actividad eléctrica, por lo que se recomienda alejarse de espacios abiertos, torres o de cualquier estructura metálica durante estos eventos. Así mismo, considerar que las fuertes lluvias pueden presentar inundaciones o crecidas repentinas de los ríos, por lo tanto, es importante evitar cruzar ríos o caminos cerca de las orillas de estos.
 - Mantenerse hidratados y protegerse de los rayos del sol, en especial entre las 11:00 y 15:00 horas, en las que se alcanzan usualmente los máximos de temperatura del día y los rayos ultravioleta son más fuertes.
- Al sector agropecuario:
 - Al MAGA, emitir recomendaciones oportunas para fortalecer y prevenir al sector agropecuario ante las condiciones climáticas presentadas en esta perspectiva.
 - Tomar en cuenta las recomendaciones emitidas para cada departamento del país en los boletines agroclimáticos elaborados por las Mesas Técnicas Agroclimáticas.
- A todos los sectores:
 - Se recomienda dar seguimiento a los boletines climatológicos, meteorológicos, sísmicos, vulcanológicos e hidrológicos emitidos por INSIVUMEH. Para consultar las perspectivas climáticas mensuales publicadas a inicio de cada mes ingrese al siguiente enlace:

<https://insivumeh.gob.gt/boletinesaplicaciones/>