

Perspectiva Climática Mensual Abril 2026

PCM-202604

Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología - INSIVUMEH

Resumen

El mes de abril se caracteriza por el incremento de la radiación solar directa, definiendo el establecimiento pleno de la época cálida, caracterizada por períodos prolongados de temperaturas altas.

El pronóstico mensual indica que los mayores volúmenes de lluvia se esperan en las regiones Caribe, Norte, Franja Transversal del Norte y Bocacosta en un rango desde 55 mm hasta 195 mm, mientras que en regiones como Occidente, Altiplano Central, Pacífico y Valles de Oriente, se prevén acumulados entre 15 mm y 75 mm.

Respecto al estado del ENOS, los modelos internacionales señalan condiciones neutras (53 % de probabilidad) y condición de El Niño (47 % de probabilidad) para el trimestre abril-junio.

Se pronostica un frente frío en abril, con posibles lluvias y descensos de temperatura.


En cuanto a la temperatura media, se prevén valores entre 14 °C y 33 °C según la región, con anomalías moderadas respecto a la climatología. Las temperaturas máximas podrían oscilar entre 28 °C y 39°C en las zonas norte y sur mientras que en el resto del país se espera que oscilen entre 19 °C y 29 °C.

En síntesis, abril estará marcado por el establecimiento de la época cálida, lluvias similares a la climatología y temperaturas altas en Petén, Caribe, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico, lo que requiere atención especial de los sectores de gestión de riesgos, salud y agropecuario.

Estado de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)

En la figura 1 se presenta la anomalía de temperatura superficial del mar (TSM) en la región Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial) según la predicción del IRI emitida el 19 de marzo de 2026. En esta figura se observa que **para el trimestre marzo-mayo (MAM) se espera una anomalía de TSM de 0.2°C, lo que indica un escenario de condiciones Neutras**. También se observa que los modelos dinámicos y estadísticos predicen en promedio una anomalía de TSM de 0.5°C para el trimestre abril-junio (AMJ) y una anomalía de TSM de 0.7°C para el trimestre mayo-julio (MJJ).


Figura 1: Gráfico de predicciones de anomalías de TSM según modelos dinámicos (15) y estadísticos (10) para ENOS, publicado el 19 de marzo de 2026. Las líneas con figuras sólidas indican la anomalía de temperatura superficial del mar según modelos dinámicos y las líneas con figuras contorneadas muestran los resultados de modelos estadísticos.



Fuente: IRI ENSO Forecast, 2026. Traducción: INSIVUMEH.

En la figura 2 se muestran las probabilidades de ocurrencia para cada estado de ENOS como barras verticales, en color azul para las condiciones de **La Niña**, en color gris para las condiciones **neutras** y en color rojo para las condiciones de **El Niño**. Esta indica que para el trimestre abril-junio (AMJ) hay un 0 % de probabilidad para las condiciones de La Niña, un 53 % de probabilidad para las condiciones neutras y un 47 % de probabilidad para las condiciones de El Niño. Para el trimestre mayo-julio (MJJ) hay un 0 % para las condiciones de La Niña, un 28 % para condiciones neutras y un 72 % para condiciones de El Niño. Según los modelos de ENOS, **se espera persistencia de las condiciones Neutras para el trimestre abril-junio.**

Figura 2: Gráfico de probabilidad de ocurrencia para cada estado de ENOS por temporada, publicado el 19 de marzo de 2026. Las barras verticales indican la probabilidad para cada temporada y estado de ENOS; las líneas continuas indican las probabilidades climatológicas.



Fuente: IRI ENSO Forecast, 2026. Traducción: INSIVUMEH.

Frentes Fríos

Los frentes fríos son sistemas frontales que definen patrones de viento norte moderado a fuerte; es decir, aire frío que después de sobrepasar las planicies en la península de Yucatán, se ve forzado a ascender, condensando su humedad especialmente en la pendiente contraria al viento de las montañas del norte. A partir de este ascenso de humedad **se generan las lluvias estacionales en las regiones del Norte, Caribe y Franja Transversal del Norte**. También se pueden presentar algunos eventos aislados de lluvia en Bocacosta y en el sur de la región Occidente.

En Guatemala, la temporada fría inicia, normalmente, en la segunda quincena de octubre y finaliza en la primera quincena de marzo, aunque puede extenderse hasta abril en algunas regiones. Cabe mencionar que, hasta la fecha, el recuento de frentes fríos que han afectado al territorio nacional se mantiene en catorce. Para los meses siguientes en el **cuadro 1**, se presenta el número de frentes fríos pronosticados por mes, en comparación con la climatología histórica.

Cuadro 1: Pronóstico de frentes fríos para el período 2025-2026 según años análogos (1959, 1961, 1973, 2002 y 2003) y climatología 1991-2020.

Mes	Climatología 1991-2020	Pronóstico de Frentes Fríos	Observados
Octubre	1	1	1
Noviembre	2	2	3
Diciembre	4	3	3
Enero	4	4	4
Febrero	3	3	1
Marzo	3	2	2
Abril	1	1	—

Fuente: INSIVUMEH, 2026


En abril se espera la ocurrencia de un evento, lo cual se encuentra dentro del promedio climatológico. Asimismo, este mes marcaría el final de la temporada fría. Estos sistemas favorecerán un incremento de las lluvias en las regiones Norte y Caribe, mientras que en las zonas montañosas se prevén descensos más marcados de la temperatura.

Precipitación Mensual

Respecto a la precipitación mensual, en el **cuadro 2** se presentan los acumulados de lluvia por región climática correspondiente a los sitios donde se ubican las estaciones meteorológicas de INSIVUMEH. Se incluyen los valores de la climatología 1991-2020 y el pronóstico según la metodología NextGen. Los mapas de la **figura 3** describen la distribución espacial de los acumulados mensuales de lluvia. La **figura 3a** se presenta el mapa de acumulado de lluvia según el pronóstico NextGen, mientras que en la **figura 3b** se muestra el pronóstico de anomalía absoluta.

Cuadro 2: Acumulados de lluvia por región climática en milímetros (mm) para la normal climatológica 1991-2020 y el pronóstico según modelos NextGen correspondiente al mes de abril de 2026.

Región Climática	Zona de Interés	Climatología Abr 1991-2020 (mm)	Modelos NextGen Abr 2026 (mm)
Altiplano Central	Guatemala	25 - 30	20 - 25
	Sololá	30 - 45	30 - 40
Bocacosta	Retalhuleu	105 - 170	110 - 195
	Escuintla	120 - 165	120 - 165
Caribe	Puerto Barrios	100 - 120	95 - 115
	Lívingston	75 - 85	65 - 80
Franja Transversal del Norte	Cobán	95 - 130	105 - 145
	Nebaj	50 - 75	45 - 70
Occidente	Huehuetenango	50 - 80	45 - 75
	Quetzaltenango	35 - 55	25 - 45
Pacífico	San José	40	40 - 45
	Champerico	60 - 70	60 - 65
Norte	Flores	60 - 65	55 - 60
	Poptún	70 - 75	75 - 80
Valles de Oriente	Esquipulas	50 - 70	50 - 65
	Zacapa	25 - 30	15 - 20



Fuente: INSIVUMEH, 2026

Durante el mes de abril, los mayores acumulados de precipitación se prevén en las regiones Caribe, Norte, Franja Trasversal del Norte y Bocacosta en un rango desde 55 mm hasta 195 mm. En las regiones de Altiplano Central, Pacífico, Occidente y Valles de Oriente se estiman acumulados entre 15 mm y 75 mm.




Figura 3: Mapas de pronóstico de precipitación y pronóstico de anomalía absoluta. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de ENACTS¹ y NextGen, 2026.

El **cuadro 3** presenta el pronóstico de la distribución porcentual de la precipitación semanal para distintas regiones climáticas durante abril de 2026, según los modelos dinámicos ejecutados por INSIVUMEH. En general, se observa que la mayor proporción de lluvia se concentra hacia la semana 4 en la mayoría de las regiones, destacando Norte (76 %), Franja Transversal del Norte (55 %), Altiplano Central (55 %) y Valles de Oriente (52 %), lo que sugiere un incremento significativo de las lluvias hacia finales del mes. En contraste, regiones como el Caribe muestran una distribución más temprana, con un máximo en la semana 1 (44 %). El Pacífico y la Bocacosta presentan una distribución más gradual, con mayor aporte en la semana 3 (40 % y 33 %, respectivamente).

Cuadro 3: Distribución porcentual de la lluvia por semana para cada región climática, correspondiente al mes de abril de 2026 , según el pronóstico de modelo WRF

Región Climática	Semana 1 (%)	Semana 2 (%)	Semana 3 (%)	Semana 4 (%)
Norte	22	0	2	76
Franja Transversal del Norte	24	11	10	55
Pacífico	9	22	40	29
Bocacosta	14	12	33	42
Valles de Oriente	17	10	22	52
Occidente	21	12	16	51
Altiplano Central	26	6	13	55
Caribe	44	14	11	32

¹Datos de ENACTS y Pronóstico de Precipitación NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.

Temperatura

La figura 4a presenta el mapa de pronóstico de temperatura media promedio para el mes de abril de 2026 en el que se distinguen **las regiones con temperaturas medias más bajas, siendo estas: Occidente y Altiplano Central, con valores que oscilan entre 14°C y 23°C en promedio**. En las regiones con tonos naranjas oscuro y rojos se esperan temperaturas medias promedio entre 23°C y 33° C. En la figura 4b se muestra el pronóstico de anomalía de temperatura media. Se esperan anomalías de temperatura ligeramente por abajo del promedio climatológico (entre -0.5°C y -1.00°C), en la mayor parte del país. En contraste, en algunos sectores de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Quetzaltenango, Totonicapán San Marcos y Retalhuleu podrían presentarse anomalías positivas (entre 0.5 °C y 3 °C).

Referente a la temperatura máxima, en la figura 5a se muestra el mapa de pronóstico de temperatura máxima promedio para el mes de abril de 2026 , en donde se observa que **las regiones más cálidas esperadas son Petén, Caribe, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico, donde las temperaturas máximas oscilan entre 28°C y 39° C**. En las regiones con tonos naranja se espera que las temperaturas oscilen entre 19°C y 29°C. La figura 5b muestra el mapa de pronóstico de anomalía de temperatura máxima donde se observan anomalías abajo del promedio (entre -0.5 °C y -2 °C) en la mayor parte del país, a excepción de algunos sectores de los departamentos de Chimaltenango, Escuintla, Quetzaltenango, Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz donde podrían presentarse anomalías positivas (entre 0.5 °C y 3 °C).




Figura 4: Mapas de pronóstico de temperatura media promedio utilizando la metodología NextGen. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de NextGen², 2026.

²Datos de ENACTS y Pronóstico de Temperatura Media NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.




Figura 5: Mapas de pronóstico de temperatura máxima promedio utilizando la metodología NextGen. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de NextGen, 2026.³

Los valores promedio pronosticados hacen referencia a los valores más probables de las temperatura media y máxima en el mes. Aunque también es posible que se presenten valores por arriba o por debajo de estos.


Como referencia para el mes de abril, en el **cuadro 4** se presentan datos del pronóstico de temperaturas media promedio y máxima promedio según la metodología NextGen y los registros absolutos de temperatura máxima durante el periodo climatológico 1991-2020 en las estaciones de INSIVUMEH. En cuanto a la temperatura media, **resaltan las regiones de la Franja Transversal del Norte y Occidente con los promedios más bajos**. Estos valores se enuncian como una referencia de algunos de los lugares más frescos para el mes de abril.

Referente a la temperatura máxima, **resalta la estación de Zacapa que registró una temperatura máxima para el mes de abril de 43°C en el año 1991**. En Flores, municipio de Petén, se registró una temperatura máxima de 42°C en el año 2017. Estos valores se enuncian como una referencia de algunos de los lugares más cálidos para el mes de abril.

³Datos de ENACTS y Pronóstico de Temperatura Máxima NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.

Cuadro 4: Pronóstico de temperaturas media promedio y máxima promedio según modelos NextGen para el mes de abril de 2026 y registro de temperatura máxima absoluta en el mes de abril según climatología 1991-2020.

Región Climática	Zona de Interés	Temperatura Media	Temperatura Máxima	
		Pronóstico Promedio (°C)	Pronóstico Promedio (°C)	Registro Absoluto (°C) (año)
Altiplano Central	Guatemala	20 - 23	26 - 29	33.9 (1991)
	Sololá	13 - 20	19 - 25	28.8 (2007)
Bocacosta	Retalhuleu	28 - 29	35	39.8 (2005)
	Escuintla	23 - 28	28 - 34	40.0 (2014)
Caribe	Puerto Barrios	27 - 28	32	39.0 (1993)
	Livingston	28 - 29	32 - 34	42.6 (2015)
Franja Transversal del Norte	Cobán	21 - 23	28 - 29	36.0 (1998)
	Nebaj	17 - 21	26 - 29	33.4 (2020)
Occidente	Huehuetenango	18 - 21	26 - 29	34.6 (2015)
	Quetzaltenango	14 - 16	22 - 24	29.6 (2017)
Pacífico	San José	28 - 30	35 - 36	40.0 (2000)
	Champerico	29 - 30	34 - 35	37.0 (2009)
Norte	Flores	28 - 29	36 - 37	42.6 (2017)
	Poptún	25 - 26	32 - 34	38.4 (2020)
Valles de Oriente	Esquipulas	23 - 26	30 - 33	36.2 (1998)
	Zacapa	30 - 33	36 - 39	43.2 (1991)



Fuente: INSIVUMEH, 2026

Recomendaciones

- A las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tomar en cuenta la información proporcionada en este documento para la planificación y ejecución de sus actividades.
- Al sector gestión de riesgos:
 - Prevenir a la población sobre la posibilidad de altas temperaturas, en especial en las regiones Norte, Caribe, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico.
- Al sector salud:
 - Hacer un llamado a la población a evitar el estancamiento de agua innecesario, con el fin de disminuir la proliferación de vectores transmisores de enfermedades.
- A la población en general:
 - Mantenerse hidratados y protegerse de los rayos del sol, en especial entre las 11:00 y 15:00 horas, debido a que a estas horas se alcanzan usualmente los máximos de temperatura en el día y los rayos ultravioleta son más fuertes.
- Al sector agropecuario:
 - Al MAGA, emitir recomendaciones oportunas para fortalecer y prevenir al sector agropecuario ante las condiciones meteorológicas y climáticas presentadas en esta perspectiva.
 - Tomar en cuenta las recomendaciones emitidas para cada departamento del país en los boletines agroclimáticos elaborados por las Mesas Técnicas Agroclimáticas.
- Al sector ambiental:
 - Tener precaución ante las condiciones que pueden favorecer la proliferación y propagación de incendios forestales, debido a la baja humedad en el suelo y a las altas temperaturas que se puedan presentar en el país.
- A todos los sectores:
 - Se recomienda dar seguimiento a los boletines climatológicos, meteorológicos, sísmicos, vulcanológicos e hidrológicos emitidos por INSIVUMEH. Para consultar las perspectivas climáticas mensuales publicadas a inicio de cada mes ingrese al siguiente enlace:

<https://insivumeh.gob.gt/?p=13162/>