

Perspectiva Climática Mensual Junio 2026

PCM-202606

Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología - INSIVUMEH

Resumen

El mes de junio se distingue por registrar el primer máximo de precipitación de la época lluviosa en el país, así como por el inicio de la temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico.

El pronóstico mensual indica que los mayores volúmenes de lluvia se esperan en las regiones Bocacosta, Altiplano Central y Caribe, con valores que oscilan entre 195 mm y 595 mm, mientras que en las regiones de Occidente, Petén, Franja Transversal del Norte y el departamento de Zacapa, se estiman acumulados menores, entre 130 mm y 295 mm.

Respecto al estado del fenómeno de El Niño (ENOS, por sus siglas en inglés), los modelos internacionales señalan posible transición a condiciones de la fase El Niño, con un 98 % de probabilidad.


En cuanto a la temperatura media, se prevén valores entre 13 °C y 31°C según la región, con anomalías moderadas respecto a la climatología. Las temperaturas máximas podrían oscilar entre 28°C y 37°C en las zonas norte y sur, mientras que en el resto del país se espera que oscilen entre 18 °C y 29°C.

En síntesis, junio estará marcado por el establecimiento de la época lluviosa, lluvias por debajo de la climatología y temperaturas altas en Petén, Caribe, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico, lo que requiere atención especial de los sectores de gestión de riesgos, salud y agropecuario.

Estado de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)

En la figura 1 se presenta la anomalía de temperatura superficial del mar (TSM) en la región Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial) según la predicción del IRI emitida el 19 de mayo de 2026. En esta figura se observa que para el trimestre mayo-julio (MJJ) se espera una anomalía de TSM entre 1°C y 1.5°C, **lo que indica un escenario de posible transición a condiciones de El Niño**. También se observa que los modelos dinámicos y estadísticos predicen en promedio una anomalía de TSM entre 1.2°C y 1.7°C para el trimestre junio-agosto (JJA) y una anomalía de TSM de 1.5°C a 2°C para el trimestre julio-septiembre (JAS).


Figura 1: Gráfico de predicciones de anomalías de TSM según modelos dinámicos (16) y estadísticos (10) para ENOS, publicado el 19 de mayo de 2026. Las líneas con figuras sólidas indican la anomalía de temperatura superficial del mar según modelos dinámicos y las líneas con figuras contorneadas muestran los resultados de modelos estadísticos.



Fuente: IRI ENSO Forecast, 2026. Traducción: INSIVUMEH.

En la figura 2 se muestran las probabilidades de ocurrencia para cada estado de ENOS con barras verticales, en color azul para las condiciones de **La Niña**, en color gris para las condiciones **neutras** y en color rojo para las condiciones de **El Niño**. Esta pinta una perspectiva sorprendentemente confiada de El Niño, con probabilidades que alcanzan un máximo del 98 % para mayo-julio (MJJ) 2026 y que permanecen excepcionalmente altas en un 97-98 % durante todo el período de pronóstico (MJJ 2026 a EFM 2027). Las condiciones neutrales de ENSO se reducen a solo 2-3 %, mientras que la probabilidad de desarrollo de La Niña es efectivamente cero. Según los modelos de ENOS, **se espera una posible transición a las condiciones de El Niño para el trimestre junio-agosto**.

Figura 2: Gráfico de probabilidad de ocurrencia para cada estado de ENOS por temporada, publicado el 19 de mayo de 2026. Las barras verticales indican la probabilidad para cada temporada y estado de ENOS; las líneas continuas indican las probabilidades climatológicas.




Fuente: IRI ENSO Forecast, 2026. Traducción: INSIVUMEH.

Precipitación Mensual

Respecto a la precipitación mensual, en el **cuadro 1** se presentan los acumulados de lluvia por región climática correspondiente a los sitios donde se ubican las estaciones meteorológicas de INSIVUMEH. Se incluyen los valores de la climatología 1991-2020 y el pronóstico según la metodología NextGen. Los mapas de la **figura 3** describen la distribución espacial de los acumulados mensuales de lluvia. En la **figura 3a** se presenta el mapa de acumulado de lluvia según el pronóstico NextGen, mientras que en la **figura 3b** se muestra el pronóstico de anomalía absoluta.

Cuadro 1: Acumulados de lluvia por región climática en milímetros (mm) para la normal climatológica 1991-2020 y el pronóstico según modelos NextGen correspondiente al mes de junio de 2026.

Región Climática	Zona de Interés	Climatología Jun 1991-2020 (mm)	Modelos NextGen Jun 2026 (mm)
Altiplano Central	Guatemala	240 - 300	225 - 290
	Sololá	250 - 330	220 - 290
Bocacosta	Retalhuleu	440 - 675	360 - 595
	Escuintla	450 - 570	400 - 520
Caribe	Puerto Barrios	210 - 240	205 - 235
	Lívingston	225 - 265	210 - 245
Franja Transversal del Norte	Cobán	240 - 315	195 - 260
	Nebaj	250 - 360	210 - 295
Occidente	Huehuetenango	205 - 240	190 - 225
	Quetzaltenango	145 - 260	140 - 230
Pacífico	San José	280 - 300	215 - 225
	Champerico	295 - 335	235 - 260
Norte	Flores	240 - 275	215 - 250
	Poptún	200 - 235	185 - 215
Valles de Oriente	Esquipulas	300 - 310	265 - 280
	Zacapa	165 - 230	130 - 185



Fuente: INSIVUMEH, 2026

Durante el mes de junio, las regiones de Bocacosta, Altiplano Central y Caribe concentrarán los mayores acumulados de precipitación, con valores que oscilan entre 195 mm y 595 mm. Por su parte, en Occidente, Petén, Franja Transversal del Norte y el departamento de Zacapa se estiman acumulados menores, entre 130 mm y 295 mm. Sin embargo, a pesar de que estas primeras regiones serán las más lluviosas en términos absolutos, en la **figura 3b** se evidencia un déficit de precipitación a nivel nacional. Este déficit afectará principalmente a Pacífico, Bocacosta y el oeste de la Franja Transversal del Norte con anomalías negativas entre -60 mm y -90 mm.




Figura 3: Mapas de pronóstico de precipitación y pronóstico de anomalía absoluta. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de ENACTS¹ y NextGen, 2026.

El **cuadro 2** presenta el pronóstico de la distribución porcentual de la precipitación semanal para distintas regiones climáticas durante junio de 2026, según los modelos dinámicos ejecutados por INSIVUMEH. En general, se observa que la precipitación tenderá a concentrarse principalmente entre la semana 2 y la semana 3 en la mayoría de las regiones del país. Destacan los mayores aportes en la semana 2 para las regiones Norte (48%), Caribe (43%), Franja Transversal del Norte (38%), Valles de Oriente (37%) y Altiplano Central (34%), lo que sugiere un incremento importante de las lluvias durante la primera mitad del mes.

Por otro lado, las regiones de Bocacosta (45%) y Occidente (35%) presentan su máxima contribución durante la semana 3, mientras que en el Pacífico se prevé una distribución más irregular, con el mayor porcentaje concentrado en la semana 1 (38%) y un descenso marcado en la semana 2 (8%). En términos generales, la semana 4 muestra aportes moderados y relativamente homogéneos entre regiones, con porcentajes entre 16% y 24%, indicando una disminución gradual de la concentración de lluvias hacia finales del mes.

Cuadro 2: Distribución porcentual de la lluvia por semana para cada región climática durante junio de 2026

Región Climática	Semana 1 (%)	Semana 2 (%)	Semana 3 (%)	Semana 4 (%)
Norte	19	48	12	21
Franja Transversal del Norte	14	38	29	19
Pacífico	38	8	30	24
Bocacosta	20	14	45	21
Valles de Oriente	13	37	31	19
Occidente	15	32	35	18
Altiplano Central	24	34	26	16
Caribe	8	43	27	22

Temperatura

La figura 4a presenta el mapa de pronóstico de temperatura media promedio para el mes de junio de 2026 en el que se distinguen **las regiones con temperaturas medias más bajas, siendo estas: Occidente y Altiplano Central, con valores que oscilan entre 13°C y 22°C en promedio**. En las regiones con tonos naranjas oscuro y rojos se esperan temperaturas medias promedio entre 22°C y 31° C. En la figura 4b se muestra el pronóstico de anomalía de temperatura media. Se esperan anomalías de temperatura ligeramente por arriba del promedio climatológico (entre 0.5°C y 2.0°C), en la mayor parte del país. En contraste, en algunos sectores de Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa y San Marcos podrían presentarse anomalías negativas (entre -0.5 °C y -3 °C).

Referente a la temperatura máxima, en la figura 5a se muestra el mapa de pronóstico de temperatura máxima promedio para el mes de junio de 2026 , en donde se observa que **las regiones más cálidas esperadas son Petén, Caribe, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico, donde las temperaturas máximas oscilan entre 27°C y 37° C**. En las regiones con tonos naranja se espera que las temperaturas oscilen entre 18°C y 29°C. La figura 5b muestra el mapa de pronóstico de anomalía de temperatura máxima donde se observan anomalías arriba del promedio (entre 0.5 °C y 3 °C) en la mayor parte del país, a excepción de algunos sectores de los departamentos de Petén, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa, Baja Verapaz, El Progreso y Jutiapa donde podrían presentarse anomalías negativas (entre -0.5 °C y -2 °C).




Figura 4: Mapas de pronóstico de temperatura media promedio utilizando la metodología NextGen. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de NextGen², 2026.

¹Datos de ENACTS y Pronóstico de Precipitación NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.

²Datos de ENACTS y Pronóstico de Temperatura Media NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.




Figura 5: Mapas de pronóstico de temperatura máxima promedio utilizando la metodología NextGen. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de NextGen, 2026.³

Los valores promedio pronosticados hacen referencia a los valores más probables de las temperatura media y máxima en el mes. Aunque también es posible que se presenten valores por arriba o por debajo de estos.


Como referencia para el mes de junio, en el **cuadro 3** se presentan datos del pronóstico de temperaturas media promedio y máxima promedio según la metodología NextGen y los registros absolutos de temperatura máxima durante el periodo climatológico 1991-2020 en las estaciones de INSIVUMEH. En cuanto a la temperatura media, **resaltan las regiones de la Franja Transversal del Norte, Altiplano Central y Occidente con los promedios más bajos**. Estos valores se enuncian como una referencia de algunos de los lugares más frescos para el mes de junio.

Referente a la temperatura máxima, **resalta la estación de Zacapa que registró una temperatura máxima para el mes de junio de 42°C en el año 1992**. En Flores, municipio de Petén, se registró una temperatura máxima de 41°C en el año 2005. Estos valores se enuncian como una referencia de algunos de los lugares más cálidos para el mes de junio.

³Datos de ENACTS y Pronóstico de Temperatura Máxima NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.

Cuadro 3: Pronóstico de temperaturas media promedio y máxima promedio según modelos NextGen para el mes de junio de 2026 y registro de temperatura máxima absoluta en el mes de junio según climatología 1991-2020.

Región Climática	Zona de Interés	Temperatura Media	Temperatura Máxima	
		Pronóstico Promedio (°C)	Pronóstico Promedio (°C)	Registro Absoluto (°C) (año)
Altiplano Central	Guatemala	20 - 22	24 - 27	31.2 (1993)
	Sololá	13 - 20	18 - 25	25.0 (2019)
Bocacosta	Retalhuleu	27 - 28	33 - 34	37.4 (1998)
	Escuintla	22 - 27	27 - 33	35.8 (2015)
Caribe	Puerto Barrios	28 - 29	32 - 33	39.0 (2020)
	Lívingston	29 - 30	33 - 35	40.0 (1998)
Franja Transversal del Norte del Norte	Cobán	22 - 23	28 - 29	35.0 (2020)
	Nebaj	17 - 21	23 - 27	31.0 (2005)
Occidente	Huehuetenango	18 - 21	23 - 26	30.6 (1998)
	Quetzaltenango	14 - 16	20 - 22	25.4 (2015)
Pacífico	San José	27 - 29	33 - 34	36.0 (1991)
	Champerico	28 - 29	34	36.8 (2019)
Norte	Flores	26 - 27	30 - 31	41.0 (2005)
	Poptún	25 - 26	28 - 29	36.0 (2019)
Valles de Oriente	Esquipulas	22 - 26	28 - 31	33.2 (2016)
	Zacapa	29 - 31	34 - 37	42.0 (1992)



Fuente: INSIVUMEH, 2026

Es importante señalar que los valores consignados en la columna de registro absoluto corresponden a la **temperatura máxima absoluta observada durante el mes de junio dentro del período climatológico de referencia 1991–2020**. En consecuencia, estos registros representan los valores extremos documentados únicamente a partir de la información disponible en ese intervalo temporal y no deben interpretarse como máximos absolutos históricos fuera de dicho período.

Temporada Ciclónica

La temporada ciclónica inicia el 15 de mayo en la cuenca del Pacífico y el 1 de junio en la cuenca del Atlántico. El pronóstico de actividad ciclónica se actualiza a lo largo de la temporada. En este documento se presenta la última actualización del pronóstico (25 de mayo de 2026) para la cuenca del Atlántico y la última actualización (25 de mayo de 2026) para la cuenca del Pacífico Oriental según el consenso de los integrantes del Foro del Clima de América Central.

En el **cuadro 4** se observa que, para la cuenca del Atlántico Norte se espera una temporada ligeramente menos activa que el promedio. Para la temporada se podrían formar de 11 a 15 tormentas (de un promedio de 14), 4 a 7 huracanes (de un promedio de 7) y de 1 a 3 huracanes mayores (de un promedio de 3).

En el caso del Pacífico Oriental, se espera una temporada cercana o ligeramente más activa que el promedio. Para la temporada se espera la posible formación de 16 a 20 tormentas nombradas (de un promedio de 15) de las cuales de 8 a 10 podrían ser Huracanes (de un promedio de 8) y de estas, entre 3 a 5 (de un promedio de 4), podrían convertirse en huracanes mayores.

Cuadro 4: Pronóstico de la temporada ciclónica. Se describen los parámetros de la temporada ciclónica para las cuencas del Atlántico Norte y del Pacífico Oriental. *El conteo de ciclones tropicales corresponde al total registrado en toda la cuenca del Atlántico Norte y del Pacífico Oriental, independientemente de si estos sistemas afectan o no el territorio nacional.*

Cuenca	Parámetro	Promedio 1991-2020	Pronóstico 2026	Observado al 25 de May 2026	Resto de la temporada
Atlántico Norte	Tormentas nombradas	14	11-15	–	11-15
	Huracanes	7	4-7	–	4-7
	Huracanes mayores	3	1-3	–	1-3
Pacífico Oriental	Tormentas nombradas	15	16-20	–	16-20
	Huracanes	8	8-10	–	8-10
	Huracanes mayores	4	3-5	–	3-5

Fuente:Foro del Clima de América Central.

Recomendaciones

- A las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tomar en cuenta la información proporcionada en este documento para la planificación y ejecución de sus actividades.
- Al sector gestión de riesgos:
 - Prevenir a la población sobre la posibilidad de altas temperaturas, en especial en las regiones Norte, Caribe, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico.
 - Considerar las lluvias que pueden presentarse en la cadena volcánica puesto que pueden favorecer la presencia de lahares.
 - Mantenerse alerta y considerar posibles eventos de inundaciones y deslizamientos originados por las lluvias durante el mes de junio.
- Al sector salud:
 - Difundir recomendaciones a la población que permitan mitigar efectos de enfermedades respiratorias.
 - Hacer un llamado a la población a evitar el estancamiento de agua innecesario, con el fin de disminuir la proliferación de vectores transmisores de enfermedades.
- Al sector de infraestructura vial:
 - Realizar inspecciones periódicas de la red de carreteras, que incluya la limpieza de drenajes, revisión de puentes y otras estructuras clave, antes y durante la temporada de lluvias. Es fundamental garantizar que las vías de comunicación se mantengan en buenas condiciones y libres de obstrucciones, para prevenir inundaciones y otros inconvenientes.
- A la población en general:
 - Tomar en cuenta que pueden presentarse lluvias con actividad eléctrica, por lo que se recomienda alejarse de espacios abiertos, torres o de cualquier estructura metálica durante estos eventos. Así mismo, considerar que las fuertes lluvias pueden presentar inundaciones o crecidas repentinas de los ríos, por lo tanto, es importante evitar cruzar ríos o caminos cerca de las orillas de estos.
 - Mantenerse hidratados y protegerse de los rayos del sol, en especial entre las 11:00 y 15:00 horas, debido a que a estas horas se alcanzan usualmente los máximos de temperatura en el día y los rayos ultravioleta son más fuertes.
- Al sector agropecuario:
 - Al MAGA, emitir recomendaciones oportunas para fortalecer y prevenir al sector agropecuario ante las condiciones meteorológicas y climáticas presentadas en esta perspectiva.
 - Tomar en cuenta las recomendaciones emitidas para cada departamento del país en los boletines agroclimáticos elaborados por las Mesas Técnicas Agroclimáticas.
- A todos los sectores:
 - Se recomienda dar seguimiento a los boletines climatológicos, meteorológicos, sísmicos, vulcanológicos e hidrológicos emitidos por INSIVUMEH. Para consultar las perspectivas climáticas mensuales publicadas a inicio de cada mes ingrese al siguiente enlace:

<https://insivumeh.gob.gt/boletinesaplicaciones/>