

Perspectiva Climática Mensual Mayo 2026

PCM-202605

Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología - INSIVUMEH

Resumen

El mes de mayo se caracteriza por el inicio de la época lluviosa en la mayor parte del territorio nacional, la influencia de ondas del este, entrada de humedad en ambos litorales y el acercamiento del eje de la Zona de Convergencia Intertropical.

El pronóstico mensual indica que los mayores volúmenes de lluvia se esperan que las regiones Bocacosta, Altiplano Central, Caribe, Occidente y Pacífico concentrarán los mayores acumulados de precipitación, con valores que oscilan entre 100 mm y 515 mm. , mientras que en regiones como Franja Transversal del Norte, Petén y Valles de Oriente se estiman acumulados menores, entre 70 mm y 170 mm.

Respecto al estado del ENOS, los modelos internacionales señalan posible transición a condiciones de El Niño (88 % de probabilidad) y condiciones neutras (12 % de probabilidad) para el trimestre mayo-julio.


En cuanto a la temperatura media, se prevén valores entre 13 °C y 32°C según la región, con anomalías moderadas respecto a la climatología. Las temperaturas máximas podrían oscilar entre 28 °C y 38°C en las zonas norte y sur mientras que en el resto del país se espera que oscilen entre 18 °C y 29 °C.

En síntesis, mayo estará marcado por el inicio de la época lluviosa, lluvias por debajo de la climatología y temperaturas altas en Petén, Caribe, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico, lo que requiere atención especial de los sectores de gestión de riesgos, salud y agropecuario.

Estado de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)

En la figura 1 se presenta la anomalía de temperatura superficial del mar (TSM) en la región Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial) según la predicción del IRI emitida el 20 de abril de 2026. En esta figura se observa que para el trimestre abril-junio (AMJ) se espera una anomalía de TSM de 0.6°C , **lo que indica un escenario de posible transición a condiciones de El Niño**. También se observa que los modelos dinámicos y estadísticos predicen en promedio una anomalía de TSM de 0.9°C para el trimestre mayo-julio (MJJ) y una anomalía de TSM de 1.2°C para el trimestre junio-agosto (JJA).


Figura 1: Gráfico de predicciones de anomalías de TSM según modelos dinámicos (16) y estadísticos (10) para ENOS, publicado el 20 de abril de 2026. Las líneas con figuras sólidas indican la anomalía de temperatura superficial del mar según modelos dinámicos y las líneas con figuras contorneadas muestran los resultados de modelos estadísticos.



Fuente: IRI ENSO Forecast, 2026. Traducción: INSIVUMEH.

En la figura 2 se muestran las probabilidades de ocurrencia para cada estado de ENOS como barras verticales, en color azul para las condiciones de **La Niña**, en color gris para las condiciones **neutras** y en color rojo para las condiciones de **El Niño**. Esta indica que para el trimestre mayo-julio (MJJ) hay un 0 % de probabilidad para las condiciones de La Niña, un 12 % de probabilidad para las condiciones neutras y un 88 % de probabilidad para las condiciones de El Niño. Para el trimestre junio-agosto (JJA) hay un 0% para las condiciones de La Niña, un 8% para condiciones neutras y un 92 % para condiciones de El Niño. Según los modelos de ENOS, **se espera una posible transición a las condiciones de El Niño para el trimestre mayo-julio.**

Figura 2: Gráfico de probabilidad de ocurrencia para cada estado de ENOS por temporada, publicado el 20 de abril de 2026. Las barras verticales indican la probabilidad para cada temporada y estado de ENOS; las líneas continuas indican las probabilidades climatológicas.




Fuente: IRI ENSO Forecast, 2026. Traducción: INSIVUMEH.

Precipitación Mensual

Respecto a la precipitación mensual, en el **cuadro 1** se presentan los acumulados de lluvia por región climática correspondiente a los sitios donde se ubican las estaciones meteorológicas de INSIVUMEH. Se incluyen los valores de la climatología 1991-2020 y el pronóstico según la metodología NextGen. Los mapas de la **figura 3** describen la distribución espacial de los acumulados mensuales de lluvia. La **figura 3a** se presenta el mapa de acumulado de lluvia según el pronóstico NextGen, mientras que en la **figura 3b** se muestra el pronóstico de anomalía absoluta.

Cuadro 1: Acumulados de lluvia por región climática en milímetros (mm) para la normal climatológica 1991-2020 y el pronóstico según modelos NextGen correspondiente al mes de mayo de 2026.

Región Climática	Zona de Interés	Climatología May 1991-2020 (mm)	Modelos NextGen May 2026 (mm)
Altiplano Central	Guatemala	125 - 185	105 - 155
	Sololá	145 - 175	110 - 140
Bocacosta	Retalhuleu	390 - 575	345 - 515
	Escuintla	345 - 475	310 - 425
Caribe	Puerto Barrios	165 - 180	130 - 145
	Lívingston	130 - 155	100 - 120
Franja Transversal del Norte	Cobán	125 - 210	105 - 165
	Nebaj	110 - 150	75 - 110
Occidente	Huehuetenango	130 - 170	100 - 135
	Quetzaltenango	120 - 180	105 - 155
Pacífico	San José	180 - 205	135 - 160
	Champerico	200 - 255	175 - 220
Norte	Flores	130 - 145	95 - 105
	Poptún	105 - 115	80 - 90
Valles de Oriente	Esquipulas	150 - 190	130 - 170
	Zacapa	85 - 100	70 - 80



Fuente: INSIVUMEH, 2026

Durante el mes de mayo, las regiones de Bocacosta, Altiplano Central, Caribe, Occidente y Pacífico concentrarán los mayores acumulados de precipitación, con valores que oscilan entre 100 mm y 515 mm. Por su parte, en la Franja Transversal del Norte, Petén y Valles de Oriente se estiman acumulados menores, entre 70 mm y 170 mm. Sin embargo, a pesar de que estas primeras regiones serán las más lluviosas en términos absolutos, en **figura 3b** se evidencia un déficit de precipitación a nivel nacional. Este déficit afectará principalmente al Caribe, la Franja Transversal del Norte y sectores de Bocacosta y el Pacífico, con anomalías negativas entre -30 mm y -60 mm.




Figura 3: Mapas de pronóstico de precipitación y pronóstico de anomalía absoluta. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de ENACTS¹ y NextGen, 2026.

El **cuadro 2** presenta el pronóstico de la distribución porcentual de la precipitación semanal para distintas regiones climáticas durante mayo de 2026, según los modelos dinámicos ejecutados por INSIVUMEH. En general, se observa una marcada concentración de la precipitación hacia la semana 4 en la mayoría de las regiones, destacando el Pacífico (83 %), Valles de Oriente (80 %), Norte (66 %), Bocacosta (63 %), Caribe (61 %), Franja Transversal del Norte (61 %) y Altiplano Central (60 %), lo que indica un incremento significativo de las lluvias hacia finales del mes.

En contraste, la región de Occidente presenta una distribución más temprana y relativamente más equilibrada, con un máximo en la semana 2 (37 %) y una menor concentración en la semana 4 (42 %). Asimismo, aunque algunas regiones como Bocacosta y Pacífico muestran aportes moderados en semanas intermedias, la semana 3 presenta en general una contribución mínima en casi todas las regiones, evidenciando una transición hacia el establecimiento más marcado de las lluvias al final del periodo.

Cuadro 2: Distribución porcentual de la lluvia por semana para cada región climática durante mayo de 2026

Región Climática	Semana 1 (%)	Semana 2 (%)	Semana 3 (%)	Semana 4 (%)
Norte	4	14	15	66
Franja Transversal del Norte	12	23	4	61
Pacífico	2	15	1	83
Bocacosta	12	25	0	63
Valles de Oriente	10	7	4	80
Occidente	15	37	6	42
Altiplano Central	14	23	3	60
Caribe	13	20	7	61

¹Datos de ENACTS y Pronóstico de Precipitación NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.

Temperatura

La figura 4a presenta el mapa de pronóstico de temperatura media promedio para el mes de mayo de 2026 en el que se distinguen **las regiones con temperaturas medias más bajas, siendo estas: Occidente y Altiplano Central, con valores que oscilan entre 13°C y 23°C en promedio**. En las regiones con tonos naranjas oscuro y rojos se esperan temperaturas medias promedio entre 22°C y 32° C. En la **figura 4b** se muestra el pronóstico de anomalía de temperatura media. Se esperan anomalías de temperatura ligeramente por abajo del promedio climatológico (entre -0.5°C y -1.00°C), en la mayor parte del país. En contraste, en algunos sectores de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Quetzaltenango, San Marcos y Retalhuleu podrían presentarse anomalías positivas (entre 0.5 °C y 3 °C).

Referente a la temperatura máxima, en la **figura 5a** se muestra el mapa de pronóstico de temperatura máxima promedio para el mes de mayo de 2026 , en donde se observa que **las regiones más cálidas esperadas son Petén, Caribe, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico, donde las temperaturas máximas oscilan entre 28°C y 38° C**. En las regiones con tonos naranja se espera que las temperaturas oscilen entre 18°C y 29°C. La **figura 5b** muestra el mapa de pronóstico de anomalía de temperatura máxima donde se observan anomalías abajo del promedio (entre -0.5 °C y -2 °C) en la mayor parte del país, a excepción de algunos sectores de los departamentos de Huehuetenango, Totonicapán, Chimaltenango, Escuintla, Quetzaltenango, Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz donde podrían presentarse anomalías positivas (entre 0.5 °C y 3 °C).




Figura 4: Mapas de pronóstico de temperatura media promedio utilizando la metodología NextGen. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de NextGen², 2026.

²Datos de ENACTS y Pronóstico de Temperatura Media NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.




Figura 5: Mapas de pronóstico de temperatura máxima promedio utilizando la metodología NextGen. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de NextGen, 2026.³

Los valores promedio pronosticados hacen referencia a los valores más probables de las temperatura media y máxima en el mes. Aunque también es posible que se presenten valores por arriba o por debajo de estos.


Como referencia para el mes de mayo, en el **cuadro 3** se presentan datos del pronóstico de temperaturas media promedio y máxima promedio según la metodología NextGen y los registros absolutos de temperatura máxima durante el periodo climatológico 1991-2020 en las estaciones de INSIVUMEH. En cuanto a la temperatura media, **resaltan las regiones de la Franja Transversal del Norte, Altiplano Central y Occidente con los promedios más bajos**. Estos valores se enuncian como una referencia de algunos de los lugares más frescos para el mes de mayo.

Referente a la temperatura máxima, **resalta la estación de Zacapa que registró una temperatura máxima para el mes de mayo de 44°C en el año 1998**. En Flores, municipio de Petén, se registró una temperatura máxima de 42.6°C en el año 2003. Estos valores se enuncian como una referencia de algunos de los lugares más cálidos para el mes de mayo.

³Datos de ENACTS y Pronóstico de Temperatura Máxima NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.

Cuadro 3: Pronóstico de temperaturas media promedio y máxima promedio según modelos NextGen para el mes de mayo de 2026 y registro de temperatura máxima absoluta en el mes de mayo según climatología 1991-2020.

Región Climática	Zona de Interés	Temperatura Media	Temperatura Máxima	
		Pronóstico Promedio (°C)	Pronóstico Promedio (°C)	Registro Absoluto (°C) (año)
Altiplano Central	Guatemala	20 - 23	25 - 28	33.9 (1999)
	Sololá	13 - 20	18 - 25	26.0 (2001)
Bocacosta	Retalhuleu	27 - 28	33 - 34	39.8 (1998)
	Escuintla	22 - 27	27 - 33	35.7 (1998)
Caribe	Puerto Barrios	28 - 29	32 - 33	39.2 (2010)
	Lívingston	28 - 30	33 - 34	41.5 (1998)
Franja Transversal del Norte del Norte	Cobán	22 - 23	28 - 29	35.6 (1998)
	Nebaj	17 - 21	24 - 28	32.0 (2006)
Occidente	Huehuetenango	18 - 21	24 - 28	33.6 (1998)
	Quetzaltenango	14 - 16	21 - 23	27.6 (2016)
Pacífico	San José	28 - 29	34 - 35	39.2 (2011)
	Champerico	29 - 30	34	37.4 (2019)
Norte	Flores	28 - 29	34 - 35	42.6 (2003)
	Poptún	25 - 26	31 - 33	36.6 (2013)
Valles de Oriente	Esquipulas	22 - 26	29 - 33	36.2 (1998)
	Zacapa	29 - 32	35 - 38	44.0 (1998)



Fuente: INSIVUMEH, 2026

Es importante señalar que los valores consignados en la columna de registro absoluto corresponden a la **temperatura máxima absoluta observada durante el mes de mayo dentro del período climatológico de referencia 1991–2020**. En consecuencia, estos registros representan los valores extremos documentados únicamente a partir de la información disponible en ese intervalo temporal y no deben interpretarse como máximos absolutos históricos fuera de dicho período.

Temporada Ciclónica

La temporada ciclónica inicia el 15 de mayo en la cuenca del Pacífico y el 1 de junio en la cuenca del Atlántico. El pronóstico de actividad ciclónica se actualiza a lo largo de la temporada. En este documento se presenta la última actualización del pronóstico (30 de abril de 2026) para la cuenca del Atlántico y la última actualización (30 de abril de 2026) para la cuenca del Pacífico Oriental según el consenso de los integrantes del Foro del Clima de América Central.

En el **cuadro 4** se observa que, para la cuenca del Atlántico Norte se espera una temporada ligeramente menos activa que el promedio. Para la temporada se podrían formar de 11 a 15 tormentas (de un promedio de 14), 4 a 7 huracanes (de un promedio de 7) y de 1 a 3 huracanes mayores (de un promedio de 3).

En el caso del Pacífico Oriental, se espera una temporada cercana o ligeramente más activa que el promedio. Para la temporada se espera la posible formación de 16 a 20 tormentas nombradas (de un promedio de 15) de las cuales de 8 a 10 podrían ser Huracanes (de un promedio de 8) y de estas entre 3 a 5 (de un promedio de 4), podrían convertirse en huracanes mayores.

Cuadro 4: Pronóstico de la temporada ciclónica. Se describen los parámetros de la temporada ciclónica para las cuencas del Atlántico Norte y del Pacífico Oriental. *El conteo de ciclones tropicales corresponde al total registrado en toda la cuenca del Atlántico Norte y del Pacífico Oriental, independientemente de si estos sistemas afectaron o no el territorio nacional.*

Cuenca	Parámetro	Promedio 1991-2020	Pronóstico 2026	Observado al 30 de Abr 2026	Resto de la temporada
Atlántico Norte	Tormentas nombradas	14	11-15	–	11-15
	Huracanes	7	4-7	–	4-7
	Huracanes mayores	3	1-3	–	1-3
Pacífico Oriental	Tormentas nombradas	15	16-20	–	16-20
	Huracanes	8	8-10	–	8-10
	Huracanes mayores	4	3-5	–	3-5

Fuente:Foro del Clima de América Central.

Recomendaciones

- A las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tomar en cuenta la información proporcionada en este documento para la planificación y ejecución de sus actividades.
- Al sector gestión de riesgos:
 - Prevenir a la población sobre la posibilidad de altas temperaturas, en especial en las regiones Norte, Caribe, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico.
 - Considerar las lluvias que pueden presentarse en la cadena volcánica puesto que pueden favorecer la presencia de lahares.
 - Mantenerse alerta y considerar posibles eventos de inundaciones y deslizamientos originados por las lluvias durante el mes de mayo.
- Al sector salud:
 - Hacer un llamado a la población a evitar el estancamiento de agua innecesario, con el fin de disminuir la proliferación de vectores transmisores de enfermedades.
- A la población en general:
 - Mantenerse hidratados y protegerse de los rayos del sol, en especial entre las 11:00 y 15:00 horas, debido a que a estas horas se alcanzan usualmente los máximos de temperatura en el día y los rayos ultravioleta son más fuertes.
- Al sector agropecuario:
 - Al MAGA, emitir recomendaciones oportunas para fortalecer y prevenir al sector agropecuario ante las condiciones meteorológicas y climáticas presentadas en esta perspectiva.
 - Tomar en cuenta las recomendaciones emitidas para cada departamento del país en los boletines agroclimáticos elaborados por las Mesas Técnicas Agroclimáticas.
- A todos los sectores:
 - Se recomienda dar seguimiento a los boletines climatológicos, meteorológicos, sísmicos, vulcanológicos e hidrológicos emitidos por INSIVUMEH. Para consultar las perspectivas climáticas mensuales publicadas a inicio de cada mes ingrese al siguiente enlace:

<https://insivumeh.gob.gt/boletinesaplicaciones/>