

The following table is from “Note on the spectral lines of hydrogen” by J. J. Balmer dated 1885. Numerical values are wavelengths in units of  $10^{-10}$  meter.

Investigator	$H_\alpha$	$H_\beta$	$H_\gamma$	$H_\delta$	$H_\epsilon$	$H_\zeta$	$H_\eta$	$H_\vartheta$	$H_\iota$
Van der Willigen	6565.6	4863.94	4342.80	4103.8	—	—	—	—	—
Angstrom	6562.10	4860.74	4340.10	4101.2	—	—	—	—	—
Mendenhall	6561.62	4860.16	—	—	—	—	—	—	—
Mascart	6560.7	4859.8	—	—	—	—	—	—	—
Ditscheiner	6559.5	4859.74	4338.60	4100.0	—	—	—	—	—
Huggins	—	—	—	—	—	3887.5	3834	3795	3767.5
Vogel	—	—	—	—	3969	3887	3834	3795	3769 <sup>†</sup>

(<sup>†</sup>The value given in the paper is 6769 which is an obvious typo.)

Using the above data, Balmer found the following formula for wavelength  $\hat{y}$ .

$$\hat{y} = \frac{m^2}{m^2 - 2^2} \times 3645.6 \times 10^{-10} \text{ meter}$$

Parameter  $m$  is from the following table.

	$H_\alpha$	$H_\beta$	$H_\gamma$	$H_\delta$	$H_\epsilon$	$H_\zeta$	$H_\eta$	$H_\vartheta$	$H_\iota$
$m =$	3	4	5	6	7	8	9	10	11

The modern value for the model coefficient is

$$\frac{4}{R_H} = 3647.05 \times 10^{-10} \text{ meter}$$

where

$$R_H = 1.09677576 \times 10^7 \text{ meter}^{-1}$$