

Apunts Àlgebra

Gerard Cosp Lores

September 9, 2026

Índex

1	Definicions Bàsiques d'Àlgebra	2
2	Matrius	2
3	Espais Vectorials	2

1 Definicions Bàsiques d'Algebra

D'aquí en endavant anomenem a qualsevol cos **K**, un cos és aquella llista d'elements que tenen dues operacions bàsiques $(K, +, \cdot)$ on (al contrari que els anells) pots dividir $\forall k \in K - 0$

- $+ : K \times K \rightarrow K$
 $(k_1, k_2) \mapsto k_1 + k_2$
- $\cdot : K \times K \rightarrow K$
 $(k_1, k_2) \mapsto k_1 \cdot k_2$

Aquestes operacions compleixen les seves **propietats habituals** a $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$

K amb +

- **Associativa**; $k_1 + (k_2 + k_3) = (k_1 + k_2) + k_3$
- **Commutativa**; $k_1 + k_2 = k_2 + k_1$
- **Element neutre**; $(0) \ k_i + 0 = k_i$
- **Element oposat**; $\forall k, \exists \bar{k} \mid k + \bar{k} = 0$

K amb ·

- **Associativa**; $k_1 \cdot (k_2 \cdot k_3) = (k_1 \cdot k_2) \cdot k_3$
- **Commutativa**; $k_1 \cdot k_2 = k_2 \cdot k_1$
- **Element neutre**; $(1) \ k_i \cdot 1 = k_i$
- **Element oposat**; $\forall k, \exists k^{-1} \mid k \cdot k^{-1} = 1$

Com a cossos tenim per exemple $f(x), \mathbb{R}, \mathbb{Q}, F_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ on en l'últim només existeix 0, 1 on $1 + 1 = 0$.

Anomenem **grup abelià** aquell cos que permet una operació que commuta com $(K, +), (K, \cdot) \dots$. Un conjunt de dos operacions és un **anell** per exemple $\mathbb{R} = (K, +, \cdot)$

2 Matrius

3 Espais Vectorials

Fixem E-espai vectorial (**E-ev**)

Idea: Cos on es pot dur a terme **suma i multiplicació per escalar** de manera $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$ i ànalogament $\lambda(a_1, b_1) = (\lambda a_1, \lambda b_1), \lambda \in \mathbb{R}$.

- $+ E \times E \rightarrow E$

$$(\vec{e}_1, \vec{e}_2) \mapsto \vec{e}_1 + \vec{e}_2 \text{ (complint, Associativa, Commutativa)}$$

$$\exists \vec{0}_e \mid \vec{e} + \vec{0}_e = \vec{e}, \forall \vec{e} \in E$$

$$\exists \vec{e} \mid \vec{e} + \vec{e} = \vec{0}_e, \forall \vec{e} \in E$$

- $\cdot \lambda K \times E \rightarrow E$

$$(k, \vec{e}) \mapsto k \cdot \vec{e}$$

$$- (a_k b)_E \cdot u = a_k \cdot (b_E u)$$

$$- (a + b)_E \cdot u = a_E \cdot u + b_E \cdot u$$

$$- a_E(u + v) = a_E \cdot u + a_E \cdot v$$

$$- 1_E \cdot u = u$$

On es satisà que $u, v \in E$ i $a, b \in K$