

Corrigé du Soutien n°2 : annale de l'interrogation 1 du 2 mars 2022

Exercice 2 *Position d'un fil élastique suspendu*

On travaille dans le plan \mathbb{R}^2 . Deux points fixés P et Q du plan sont connectés par une chaîne constituée de n (n élément de \mathbb{N}^*) masses reliées par un élastique. Chaque masse a une masse m , et la constante d'élasticité du fil est $K > 0$. L'énergie potentielle de la chaîne comporte des termes d'élasticité et des termes de gravité. Au total, pour une chaîne avec n masses placées aux points A_i de coordonnées (x_i, y_i) , i dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, l'énergie potentielle est donnée par l'expression

$$\frac{K}{2} \sum_{i=0}^n \|A_{i+1} - A_i\|^2 + mg \sum_{i=1}^n y_i, \quad (1)$$

avec la convention $A_0 = P$ et $A_{n+1} = Q$ et où $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne usuelle. On suppose que la chaîne ne rencontre aucun obstacle. On peut représenter tout cela par le dessin de la Figure 1. On cherche à déterminer la position d'équilibre de la chaîne (au sens position de chaque points A_i pour i élément de $\llbracket 1, n \rrbracket$) qui minimise l'énergie potentielle.

Dans toute la suite, on considère le cas particulier où $n = 2$ et les points $P = (0, 1)$ et $Q = (1, 0)$. On notera donc $A_0 = P$, $A_3 = Q$ et A_1 et A_2 représentent les emplacements des deux masses dont on cherche la position.

1. En notant (x_i, y_i) les coordonnées de A_i pour i appartenant à $\{1, 2\}$ exprimer l'énergie potentielle (1) comme une fonction qui dépend des variables (x_1, x_2, y_1, y_2) élément de \mathbb{R}^4 , $\mathcal{E} : (x_1, x_2, y_1, y_2) \in \mathbb{R}^4 \mapsto \mathcal{E}(x_1, x_2, y_1, y_2) \in \mathbb{R}$ et montrer que pour tout u de \mathbb{R}^4 :

$$\mathcal{E}(u) = \frac{K}{2} \langle Au, u \rangle + \langle b, u \rangle + K, \quad (2)$$

où

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad (3)$$

et

$$b = \begin{pmatrix} 0 \\ -K \\ mg - K \\ mg \end{pmatrix}. \quad (4)$$

En déduire que \mathcal{E} est une fonctionnelle quadratique.

On a :

$$\begin{aligned} & \frac{K}{2} \sum_{i=0}^2 \|A_{i+1} - A_i\|^2 + \sum_{i=1}^2 y_i, \\ &= \frac{K}{2} [((x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2) + ((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2) + ((x_3 - x_2)^2 + (y_3 - y_2)^2)] + mg(y_1 + y_2) \\ &= \frac{K}{2} [((x_1 - 0)^2 + (y_1 - 1)^2) + ((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2) + ((1 - x_2)^2 + (0 - y_2)^2)] + mg(y_1 + y_2) \\ &= \frac{K}{2} [(x_1^2 + y_1^2 - 2y_1 + 1) + (x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + y_1^2 + y_2^2 - 2y_1y_2) + (x_2^2 - 2x_2 + 1 + y_2^2)] + mg(y_1 + y_2) \\ &= \frac{K}{2} [2x_1^2 + 2x_2^2 + 2y_1^2 + 2y_2^2 - 2x_1x_2 - 2y_1y_2 - 2x_2 - 2y_1 + 2] + mg(y_1 + y_2) \\ &= \frac{K}{2} [2x_1^2 + 2x_2^2 + 2y_1^2 + 2y_2^2 - 2x_1x_2 - 2y_1y_2] + \left[\frac{K}{2} (-2x_2 - 2y_1) + mg(y_1 + y_2) \right] + \frac{K}{2} \times 2, \end{aligned}$$

ce que l'on peut mettre sous la forme (2)–(4) annoncée.

On a :

$$\mathcal{E}(u) = \frac{1}{2} \langle \tilde{A}u, u \rangle - \langle \tilde{b}, u \rangle + K, \quad (5)$$

où

$$\tilde{A} = KA \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R}), \quad \tilde{b} = -b \in \mathbb{R}^4, \quad (6)$$

la fonctionnelle \mathcal{E} est ainsi quadratique d'après le Cours.

- 2. Écrire le problème d'optimisation considéré, préciser la/les variable/s d'optimisation et la fonction coût et donner les caractéristiques usuelles du problème d'optimisation.**

On prend $V = \mathbb{R}^4$.

La fonction coût est \mathcal{E} .

Le problème d'optimisation est le suivant : trouver $(x_1^*, x_2^*, y_1^*, y_2^*)$ de V qui minimise \mathcal{E} sur V , c'est-à-dire :

$$\mathcal{E}(x_1^*, x_2^*, y_1^*, y_2^*) = \min_{(x_1, x_2, y_1, y_2) \in V} \mathcal{E}(x_1, x_2, y_1, y_2).$$

Les variables d'optimisation sont les nombres réels x_1, x_2, y_1 et y_2 ou encore la variable d'optimisation

$$u = (x_1, x_2, y_1, y_2) \in \mathbb{R}^4.$$

- 3. Montrer que \mathcal{E} est α -convexe et déterminer $\alpha > 0$. Indication : on pourra par exemple montrer que pour tout $w = (w_1, w_2, w_3, w_4)$ élément de \mathbb{R}^4 , $\langle Aw, w \rangle = \|w\|^2 + (w_1 - w_2)^2 + (w_3 - w_4)^2$.**

On a :

$$\begin{aligned} \langle Aw, w \rangle &= [2w_1^2 + 2w_2^2 + 2w_3^2 + 2w_4^2 - 2w_1w_2 - 2w_3w_4] \\ &= [(w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 + w_4^2) + (w_1^2 + w_2^2 - 2w_1w_2) + (w_3^2 + w_4^2 - 2w_3w_4)] \\ &= \|w\|^2 + (w_1 - w_2)^2 + (w_3 - w_4)^2 \\ &\geq \|w\|^2. \end{aligned}$$

- La Hessienne de la fonctionnelle quadratique \mathcal{E} en (a_0, b_0, c_0, d_0) est : $\text{Hess } \mathcal{E}(a_0, b_0, c_0, d_0) = KA$. Comme $\langle Aw, w \rangle \geq \|w\|^2$, on a : $\langle \text{Hess } \mathcal{E}(a_0, b_0, c_0, d_0)w, w \rangle \geq K\|w\|^2$, c'est-à-dire \mathcal{E} est K -convexe.

- 4. Montrer que le problème de minimisation admet un unique point de minimum.**

- On a : $V = \mathbb{R}^4$. La fonction $\mathcal{E} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe \mathcal{C}^2 . D'après la question 3., la fonction \mathcal{E} est K -convexe, donc \mathcal{E} est infinie à l'infini c'est-à-dire : $\lim_{\|w\| \rightarrow +\infty} \mathcal{E}(w) = +\infty$. Comme $V = \mathbb{R}^4$ est un ensemble fermé et non vide de \mathbb{R}^4 , il existe au moins un point de minimum.

- $V = \mathbb{R}^4$ est un ensemble convexe. Puisque \mathcal{E} est K -convexe, elle est strictement convexe sur V , et elle admet au plus point de minimum pour \mathcal{E} .

- Finalement, \mathcal{E} admet un unique point de minimum sur $V = \mathbb{R}^4$.

- 5. Résoudre ce problème d'optimisation. Représenter ensuite sur un dessin la configuration de l'élastique au point de minimum en prenant $m = g = K = 1$.**

Soit $w^* = (w_1, w_2, w_3, w_4)$, l'unique point de minimum de \mathcal{E} . La condition d'optimalité s'écrit :

$$\begin{aligned} \nabla \mathcal{E}(w^*) = \nabla \mathcal{E}(w_1, w_2, w_3, w_4) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff KA w + b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff KA w = -b \\ &\iff \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \end{pmatrix} = -\frac{1}{K} \begin{pmatrix} 0 \\ -K \\ mg - K \\ mg \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} 2w_1 - w_2 = 0, \\ -w_1 + 2w_2 = 1, \\ 2w_3 - w_4 = 0, \\ -w_3 + 2w_4 = -1 \end{cases} \\ &\iff w_1 = \frac{1}{3}, \quad w_2 = \frac{2}{3}, \quad w_3 = -\frac{1}{3}, \quad w_4 = -\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

6. Vérifiez si l'algorithme de gradient à pas optimal converge pour cette fonctionnelle.

- La fonctionnelle \mathcal{E} est \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}^4 .
- La fonctionnelle \mathcal{E} est K -convexe sur \mathbb{R}^4 .
- Soient $u = (u_1, u_2, u_3, u_4)$ et $v = (v_1, v_2, v_3, v_4)$ des éléments de \mathbb{R}^4 . On a :

$$\begin{aligned}
 \|\nabla\mathcal{E}(u) - \nabla\mathcal{E}(v)\| &= \|((KAu) + b) - ((KAv) + b)\| = \|(KAu) - (KAv)\| \\
 &= \|KAu - KAv\| \\
 &= K \|A(u - v)\| \\
 &= K \left\| \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 - v_1 \\ u_2 - v_2 \\ u_3 - v_3 \\ u_4 - v_4 \end{pmatrix} \right\| \\
 &= K \left\| \begin{pmatrix} 2(u_1 - v_1) - (u_2 - v_2) \\ -(u_1 - v_1) + 2(u_2 - v_2) \\ 2(u_3 - v_3) - (u_4 - v_4) \\ -(u_3 - v_3) + 2(u_4 - v_4) \end{pmatrix} \right\|
 \end{aligned}$$

puis

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{K^2} \|\nabla\mathcal{E}(u) - \nabla\mathcal{E}(v)\|^2 &= (2(u_1 - v_1) - (u_2 - v_2))^2 + (-(u_1 - v_1) + 2(u_2 - v_2))^2 + (2(u_3 - v_3) - (u_4 - v_4))^2 \\
 &\quad + (-(u_3 - v_3) + 2(u_4 - v_4))^2 \\
 &\leq [4(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + 2((u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2)] \\
 &\quad + [(u_1 - v_1)^2 + 4(u_2 - v_2)^2 + 2((u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2)] \\
 &\quad + [4(u_3 - v_3)^2 + (u_4 - v_4)^2 + 2((u_3 - v_3)^2 + (u_4 - v_4)^2)] \\
 &\quad + [(u_3 - v_3)^2 + 4(u_4 - v_4)^2 + 2((u_3 - v_3)^2 + (u_4 - v_4)^2)] \\
 &= [6(u_1 - v_1)^2 + 3(u_2 - v_2)^2] + [3(u_1 - v_1)^2 + 6(u_2 - v_2)^2] \\
 &\quad + [6(u_3 - v_3)^2 + 3(u_4 - v_4)^2] + [3(u_3 - v_3)^2 + 6(u_4 - v_4)^2] \\
 &= 9[(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2 + (u_4 - v_4)^2] \\
 &= 9\|u - v\|^2
 \end{aligned}$$

ensuite

$$\frac{1}{K^2} \|\nabla\mathcal{E}(u) - \nabla\mathcal{E}(v)\|^2 \leq 9\|u - v\|^2 \iff \|\nabla\mathcal{E}(u) - \nabla\mathcal{E}(v)\| \leq 3K\|u - v\|,$$

où nous avons utilisé : $2XY \leq X^2 + Y^2$, pour tout (X, Y) de \mathbb{R}^2 . L'algorithme de gradient à pas optimal converge ainsi pour tout u_0 donné dans \mathbb{R}^4 .