




hoy la **h**istoria
de la **disfunción**
eréctil tiene
un **mejor final.**



Permita que su
paciente mejore
significativamente
la **función eréctil**
con **menos**
eventos adversos.



heleeva[®]
Lodenafilo

Te lleva **al verdadero final feliz.**






Se calcula que las cifras de **hombres con disfunción eréctil (DE) en México** pueden alcanzar un:

33.8% en edades entre los **18 a 40 años**.¹

55% en mayores de **40 años**.²



Se reconoce que dentro de los **factores de riesgo que pueden favorecer la DE** se encuentran:¹


La diabetes *mellitus*, la hipertensión arterial, la obesidad, el tabaquismo, la dislipidemia, la depresión y la vida sedentaria.



Conocer las **causas fisiopatológicas de la DE** ayuda a evaluar los **factores de riesgo modificables**:³



Índice internacional de función eréctil simplificado (IIEF*), en pacientes con diferentes causas fisiopatológicas.³



Adaptado de: Tang Z, et al. *BMC Urology*. 2014;14:52.


*IIEF: International Index of Erectile Function.

Hasta **59.2%** de las causas de DE son de origen **psicógeno**, seguido por **causas orgánicas** que representan el otro **40.8%**.³





Índice internacional de función eréctil simplificado (IIEF*),
en pacientes con diferentes causas fisiopatológicas.³



Adaptado de: Tang Z, et al. *BMC Urology*. 2014;14:52.

***IIEF**: International Index of Erectile Function.



Los inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa 5 (PDE-5) como **Helleva®** logra **mejoran significativamente la calidad de vida** de los pacientes con **DE**.⁴



Helleva® al **inhibir la hidrólisis del GMPc** en los cuerpos cavernosos.^{5,6}

- ⬆ **Relaja** el músculo liso
- ⬆ **Aumenta** el flujo sanguíneo
- ⬆ **Facilita** la erección



Con una vida media de tan sólo 2.63 horas, **Helleva®** **tiene confirmado un perfil de eficacia satisfactorio**.⁷

Está demostrado que **Helleva®** **favorece la capacidad para mantener la erección**.⁷

Helleva® tiene una **eficacia de hasta 80%** para mejorar el inicio del encuentro sexual.⁷



Adecuado perfil de seguridad demostrado en pacientes latinos.⁷



Perfil de seguridad




Helleva® no presenta alteraciones cardiovasculares clínicamente significativas, incluso en pacientes con DM*.^{3,4}


*DM: diabetes mellitus.



Por su seguridad, **Helleva® no está contraindicado con el alcohol.⁶**




Perfil farmacocinético del alcohol y lodenafilo, después de la administración de 160 mg de carbonato de lodenafilo en ayunas y con alcohol.



Adaptado de: Silva A, et al. Arq Bras Cardiol. 2010;94(2):152-158.

Aun con el consumo de alcohol, **Helleva® mantiene un satisfactorio perfil de eficacia y seguridad.⁴**

Helleva® ha demostrado, en los pacientes con DE, mínimos y autolimitados efectos secundarios.⁹




helleva®
Lodenafilo

Te lleva al verdadero final feliz.



Perfil farmacocinético del alcohol y lodenafilo, después de la administración de 160 mg de carbonato de lodenafilo en ayunas y con alcohol.



Adaptado de: Silva A, *et al.* *Arq Bras Cardiol.* 2010;94(2):152-158.



Novedosa formulación



Helleva® muestra **efectos adversos mínimos y autolimitados**.⁹

⌈ Por su **novedosa formulación en dímero**, **Helleva®** proporciona dos **moléculas de lodenafilo**.^{4,7}

⌈ Que actúan como un **profármaco**.⁴

⌈ Que después de su ingesta, al **romperse la molécula**, favorece su **acción específica** en los cuerpos cavernosos.^{7,9}

*IPDE-5: inhibidores de la fosfodiesterasa 5.



El manejo con un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 5 como **Helleva®** es el **tratamiento de primera línea** en la mayoría de las categorías de la **disfunción eréctil**.⁹

⌈ **Helleva®** no provoca erecciones **sin un estímulo sexual**.⁶

⌈ **Helleva®** es un tratamiento oral, **eficaz en pacientes con DE**.^{7,9}



helleva®
Lodenafilo

Te lleva **al verdadero final feliz**.



Dosis:⁶

Una tableta de 80 mg vía oral
una hora antes de la relación sexual.

⌆ **No** esta **contraindicado**
con el consumo de **alcohol**.⁴

⌆ **Adecuado** perfil de seguridad,
efectos secundarios mínimos
y autolimitados.⁹

⌆ **Favorece** la capacidad
para mantener la **erección**.⁷

⌆ **Mejora** hasta **80%**
el inicio del **encuentro sexual**.⁷

 **PROBIOMED**, S.A. de C.V.
La BIOfarmacéutica de México

helleva[®]
Lodenafilo

Te lleva al verdadero final feliz.



Referencias:

01. González E, Villeda C, Sotomayor M, *et al.* Prevalencia de disfunción eréctil en una muestra de población joven en México. *Rev Mex Urol.* 2012;72(5):245-249. **02.** Ugarte F, Barroso J. Prevalencia de disfunción eréctil en México y factores de riesgo asociados. *Rev Mex Urol.* 2001;61(2):63-76. **03.** Tang Z, Li D, Zhang X, *et al.* Comparison of the simplified International Index of Erectile Function (IIEF-5) in patients of erectile dysfunction with different pathophysiologies. *BMC Urology.* 2014;14:52. **04.** Silva A, Toffoletto O, Galvao L, *et al.* Repercusión cardiovascular, con y sin alcohol, del carbonato de lodenafila, un nuevo inhibidor de la PDE5. *Arq Bras Cardiol.* 2010;94(2):152-158. **05.** Codevilla C, Lemos A, Delgado L, *et al.* Development and validation of a stability-indicating LC method for the assay of lodenafil carbonate in tablets. *J Chromatogr Sci.* 2011;49(7):502-7. **06.** Helleva® información para prescribir. **07.** Glina S, Fonseca G, Bertero E, *et al.* Efficacy and tolerability of lodenafil carbonate for oral therapy of erectile dysfunction: a phase III clinical trial. *J Sex Med.* 2010;7(5):1928-36. **08.** Andersson K. Mechanisms of penile erection and basis for pharmacological treatment of erectile dysfunction. *Pharmacol Rev.* 2011;63(4):811-59. **09.** Glina S, Toscano I, Gomatzky C, *et al.* Efficacy and tolerability of lodenafil carbonate for oral therapy in erectile dysfunction: a phase II clinical trial. *J Sex Med.* 2009;6(2):553-7. **10.** Eardley I, Mirone V, Montorsi F, *et al.* An open-label, multicentre, randomized, crossover study comparing sildenafil citrate and tadalafil for treating erectile dysfunction in men naïve to phosphodiesterase 5 inhibitor therapy. *BJU Int.* 2005;96(9):1323-32.

Reg. No. 114M2014SSAIV

Material para uso exclusivo de la fuerza de ventas.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx Para mayor información del producto o para reportar sospechas de reacción adversa comuníquese al teléfono en la ciudad de México 4040-7671 o LADA nacional sin costo al 01800-200-0170 o por correo electrónico a: farmacovigilancia@probiomed.com.mx

helleva
Lodenafilo

Te lleva al verdadero final feliz.