# הכנה למבחן המסכם

מצגת בקורס "מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות"

מרצה: פרופ. גרא וייס

# שאלות מהמבחן לדוגמה מספר 6

11. **(30 נק')** תהא $F \col \mathbb{N} \to \mathbb{N}$. נגדיר יחס שקילות מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$:

$$\langle A, B \rangle \in E \iff F[A] = F[B]$$

**(א)** **(10 נק')** הוכיחו שקיימות לפחות 2 מחלקות שקילות ב-$\mathcal{P}(\mathbb{N})/E$.

**(ב)** **(10 נק')** מבלי להסתמך על טענות שהוכחו בכיתה, הוכיחו ש-$F$ חח"ע אם ורק אם $E = Id_{\mathcal{P}(\mathbb{N})}$.

**(ג)** **(10 נק')** הוכיחו שאם $F$ על אז $\mathcal{P}(\mathbb{N})/E \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

# פתרון: סעיף א' - קיום מחלקות שקילות

**הוכחה שקיימות לפחות 2 מחלקות שקילות:**

- נתבונן בשתי קבוצות: $\emptyset$ ו-$\mathbb{N}$.
- התמונה של הקבוצה הריקה היא תמיד ריקה:

$$F[\emptyset] = \{F(x) \mid x \in \emptyset\} = \emptyset$$

- התמונה של $\mathbb{N}$ היא הטווח של הפונקציה (או התמונה שלה):

$$F[\mathbb{N}] = \{F(x) \mid x \in \mathbb{N}\} \neq \emptyset$$

(כי הטווח הוא $\mathbb{N}$ שאינה ריקה, והפונקציה מלאה).

- לערך כלשהו $y \in F[\mathbb{N}]$ (למשל $F(0)$) אין מקור ב-$\emptyset$, לכן הקבוצות שונות.
- קיבלנו $F[\emptyset] \neq F[\mathbb{N}]$, כלומר $\langle \emptyset, \mathbb{N} \rangle \notin E$.
- מכאן ש-$[\emptyset]_E \neq [\mathbb{N}]_E$, כלומר קיימות לפחות שתי מחלקות שקילות שונות.

# פתרון: סעיף ב' - חח"ע וזהות

**צ"ל: $F$ חח"ע** $\iff E = Id_{\mathcal{P}(\mathbb{N})}$

$\impliedby$ **כיוון ראשון:** נניח $F$ חח"ע. נוכיח $E = Id$.

- יהיו $A, B \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ כך ש-$\langle A, B\rangle \in E$,
- כלומר $F[A] = F[B]$.
- נוכיח $A = B$:
  - יהי $x \in A$. אזי $F(x) \in F[A]$.
  - מכיוון ש-$F[A] = F[B]$, אזי $F(x) \in F[B]$.
  - כלומר, קיים $y \in B$ כך ש-$F(x) = F(y)$.
  - מכיוון ש-$F$ חח"ע, נובע ש-$x = y$. לכן $x \in B$.
- הראינו $A \subseteq B$. באותו אופן $B \subseteq A$. לכן $A = B$.

$\implies$ **כיוון שני:** נניח $E = Id$. נוכיח $F$ חח"ע.

- נניח בשלילה ש-$F$ לא חח"ע.
- אזי קיימים $x \neq y$ כך ש-$F(x) = F(y)$.
- נגדיר יחידונים $A = \{x\}$ ו-$B = \{y\}$.
- $F[A] = \{F(x)\} = \{F(y)\} = F[B]$. לכן $\langle A, B\rangle \in E$.
- אבל $A \neq B \implies \{x\} \neq \{y\} \implies x \neq y$.
- קיבלנו זוג ב-$E$ שאינו ב-$Id$. סתירה.

# פתרון: סעיף ג' - עוצמת המנה

**נתון:** $F$ על. **צ"ל:** $\mathcal{P}(\mathbb{N})/E \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

- נגדיר העתקה $\Phi : \mathcal{P}(\mathbb{N})/E \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ע"י $\Phi([A]_E) = F[A]$.
- **הגדרה היטב:** אם $[A] = [B]$ אז $\langle A, B\rangle \in E$, לכן $F[A] = F[B]$. הערך תלוי רק במחלקה.
- **חח"ע:** נניח $\Phi([A]) = \Phi([B])$. אזי $F[A] = F[B]$. לפי הגדרת היחס, $\langle A, B\rangle \in E$, משמע $[A] = [B]$.
- **על:** תהי $Y \subseteq \mathbb{N}$ (תת-קבוצה בטווח).
  - נגדיר $A = F^{-1}[Y] = \{n \in \mathbb{N} \mid F(n) \in Y\}$.
  - נחשב את $\Phi([A]) = F[A] = F[F^{-1}[Y]]$.
  - תמיד מתקיים $F[F^{-1}[Y]] \subseteq Y$.
  - מכיוון ש-$F$ **על**, לכל $y \in Y$ קיים מקור $x$ כך ש-$F(x) = y$, ולכן $y \in F[F^{-1}[Y]]$.
  - סה"כ $F[A] = Y$, כלומר $\Phi([A]) = Y$.
- לסיכום: $\Phi$ הפיכה, ולכן הקבוצות שוות עוצמה.

# שאלה 12

**שאלה 12:**

**(א)** (10 **נק'**) הוכיחו שלכל קבוצות $A, B, C$ אם $B \cap C = \emptyset$ אז $A^B \times A^C \sim A^{B \cup C}$.

**(ב)** (10 **נק'**) הוכיחו שקיימת חלוקה $D$ של $\mathbb{N}$ כך ש-$D \sim \mathbb{N}$ ולכל $T \in D, T \sim \mathbb{N}$.

# פתרון: סעיף א' - אריתמטיקה של עוצמות

**צ"ל:** $A^B \times A^C \sim A^{B \cup C}$ **בהינתן** $B \cap C = \emptyset$.

- נגדיר פונקציה \Phi \col A^B \times A^C \to A^{B \cup C}.
- האיברים ב-$A^B \times A^C$ הם זוגות סדורים $\langle f, g \rangle$, באשר f \col B \to A ו-g \col C \to A.
- נגדיר את התמונה $h = \Phi(\langle f, g \rangle)$ כפונקציה h \col B \cup C \to A באופן הבא:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & x \in B \\ g(x) & x \in C \end{cases}$$

- **הגדרה היטב:** מכיוון ש-$B \cap C = \emptyset$, כל $x \in B \cup C$ נמצא בדיוק באחת מהקבוצות, לכן $h(x)$ מוגדר היטב ויחיד.
- **חח"ע:** נניח $\Phi(\langle f_1, g_1 \rangle) = \Phi(\langle f_2, g_2 \rangle)$. אז $h_1 = h_2$.
  - לכל $x \in B$, $f_1(x) = h_1(x) = h_2(x) = f_2(x)$, לכן $f_1 = f_2$.
  - לכל $x \in C$, $g_1(x) = h_1(x) = h_2(x) = g_2(x)$, לכן $g_1 = g_2$.
  - מכאן $\langle f_1, g_1 \rangle = \langle f_2, g_2 \rangle$.
- **על:** תהי $h \in A^{B \cup C}$. נגדיר $f = h|_B$ ו-$g = h|_C$. בבירור $\Phi(\langle f, g \rangle) = h$.
- מצאנו פונקציה הפיכה, לכן הקבוצות שוות עוצמה.

# פתרון: סעיף ב' - חלוקה אינסופית של הטבעיים

**צ"ל: קיימת חלוקה $D$ של $\mathbb{N}$ כך ש-$|D| = \aleph_0$ ולכל $T \in D$, $|T| = \aleph_0$.**

- נשתמש בפונקציית הזיווג של קנטור (או כל פונקציה הפיכה אחרת) $J \colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$.
- האוסף $\{\{k\} \times \mathbb{N} \mid k \in \mathbb{N}\}$ הוא חלוקה של $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. (כל זוג סדור שייך בדיוק לשורה אחת $k$).
- נגדיר את קבוצות החלוקה $T_k$ כתמונות של השורות הללו תחת $J$:

$$T_k = \{J(k, n) \mid n \in \mathbb{N}\}$$

- נגדיר את החלוקה $D = \{T_k \mid k \in \mathbb{N}\}$.
- **תכונות:**
  1. מכיוון ש-$J$ הפיכה, החלוקה במישור מועתקת לחלוקה ב-$\mathbb{N}$.
  2. עוצמת החלוקה: הפונקציה $k \mapsto T_k$ היא חח"ע, לכן $|D| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$.
  3. עוצמת האיברים: לכל $k$, הפונקציה $n \mapsto J(k, n)$ היא חח"ע ועל מ-$\mathbb{N}$ ל-$T_k$. לכן $|T_k| = \aleph_0$.

# שאלה 13

**שאלה 13:** יהי $R$ יחס מעל קבוצה $A$ ונסמן $T = \{S \subseteq A \times A \mid S \text{ טרנזיטיבי} \wedge R \subseteq S\}$.

**(א) (10 נק')** הוכיחו מבלי להסתמך על טענות שהוכחו בכיתה ש-$\bigcap T \in T$.

**(ב) (20 נק')** נגדיר בצורה אינדוקטיבית יחסים מעל $A$ לכל $i \in \mathbb{N}$:

- $R_0 = R$
- $R_{i+1} = R_i \cup \{\langle x, y\rangle \mid \exists z(\langle x, z\rangle \in R_i \wedge \langle z, y\rangle \in R_i)\}$

הוכיחו ש-$\bigcap T = \bigcup\{R_i \mid i \in \mathbb{N}\}$.

# פתרון: סעיף א' - סגור טרנזיטיבי

**צ"ל:** $\bigcap T \in T$. כלומר, עלינו להוכיח כי חיתוך הקבוצות ב-$T$ הוא יחס טרנזיטיבי ושהוא מכיל את $R$.

1. **מכיל את $R$:**
   - לכל $S \in T$, מתקיים $R \subseteq S$ (לפי הגדרת $T$).
   - לכן $R \subseteq \bigcap \{S \mid S \in T\} = \bigcap T$.

2. **טרנזיטיביות:**
   - יהיו $\langle x, y\rangle \in \bigcap T$ ו-$\langle y, z\rangle \in \bigcap T$.
   - משמעות הדבר היא שלכל $S \in T$, $\langle x, y\rangle \in S$ וגם $\langle y, z\rangle \in S$.
   - מכיוון שכל $S \in T$ הוא יחס טרנזיטיבי, נובע כי $\langle x, z\rangle \in S$ לכל $S \in T$.
   - לכן $\langle x, z\rangle \in \bigcap T$.
   - כלומר, היחס $\bigcap T$ הוא טרנזיטיבי.

**מסקנה:** $\bigcap T \in T$.

# פתרון: סעיף ב' - איחוד אינדוקטיבי (חלק 1)

**נסמן** $R^* = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} R_i$. **צ"ל:** $R^* = \bigcap T$.

**כיוון 1:** $\bigcap T \subseteq R^*$

- נוכיח כי $R^* \in T$ (כלומר טרנזיטיבי ומכיל את $R$). אם כן, אז $\bigcap T \subseteq R^*$ לפי הגדרת החיתוך (כי $\bigcap T$ מוכל בכל איבר ב-$T$).
- **הכלה:** $R = R_0 \subseteq \bigcup R_i = R^*$.
- **טרנזיטיביות:**
  - נניח $\langle x,y\rangle \in R^*$ ו-$\langle y,z\rangle \in R^*$.
  - אזי קיימים $i,j$ כך ש-$\langle x,y\rangle \in R_i$ ו-$\langle y,z\rangle \in R_j$.
  - נסמן $k = \max(i,j)$. כיוון שזו סדרה עולה של קבוצות ($R_n \subseteq R_{n+1}$), אזי הזוגות נמצאים ב-$R_k$.
  - לפי הגדרת $R_{k+1}$, אם יש "מסלול" ב-$R_k$, הזוג $\langle x,z\rangle$ מתווסף ל-$R_{k+1}$.
  - לכן $\langle x,z\rangle \in R_{k+1} \subseteq R^*$.
- לסיכום $R^* \in T$, ולכן $\bigcap T \subseteq R^*$.

# פתרון: סעיף ב' - איחוד אינדוקטיבי (חלק 2)

**כיוון 2:** $R^* \subseteq \bigcap T$

- עלינו להראות שלכל $S \in T$, מתקיים $R^* \subseteq S$.
- מספיק להראות שלכל $i$, $R_i \subseteq S$ (כי אז האיחוד מוכל ב-$S$).
- נוכיח באינדוקציה על $i$:
  - **בסיס ($i = 0$):** $R_0 = R$. נתון $R \subseteq S \implies S \in T$. מתקיים.
  - **צעד ($i \to i+1$):** נניח $R_i \subseteq S$.
    - יהי $\langle x, y \rangle \in R_{i+1}$.
    - אפשרות א': $\langle x, y \rangle \in R_i$. מהנחת האינדוקציה, ב-$S$.
    - אפשרות ב': קיים $z$ כך ש-$\langle x, z \rangle \in R_i$ ו-$\langle z, y \rangle \in R_i$.
    - מהנחת האינדוקציה, $\langle x, z \rangle \in S$ ו-$\langle z, y \rangle \in S$.
    - מכיוון ש-$S$ טרנזיטיבי, $\langle x, y \rangle \in S$.
  - לכן $R_{i+1} \subseteq S$.
- מכאן $R^* \subseteq S$ לכל $S \in T$, ולכן $R^* \subseteq \bigcap T$.

# שאלה 14

**שאלה 14:** (32 נק') יהיו $A$ ו-$B$ קבוצות ותהא $f \col A \to B$. נגדיר הפונקציה הבאה: $g \col \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(A)$ כך שלכל $Y \in \mathcal{P}(B)$,

$$g(Y) = f^{-1}[Y]$$

**(א)** (16 **נק'**) הוכיחו ש-$f$ על $B$ אמ"מ $g$ חח"ע.

**(ב)** (16 **נק'**) הוכיחו ש-$f$ חח"ע אמ"מ $g$ על $\mathcal{P}(A)$.

# פתרון: סעיף א' - העתקות מושרות (חלק 1)

**צ"ל: $f$ על $\iff$ $g$ חח"ע.**

**$\Longleftarrow$ כיוון ראשון:** נניח $f$ על. נראה ש-$g$ חח"ע.

- יהיו $Y_1, Y_2 \subseteq B$ כך ש-$g(Y_1) = g(Y_2)$.
- כלומר $f^{-1}[Y_1] = f^{-1}[Y_2]$.
- נפעיל את תמונת $f$ על שני האגפים: $f[f^{-1}[Y_1]] = f[f^{-1}[Y_2]]$.
- מכיוון ש-$f$ **על**, לכל $Y \subseteq B$ מתקיים $f[f^{-1}[Y]] = Y$:
  - תמיד $f[f^{-1}[Y]] \subseteq Y$.
  - מצד שני, אם $y \in Y$, קיים $x$ כך ש-$f(x) = y$ (כי $f$ על).
  - לכן $x \in f^{-1}[Y]$ ולכן $y \in f[f^{-1}[Y]]$.
- לכן קיבלנו $Y_1 = Y_2$.
- כלומר $g$ חח"ע.

**$\Longrightarrow$ כיוון שני:** נניח $g$ חח"ע. נראה ש-$f$ על.

- נניח בשלילה ש-$f$ אינה על. אזי קיים $y \in B \setminus \mathrm{Im}(f)$.
- נגדיר $Y_1 = \{y\}$ ו-$Y_2 = \emptyset$.
- $g(Y_1) = f^{-1}[\{y\}]$. מכיוון ש-$y$ אינו בתמונה, אין $x$ כך ש-$f(x) = y$, לכן $f^{-1}[\{y\}] = \emptyset$.
- $g(Y_2) = f^{-1}[\emptyset] = \emptyset$.
- קיבלנו $g(Y_1) = g(Y_2) = \emptyset$, אך $Y_1 \neq Y_2$.
- סתירה לכך ש-$g$ חח"ע. לכן $f$ על.

# פתרון: סעיף ב' - העתקות מושרות (חלק 2)

**צ"ל: $f$ חח"ע $\iff$ $g$ על.**

$\impliedby$ **כיוון ראשון**: נניח $f$ חח"ע. נראה ש-$g$ על $\mathcal{P}(A)$.

- תהי $X \subseteq A$. עלינו למצוא $Y \subseteq B$ כך ש-$g(Y) = X$.
- נסמן $Y = f[X] = \{f(x) \mid x \in X\}$.
- נחשב את $g(Y) = f^{-1}[f[X]]$.
- מכיוון ש-$f$ **חח"ע**, לכל קבוצה $X \subseteq A$ מתקיים $f^{-1}[f[X]] = X$:
  - תמיד $X \subseteq f^{-1}[f[X]]$.
  - מצד שני, אם $z \in f^{-1}[f[X]]$, אז $f(z) \in f[X]$.
  - כלומר $f(z) = f(x)$ עבור $x \in X$.
  - מכיוון ש-$f$ חח"ע, $z = x \in X$.
- לכן $g(Y) = X$.
- כלומר לכל $X$ יש מקור, אז $g$ על.

$\implies$ **כיוון שני**: נניח $g$ על. נראה ש-$f$ חח"ע.

- נניח בשלילה ש-$f$ אינה חח"ע. אזי קיימים $x_1 \neq x_2$ כך ש-$f(x_1) = f(x_2) = y$.
- נתבונן בקבוצה $X = \{x_1\}$.
- מכיוון ש-$g$ על, קיים $Y \subseteq B$ כך ש-$g(Y) = X$, כלומר $f^{-1}[Y] = \{x_1\}$.
- אם $y \in Y$: אז $x_1 \in f^{-1}[Y]$ וגם $x_2 \in f^{-1}[Y]$ (כי $f(x_2) = y$). אבל $f^{-1}[Y]$ מכילה רק את $x_1$. סתירה ($x_1 \neq x_2$).
- אם $y \notin Y$: אז $x_1 \notin f^{-1}[Y]$ (כי $f(x_1) = y$). סתירה לכך ש-$f^{-1}[Y] = \{x_1\}$.
- בכל מקרה קיבלנו סתירה, לכן $f$ חח"ע.

# שאלה: סכום סדרים (40 נקודות)

7. (40 **נקודות**)**הגדרה:** נגדיר סכום של קס"חים: יהיו $\langle A, R\rangle, \langle B, S\rangle$ קס"חים. נגדיר את הסכום $\langle A, R\rangle \oplus \langle B, S\rangle = \langle C, T\rangle$ כאשר: $C = (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times B)$ ו-$T$ מוגדר כך:

$$T = \{(\langle 0, x\rangle, \langle 0, y\rangle) \mid xRy\} \cup \{(\langle 1, x\rangle, \langle 1, y\rangle) \mid xSy\} \cup \{(\langle 0, x\rangle, \langle 1, y\rangle) \mid x \in A \wedge y \in B\}$$

**(א)** (20 **נקודות**) הראו שאם $\langle A, R\rangle, \langle B, S\rangle$ קבוצות סדורות קווית, אז $\langle C, T\rangle$ קבוצה סדורה קווית.

**(ב)** (20 **נקודות**) הראו: גם $(\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}}) \cong (\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}}) \oplus (\{0\}, \{(0,0)\})$ וגם $(\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}}) \ncong (\{0\}, \{(0,0)\}) \oplus (\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}})$

# פתרון: סכום סדרים (חלק א)

1. **סדר חלקי:**
   - **רפלקסיביות:** יהי $z \in C$.
     - אם $z = \langle 0, x \rangle$: כיוון ש-$R$ רפלקסיבי, $xRx$, ולכן $zTz$.
     - אם $z = \langle 1, y \rangle$: כיוון ש-$S$ רפלקסיבי, $ySy$, ולכן $zTz$.
   - **אנטי-סימטריות:** נניח $uTv$ ו-$vTu$.
     - אם $u, v \in \{0\} \times A$: אז $u = \langle 0, x \rangle, v = \langle 0, y \rangle$. מהגדרת $T$, $xRy$ ו-$yRx$. מ-$R$ אנטי-סימטרי $u = v \implies x = y \implies$ .
     - אם $u, v \in \{1\} \times B$: כנ"ל לפי $S$, נקבל $u = v$.
     - מקרה מעורב (אחד מ-$\{0\} \times A$ והשני מ-$\{1\} \times B$): לא ייתכן שיתקיים גם $uTv$ וגם $vTu$, כי מהגדרת $T$ כל איברי צד 0 קטנים מצד 1, אך אין זוגות שבהם צד 1 קטן מצד 0.
   - **טרנזיטיביות:** נניח $uTv$ ו-$vTw$.
     - אם $u, v, w \in \{0\} \times A$: נובע מטרנזיטיביות $R$.
     - אם $u, v, w \in \{1\} \times B$: נובע מטרנזיטיביות $S$.
     - אם $u \in \{0\} \times A$ ו-$w \in \{1\} \times B$: לפי הגדרת $T$ (האיחוד השלישי), מתקיים $uTw$ באופן מיידי (כי כל איבר מ-0 קטן מכל איבר מ-1), ללא תלות ב-$v$.
     - שאר המקרים אינם אפשריים (למשל $u \in \{1\}, v \in \{0\}$ סותר את $uTv$).
2. **השוואת איברים (לינאריות):** יהיו $u, v \in C$ שונים.
   - אם $u, v \in \{0\} \times A$: נסמן $u = \langle 0, x \rangle, v = \langle 0, y \rangle$. כיוון ש-$R$ מלא, $xRy$ או $yRx$. לכן $uTv$ או $vTu$.
   - אם $u, v \in \{1\} \times B$: כנ"ל לפי $S$.
   - אם אחד מ-$u, v$ ב-$A \times \theta$ והשני ב-$B \times 1$: נניח ללא הגבלת הכלליות $u \in \{0\} \times A$ ו-$v \in \{1\} \times B$. לפי הגדרת $T$ (האיחוד השלישי), מתקיים $uTv$.
   - לכן כל שני איברים ניתנים להשוואה, ו-$T$ הוא סדר קווי.

# פתרון: סכום סדרים (חלק ב)

**חלק ב': איזומורפיזם**

1. **הוכחה ש-**$(\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}}) \cong (\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}}) \oplus (\{0\}, \{(0,0)\})$:

   - נסמן $C = (\{0\} \times \{0\}) \cup (\{1\} \times \mathbb{N})$.
   - נגדיר פונקציה $f : C \to \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$f(z) = \begin{cases} 0 & z = \langle 0, 0 \rangle \\ n+1 & z = \langle 1, n \rangle \end{cases}$$

   - **חח"ע ועל:** ברור כי $f$ מעתיקה את האיבר היחיד מ-$0$-ל-$0$, ואת היתר מזיזה ב-$1$, לכן היא הפיכה.
   - **שומרת סדר:**
     - עבור זוגות בתוך צד 1: $n < m \iff n+1 < m+1$.
     - עבור הזוג המעורב: $\langle 0, 0 \rangle$ קטן מכל איבר ב-$\langle 1, n \rangle$ (לפי הגדרת הסכום). ואכן $0 < n+1$ לכל $n \in \mathbb{N}$.
     - סה"כ האיזומורפיזם מתקיים.

2. **הוכחה ש-**$(\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}}) \ncong (\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}}) \oplus (\{0\}, \{(0,0)\})$:

# יחסים ותכונותיהם

**שאלה:** עבור כל אחד מהיחסים הבאים (המוגדרים מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ או $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\}$), קבעו אילו תכונות הוא אילו תכונות הוא מקיים:

- רפלקסיביות,סימטריות,טרנזיטיביות,אנטי-סימטריות

**היחסים:**

1. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_1B \iff A \cap B = \emptyset$ (זרות)
2. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\}$: $AR_2B \iff \min(A) = \min(B)$ (שוויון מינימום)
3. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_3B \iff |A| \leq |B|$ (השוואת עוצמות)
4. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\}$: $AR_4B \iff \min(A) > \min(B)$ (סדר מינימום חזק)
5. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_5B \iff 1 \in A \cap B$ (חיתוך מכיל 1)
6. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_6B \iff A \subseteq B$ (הכלה)
7. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_7B \iff A \cap B \neq \emptyset$ (חיתוך לא ריק)
8. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_8B \iff A \cup B = \mathbb{N}$ (כיסוי)
9. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_9B \iff A \times B = \emptyset$ (מכפלה קרטזית ריקה)
10. מעל $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_{10}B \iff |A \cap B| < \aleph_0$ (חיתוך סופי)

# פתרון: תכונות יחסים (חלק 1)

1. $AR_1B \iff A \cap B = \emptyset$

- **רפלקסיבי: לא**. (למשל $A = \{1\}$, $A \cap A \neq \emptyset$).
- **סימטרי: כן**. ($A \cap B = B \cap A$).
- **טרנזיטיבי: לא**. ($A = \{1\}, B = \{2\}, C = \{1\}$). $AR_1B$ ו-$BR_1C$ אבל לא $AR_1C$).
- **אנטי-סימטרי: לא**. ($\{1\}R_1\{2\}$ ו-$\{2\}R_1\{1\}$ אך שונים).

2. $AR_2B \iff \min(A) = \min(B)$

- **רפלקסיבי: כן**. השוויון הוא יחס שקילות.
- **סימטרי: כן**.
- **טרנזיטיבי: כן**.
- **אנטי-סימטרי: לא**. ($\{1,2\}R_2\{1,3\}$ אך שונות).
- **שקילות**: כן, זהו יחס שקילות.

# פתרון: תכונות יחסים (חלק 2)

3. $AR_3B \iff |A| \leq |B|$

- **רפלקסיבי: כן**.
- **סימטרי: לא**. (אם גדלים שונים).
- **טרנזיטיבי: כן**. (מעבר ב-$\leq$).
- **אנטי-סימטרי: לא**. ($\{1\}$ ו-$\{2\}$ שוות עוצמה ויוצרות זוגות הפוכים).

4. $AR_4B \iff \min(A) > \min(B)$

- **רפלקסיבי: לא**. ($x > x$ שקר).
- **סימטרי: לא**.
- **טרנזיטיבי: כן**.
- **אנטי-סימטרי: כן** (באופן ריק). לעולם לא יתקיים שניהם, אז התנאי "אם גם וגם אז שווים" מתקיים תמיד.

# פתרון: תכונות יחסים (חלק 3)

5. $AR_5B \iff 1 \in A \cap B$

- **רפלקסיבי: לא** (עבור קבוצות שלא מכילות את 1). **כן** אם מרחב הדיון היה מוגבל לקבוצות המכילות את 1.
- **סימטרי: כן**.
- **טרנזיטיבי: כן**.
  - אם $ARB$ אז $1 \in A$ ו-$1 \in B$.
  - אם $BRC$ אז $1 \in B$ ו-$1 \in C$.
  - מכאן ש-$1 \in A$ ו-$1 \in C$ ולכן $1 \in A \cap C$, כלומר $ARC$.
- **אנטי-סימטרי: לא**.

6. $AR_6B \iff A \subseteq B$

- **רפלקסיבי: כן**.
- **סימטרי: לא**.
- **טרנזיטיבי: כן**.
- **אנטי-סימטרי: כן**. (זהו יחס סדר חלקי קלאסי).

# פתרון: תכונות יחסים (חלק 4)

7. $AR_7B \iff A \cap B \neq \emptyset$

- **רפלקסיבי: לא**. ($\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$). **כן** עבור קבוצות לא ריקות.
- **סימטרי: כן**.
- **טרנזיטיבי: לא**. ($A = \{1,2\}, B = \{2,3\}, C = \{3,4\}$ - יש חיתוך, אך $A \cap C = \emptyset$).
- **אנטי-סימטרי: לא**.

8. $AR_8B \iff A \cup B = \mathbb{N}$

- **רפלקסיבי: לא**. ($A \cup A = A \neq \mathbb{N}$ לכל קבוצה חלקית ממש). **כן** רק עבור $A = \mathbb{N}$.
- **סימטרי: כן**.
- **טרנזיטיבי: לא**. ($A = \{1\}^c, B = \{1\}, C = \{1\}^c$. $A \cup B = \mathbb{N}, B \cup C = \mathbb{N}$, אך $A \cup C = A \neq \mathbb{N}$).
- **אנטי-סימטרי: לא**.

# פתרון: תכונות יחסים (חלק 5)

9. $AR_9B \iff A \times B = \emptyset$

- **משמעות:** שקול לכך ש-$A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.
- **רפלקסיבי: לא**. ($A \times A \neq \emptyset$ לכל לא ריקה). מתקיים רק לריקה.
- **סימטרי: כן**. ($B = \emptyset \vee A = \emptyset \iff A = \emptyset \vee B = \emptyset$).
- **טרנזיטיבי: לא** (בזהירות). אם $A = \{1\}, B = \emptyset, C = \{1\}$. אז $ARB$ ו-$BRC$. אך $A \times C \neq \emptyset$.
- **אנטי-סימטרי: לא**.

10. $AR_{10}B \iff |A \cap B| < \aleph_0$

- **רפלקסיבי: לא**. (אם $A$ אינסופית, חיתוך עם עצמה הוא אינסופי). **כן** עבור קבוצות סופיות.
- **סימטרי: כן**.
- **טרנזיטיבי: לא**. $A = C = \mathbb{N}, B = \emptyset$.
- **אנטי-סימטרי: לא**.

# שאלה: יחס שקילות המושרה ע"י פונקציה

**שאלה:** נגדיר פונקציה $f : \mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$ על ידי הכלל:

$$f(x) = \{n \in \mathbb{N} \mid 2^{n-1} \leq x\}$$

נגדיר יחס $T$ על $\mathbb{N}$ על ידי הכלל:

$$xTy \iff f(x) = f(y)$$

**ענו על הבאים:**

א. הוכיחו כי $T$ יחס שקילות על $\mathbb{N}$.

ב. הוכיחו שלכל $n$ טבעי מתקיים:

$$[2^n]_T = \{m \in \mathbb{N} \mid 2^n \leq m < 2^{n+1}\}$$

(כאשר $[2^n]_T$ היא מחלקת השקילות של המספר $2^n$).

# פתרון: יחס שקילות המושרה ע"י פונקציה

### א. הוכחה ש-$T$ יחס שקילות:

- זהו יחס המושרה על ידי שוויון פונקציות (Kernel equivalence).
- **רפלקסיביות:** לכל $x$, $f(x) = f(x)$ ולכן $xTx$.
- **סימטריות:** אם $xTy$ אזי $f(x) = f(y)$, אז $f(y) = f(x)$ ולכן $yTx$.
- **טרנזיטיביות:** אם $xTy$ ו-$yTz$, אזי $f(x) = f(y)$ ו-$f(y) = f(z)$, מכאן $f(x) = f(z)$ ולכן $xTz$.

### ב. חישוב מחלקת השקילות $[2^n]_T$:

$[2^n] \subseteq \{m \in \mathbb{N} \mid 2^n \leq m < 2^{n+1}\}$:

- יהי $m \in \{m \in \mathbb{N} \mid 2^n \leq m < 2^{n+1}\}$, כלומר $2^n \leq m < 2^{n+1}$.
- לכל $k \leq n+1 : m$, $2^{k-1} \leq 2^n \leq m$, ולכן $\{0, ..., n+1\} \subseteq f(m)$.
- לכל $k \geq n+2 : m$, $2^{k-1} \geq 2^{n+1} > m$, ולכן $k \notin f(m)$.
- קיבלנו $f(m) = \{0, ..., n+1\} = f(2^n)$, ולכן $m \in [2^n]$.

$\{m \in \mathbb{N} \mid 2^n \leq m < 2^{n+1}\} \subseteq [2^n]$:

- יהי $m \in [2^n]_T$, כלומר $f(m) = f(2^n) = \{0, ..., n+1\}$.
- בפרט $n+1 \in f(m)$, כלומר $2^n \leq m \iff 2^{(n+1)-1} \leq m$
- בנוסף $n+2 \notin f(m)$, כלומר $2^{n+1} > m \iff 2^{(n+2)-1} > m$
- סה"כ $2^n \leq m < 2^{n+1}$, ולכן $m \in \{m \in \mathbb{N} \mid 2^n \leq m < 2^{n+1}\}$

# שאלה: יחסי סדר על פונקציות

**שאלה:** תהי $(Y, \leq)$ קבוצה סדורה חלקית (קס"ח). נסמן $A = Y^X$. נגדיר שני יחסים על $A$:

1. **יחס "לכל"**: $f R_1 g \iff \forall x \in X (f(x) \leq g(x))$
2. **יחס "קיים"**: $f R_2 g \iff \exists x \in X (f(x) \leq g(x))$

הוכיחו או הפריכו: היחסים $R_1, R_2$ הם יחסי סדר חלקי על $A$.


# פתרון: יחסי סדר על פונקציות

**1. יחס "לכל" ($R_1$): זהו יחס סדר חלקי.**

- **רפלקסיביות**: לכל $x$, $f(x) \leq f(x)$ ולכן $fR_1f$.
- **אנטי-סימטריות**: אם $\forall x(f(x) \leq g(x))$ ו-$\forall x(g(x) \leq f(x))$, אז מאנטי-סימטריות ב-$Y$, לכל $x$ מתקיים $f(x) = g(x)$, כלומר $f = g$.
- **טרנזיטיביות**: נניח $fR_1g$ ו-$gR_1h$.
  - אזי לכל $x$: $f(x) \leq g(x)$ וגם $g(x) \leq h(x)$.
  - מטרנזיטיביות ב-$Y$ נקבל שלכל $x$: $f(x) \leq h(x)$.
  - לכן $fR_1h$.

**2. יחס "קיים" ($R_2$): אינו יחס סדר חלקי.**

- **רפלקסיביות**: מתקיימת (כי קיים $x$ כלשהו, למשל אם $X \neq \emptyset$).
- **אנטי-סימטריות: לא מתקיימת.**
  - דוגמא נגדית: $X = \{1, 2\}, Y = \mathbb{N}$, $f(1) = g(2) = 2$, $f(2) = g(1) = 1$.
  - $f(1) \leq g(1)$ ו-$g(2) \leq f(2)$ ולכן $fR_2g$ ו-$gR_2f$, אך $f \neq g$.
- **טרנזיטיביות: לא מתקיימת.**
  - **דוגמא נגדית**: $X = \{1, 2\}, Y = \mathbb{N}$.
  - $f(1) = f(2) = 2$, $g(1) = 3, g(2) = 1$, $h(1) = 1, h(2) = 1$
  - $fR_2g$ (אינדקס 1: $f(1) \leq g(1)$).
  - $gR_2h$ (אינדקס 2: $g(2) \leq h(2)$).
  - **אבל** לא $fR_2h$: $f(1) > h(1)$ ו-$f(2) > h(2)$.



# שאלה: יחס סדר על פונקציות

**שאלה:** נגדיר יחס על $A = \{0,1,2\}^{\mathbb{N}}$ כך: $fRg$ אמ"מ

$$(f = g) \vee (\forall n \in \mathbb{N}(f(n) = f(n)g(n)))$$

**ענו על הבאים:**

א. הוכיחו ש-$R$ יחס סדר על $A$.

ב. מצאו את כל האיברים המקסימליים והאיברים המינימליים בקבוצה $A$ עם היחס $R$.

ג. הוכיחו/הפריכו: היחס $R$ הוא יחס סדר לינארי/קווי על $A$.

# פתרון: יחס סדר על פונקציות

**א. הוכחה ש-$R$ יחס סדר:**

- **רפלקסיביות:** נתון בהגדרה ($f = g$).
- **אנטי-סימטריות:** נניח $fRg$ ו-$gRf$. אם $f = g$ סיימנו. אחרת, $\forall n(f(n) = f(n)g(n))$ וגם $g(n) = g(n)f(n)$. מכיוון שהכפל חילופי, $f(n) = f(n)g(n) = g(n)f(n) = g(n)$, לכן $f = g$.
- **טרנזיטיביות:** נניח $fRg$ ו-$gRh$. אם אחד מהזוגות זהים, סיימנו. אחרת, $\forall n(f(n) = f(n)g(n))$ וגם $g(n) = g(n)h(n)$. ע"י הצבה ואסוציאטיביות הכפל: $f(n) = f(n)g(n) = f(n)(g(n)h(n)) = (f(n)g(n))h(n) = f(n)h(n)$, כלומר $fRh$.

**ב. מינימום ומקסימום:**

- **מינימום:** הפונקציה הקבועה $\vec{0}$ (כי $0$ הוא המינימום ברכיבים). זוהי המינימלית היחידה.
- **מקסימום:** הפונקציה הקבועה $\vec{1}$ (כי $1$ הוא המקסימום ברכיבים). זוהי המקסימלית היחידה.

| $x \setminus y$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 0 | □ | □ | □ |
| 1 | □ | □ | □ |
| 2 | □ | □ | □ |

**ג. לינאריות:**

- **הפרכה:** $R$ אינו לינארי.
- ניקח $f = (2, 0, 0, \dots)$ ו-$g = (0, 2, 0, \dots)$.
- $f(0) = 2 > 0 = g(0)$ (לפי סדר הרכיבים), לכן לא ייתכן $fRg$.
- $g(1) = 2 > 0 = f(1)$ (לפי סדר הרכיבים), לכן לא ייתכן $gRf$.

# שאלה: סדר על פונקציות לקבוצות

**שאלה:** תהי $A = \mathcal{P}(\mathbb{N})^{\mathbb{N}}$ קבוצת הפונקציות מ-$\mathbb{N}$ ל-$\mathcal{P}(\mathbb{N})$. נגדיר יחס $R$ על $A$ על ידי: $\forall n \in \mathbb{N}(f(n) \subseteq g(n)) \iff fRg$.

**א.** הוכיחו כי $R$ הינו יחס סדר חלקי.

**ב.** האם $R$ יחס מלא (לינארי)? הוכיחו.

**ג.** האם יש איבר גדול ביותר ב-$A$? אם כן, מצאו אותו והוכיחו שהוא הגדול ביותר. אם לא, הוכיחו שאין איבר גדול ביותר.

**ד.** תהי $X = \{f \in A \mid \forall n \in \mathbb{N}(n \in f(n))\}$.

האם יש איבר קטן ביותר ב-$X$? (לפי היחס $R$). אם כן, מצאו והוכיחו. אם לא, הוכיחו.

**ה.** תהי $D = \{f \in A \mid \forall n \in \mathbb{N}(f(n) \subseteq f(n+1) \wedge f(n) \neq f(n+1))\}$. האם יש איבר קטן ביותר ב-$D$? אם כן, מצאו והוכיחו. אם לא, הוכיחו.

# פתרון: סדר על פונקציות לקבוצות (חלק 1)

**א. הוכחה ש-$R$ יחס סדר חלקי:**

- **רפלקסיביות:** לכל $n$, $f(n) \subseteq f(n)$, לכן $fRf$.
- **אנטי-סימטריות:** נניח $fRg$ ו-$gRf$.
  - אזי לכל $n$, $f(n) \subseteq g(n)$ וגם $g(n) \subseteq f(n)$.
  - מכאן שלכל $n$, $f(n) = g(n)$.
  - לכן $f = g$.
- **טרנזיטיביות:** נניח $fRg$ ו-$gRh$.
  - אזי לכל $n$, $f(n) \subseteq g(n)$ וגם $g(n) \subseteq h(n)$.
  - טרנזיטיביות ההכלה גוררת $f(n) \subseteq h(n)$.
  - לכן $fRh$.

**ב. אינו יחס מלא:**

- נפריך ע"י דוגמה נגדית:
- נגדיר $f(n) = \{1\}$ ו-$g(n) = \{2\}$ לכל $n$.
- $f(0) = \{1\} \not\subseteq \{2\} = g(0)$, לכן לא $fRg$.
- $g(0) = \{2\} \not\subseteq \{1\} = f(0)$, לכן לא $gRf$.

# פתרון: סדר על פונקציות לקבוצות (חלק 2)

### ג. איבר גדול ביותר ב-$A$:

- **קיים.** האיבר הוא הפונקציה הקבועה $M(n) = \mathbb{N}$ לכל $n$.
- **הוכחה:** תהי $f \in A$ כלשהי.
- לכל $n$, $f(n) \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ולכן $f(n) \subseteq \mathbb{N}$.
- כלומר $f(n) \subseteq M(n)$ לכל $n$.
- לכן $fRM$ לכל $f$, ו-$M$ הוא האיבר הגדול ביותר.

### ד. איבר קטן ביותר ב-$X$:

- הקבוצה $X$ מכילה את הפונוקציות ש-$n$ נמצא ב-$f(n)$.
- **קיים.** האיבר הוא $m(n) = \{n\}$.
- **הוכחה:**

1. נראה ש-$m \in X$: לכל $n$, האם $n \in m(n)$? כן, כי $m(n) = \{n\}$.
2. נראה שהוא מינימום: תהי $f \in X$ כלשהי.
3. לפי הגדרת $X$, לכל $n$ מתקיים $n \in f(n)$.
4. לכן $\{n\} \subseteq f(n)$, כלומר $m(n) \subseteq f(n)$.
5. סה"כ $mRf$ לכל $f \in X$.

# פתרון: סדר על פונקציות לקבוצות (חלק 3)

**ה. איבר קטן ביותר ב-$D$:**

- הקבוצה $D$ מכילה פונקציות שהן סדרות עולות ממש של קבוצות.
- **לא קיים.**
- **הוכחה:** נניח בשלילה שקיים איבר קטן ביותר $m \in D$.
- אזי לכל $f \in D$, מתקיים $mRf$, כלומר לכל $n$, $m(n) \subseteq f(n)$.
- בפרט, $m(n) \subseteq \bigcap\{f(n) \mid f \in D\}$.
- נבנה משפחה של פונקציות ב-$D$: לכל $k \in \mathbb{N}$, נגדיר $f_k(n) = \{k, k+1, \ldots, k+n\}$.
  - בדיקה ש-$f_k \in D$: $|f_k(n)| = n+1$ ו-$|f_k(n+1)| = n+2$, ו- $f_k(n) \subseteq f_k(n+1)$, לכן עולה ממש.
- כעת נחשב את החיתוך עבור $n$ נתון: לכל $x \in \mathbb{N}$, נבחר $k > x$. אזי $x \notin \{k, \ldots, k+n\} = f_k(n)$.
- לכן $x$ לא נמצא בחיתוך של כל ה-$f_k(n)$. החיתוך הוא ריק.
- משמע שחייב להתקיים $m(n) \subseteq \emptyset$, כלומר $m(n) = \emptyset$ לכל $n$.
- אבל אם $m(n) = \emptyset$ לכל $n$, אזי $m(n) = m(n+1)$, ולכן $m \notin D$ (סתירה לתנאי העלייה הממש).
- **מסקנה:** לא קיים איבר קטן ביותר ב-$D$.

# שאלה: אינדוקציה עם פרמטר שלם (24 נקודות)

6. (24 **נקודות**) הראו שלכל יחס טרנזיטיבי $R$ ולכל פונקציה $f$ כך ש-$\mathrm{dom}(f) = \mathbb{Z}$:

אם לכל $m \in \mathbb{Z}$ מתקיים $f(m+1)Rf(m)$,

אזי לכל $m \in \mathbb{Z}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $f(n+m+1)Rf(m)$.

# פתרון: אינדוקציה עם פרמטר

**הוכחה:** נוכיח את הטענה לכל $m \in \mathbb{Z}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ באינדוקציה על $n$ (כאשר $m$ הוא פרמטר שרירותי).

**בסיס האינדוקציה ($n = 0$):** צ"ל: לכל $m \in \mathbb{Z}$, $f(0 + m + 1)Rf(m)$, כלומר $f(m + 1)Rf(m)$. זה נתון בשאלה (ההנחה).

**צעד האינדוקציה:** נניח שהטענה נכונה עבור $n$, כלומר לכל $k \in \mathbb{Z}$ מתקיים $f(n + k + 1)Rf(k)$. נוכיח עבור $n + 1$: צ"ל לכל $m \in \mathbb{Z}$, $f((n + 1) + m + 1)Rf(m)$. כלומר נדרש להוכיח: $f(n + m + 2)Rf(m)$.

יהי $m \in \mathbb{Z}$. נסמן $k = m + 1$. גם $k \in \mathbb{Z}$. מהנתון ($m$ כללי) עבור $m$, מתקיים:

$$f(m + 1)Rf(m)$$

מהנחת האינדוקציה עבור $k$ (שהוא שלם), מתקיים $f(n + k + 1)Rf(k)$. נציב את $k = m + 1$:

$$f(n + (m + 1) + 1)Rf(m + 1) \implies f(n + m + 2)Rf(m + 1)$$

קיבלנו:

1. $f(n + m + 2)Rf(m + 1)$ (מהנחת האינדוקציה).
2. $f(m + 1)Rf(m)$ (מהנתון).

מטרנזיטיביות היחס $R$, נובע: $f(n + m + 2)Rf(m)$

הוכחנו את הצעד, ולכן הטענה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $m \in \mathbb{Z}$.

# שאלה: חוקי דה-מורגן המוכללים (25 נקודות)

7. (25 **נקודות**) הוכיחו באינדוקציה כי לכל קבוצה $B$ וקבוצה סופית של קבוצות $\mathcal{A}$ (המכילה לפחות 2 קבוצות), מתקיים:

$$B \setminus \left(\bigcap \mathcal{A}\right) = \bigcup \{(B \setminus A) \mid A \in \mathcal{A}\}$$

# פתרון: חוקי דה-מורגן המוכללים

**הוכחה באינדוקציה על $n = |\mathcal{A}|$:**

**בסיס האינדוקציה ($n = 2$):** תהי $\mathcal{A} = \{A_1, A_2\}$. אזי $\bigcap \mathcal{A} = A_1 \cap A_2$. אגף ימין הוא $(B \setminus A_1) \cup (B \setminus A_2)$. צ"ל $B \setminus (A_1 \cap A_2) = (B \setminus A_1) \cup (B \setminus A_2)$. זהו חוק דה-מורגן הסטנדרטי להפרש קבוצות.

**צעד האינדוקציה:** נניח שהטענה נכונה עבור כל אוסף של $n$ קבוצות. נוכיח עבור אוסף $\mathcal{A}$ בגודל $n+1$. נבחר איבר כלשהוא $A_0 \in \mathcal{A}$. נגדיר $\mathcal{A}' = \mathcal{A} \setminus \{A_0\}$. אזי $|\mathcal{A}'| = n$, ומתקיים $\bigcap \mathcal{A} = (\bigcap \mathcal{A}') \cap A_0$. לפי בסיס האינדוקציה (עבור 2 הקבוצות $X = \bigcap \mathcal{A}'$ ו-$Y = A_0$):

$$B \setminus (X \cap Y) = (B \setminus X) \cup (B \setminus Y)$$

נציב חזרה:

$$B \setminus \left(\bigcap \mathcal{A}\right) = \left(B \setminus \bigcap \mathcal{A}'\right) \cup (B \setminus A_0)$$

לפי הנחת האינדוקציה על $\mathcal{A}'$:

$$B \setminus \bigcap \mathcal{A}' = \bigcup \{(B \setminus A) \mid A \in \mathcal{A}'\}$$

לכן סה"כ קיבלנו:

$$\left(\bigcup \{(B \setminus A) \mid A \in \mathcal{A}'\}\right) \cup (B \setminus A_0) = \bigcup \{(B \setminus A) \mid A \in \mathcal{A}\}$$

# שאלה: עוצמת קבוצת החזקה (25 נקודות)

8. (25 **נקודות**) הוכיחו שלכל קבוצה סופית $A$, מתקיים:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

# פתרון: עוצמת קבוצת החזקה

**הוכחה באינדוקציה על גודל הקבוצה $n = |A|$:**

**בסיס האינדוקציה ($n = 0$):** הקבוצה היחידה עם 0 איברים היא $A = \emptyset$. קבוצת החזקה היא $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$. מספר האיברים ב-$\mathcal{P}(\emptyset)$ הוא 1. מתקיים $2^0 = 1$. לכן הבסיס מתקיים.

**צעד האינדוקציה:** נניח שהטענה נכונה לקבוצות בגודל $n$, ונוכיח עבור קבוצה $A$ בגודל $n + 1$. תהי $A$ קבוצה עם $n + 1$ איברים. נבחר איבר שרירותי $x \in A$. נגדיר $A' = A \setminus \{x\}$. הגודל של $A'$ הוא $n$. נחלק את תתי-הקבוצות של $A$ (האיברים ב-$\mathcal{P}(A)$) לשני סוגים זרים:

1. תתי-קבוצות ש**אינן** מכילות את $x$: אלו בדיוק תתי-הקבוצות של $A'$. לפי הנחת האינדוקציה יש $2^n$ כאלו.
2. תתי-קבוצות ש**מכילות** את $x$: כל קבוצה כזו היא מהצורה $S \cup \{x\}$ כאשר $S \subseteq A'$. יש התאמה חח"ע ועל בין אלו לבין תתי-הקבוצות של $A'$, ולכן גם כאן יש $2^n$ קבוצות.

סה"כ מספר תתי-הקבוצות הוא הסכום:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$$

# שאלה: פירוק לגורמים ראשוניים (אינדוקציה שלמה)

8. (25 **נקודות**) הוכיחו באינדוקציה שלמה: כל מספר טבעי $n \geq 2$ ניתן לכתיבה כמכפלה של מספרים ראשוניים (מספר ראשוני נחשב כמכפלה של גורם אחד).

# פתרון: פירוק לגורמים ראשוניים

**הוכחה:** נוכיח באינדוקציה שלמה על $n$. **בסיס:** עבור $n = 2$, המספר 2 הוא ראשוני, ולכן הוא מכפלה של ראשוניים (הוא עצמו). **צעד האינדוקציה:** נניח שהטענה נכונה לכל $k$ המקיים $2 \leq k < n$. נוכיח עבור $n$. נפריד למקרים:


1. אם $n$ ראשוני: סיימנו (הוא מכפלה של עצמו).
2. אם $n$ פריק: אזי קיימים $a, b \in \mathbb{N}$ כך ש-$n = a \cdot b$ וגם $1 < a, b < n$.

- מכיוון ש-$2 \leq a < n$, לפי הנחת האינדוקציה, $a$ ניתן לכתיבה כמכפלה של ראשוניים.
- מכיוון ש-$2 \leq b < n$, לפי הנחת האינדוקציה, $b$ ניתן לכתיבה כמכפלה של ראשוניים.
- לכן המכפלה שלהם $a \cdot b$ (שהיא $n$) היא מכפלה של ראשוניים. ■

# שאלה: תכונות עצים (אינדוקציה שלמה וקבוצות סופיות)

9. (25 **נקודות**) יהי $G = (V, E)$ גרף כאשר $E \subseteq V \times V$ יחס סימטרי המקיים $E \cap Id_V = \emptyset$ (ללא לולאות). נתון ש-$V$ קבוצה סופית בגודל $n$. נתון שבין כל שני צמתים $u, v \in V$ קיימת **סדרה יחידה** של צמתים $x_1, ..., x_k$ (ללא חזרות) כך ש: $x_1 = u, x_k = v$ ולכל $1 \leq i < k$ מתקיים $(x_i, x_{i+1}) \in E$. הוכיחו שבגרף זה מתקיים $|E| = 2(n-1)$.

(הדרכה: השתמשו באינדוקציה שלמה על מספר הצמתים).



# פתרון: תכונות יחסים וקבוצות סופיות

נוכיח באינדוקציה שלמה על $n$ (גודל $V$).

**בסיס:** עבור $n = 1$, הקבוצה $V = \{v\}$. היחס $E$ מקיים $E \cap I_V = \emptyset$, לכן ללא זוגות $(v, v)$, כלומר $E = \emptyset$. גודל היחס הוא 0, ואכן $2(1-1) = 0$.

**צעד האינדוקציה:** נניח שהטענה נכונה לכל גרף המקיים את התנאים עם מספר צמתים $k < n$. נוכיח עבור $n$ ($n > 1$). נבחר זוג $(u, v) \in E$ כלשהו. נגרע מ-$E$ את הזוג $(u, v)$ ואת הזוג הסימטרי $(v, u)$.

- קבוצת הצמתים $V$ מתפרקת לשתי קבוצות זרות $V_1, V_2$ שאין ביניהן קשתות:
  - נגדיר את $V_1$ כקבוצת הצמתים שיש להם מסלול ל-$u$ בגרף החדש, ואת $V_2$ כקבוצת הצמתים שיש להם מסלול ל-$v$.
  - כל צומת חייב להיות שייך לאחת הקבוצות (כי במקור היה לו מסלול ל-$u$, שחייב לעבור או לא לעבור דרך $v$).
  - הקבוצות זרות (אחרת היה מסלול בין $u$ ל-$v$).
  - אין קשתות בין הקבוצות (אחרת היה נוצר מסלול בין $u$ ל-$v$).
  - תכונת היחידות וה"קשירות" נשמרת בתוך הרכיבים.
- נסמן $|V_1| = k$ ו-$|V_2| = m$. מתקיים $k + m = n$, וגם $k, m \geq 1$.
- לפי הנחת האינדוקציה, מספר הזוגות ב-$E$ המוגבל ל-$V_1$ הוא $2(k-1)$, ול-$V_2$ הוא $2(m-1)$.
- סה"כ גודל היחס $E$ הוא סכום הזוגות בשני החלקים ועוד שני הזוגות שהסרנו:

$$|E| = 2(k-1) + 2(m-1) + 2 = 2k - 2 + 2m - 2 + 2 = 2(k+m) - 2 = 2n - 2 = 2(n-1)$$

# שאלה: אינדוקציה שלמה (ייצוג מספרים)

**תרגיל:** הוכח שניתן לייצג כל מספר טבעי $n \geq 12$ כ-$n = 4a + 5b$ עבור $a, b \in \mathbb{N}$.

# פתרון: אינדוקציה שלמה (ייצוג מספרים)

**הוכחה:** נוכיח באינדוקציה שלמה על $n$.

**הנחת האינדוקציה:** יהי $n \in \mathbb{N}, n \geq 12$. נניח שלכל $k$ המקיים $12 \leq k < n$, ניתן לייצג את $k$ כ-$k = 4a + 5b$ עבור $a, b \in \mathbb{N}$. נוכיח את הטענה עבור $n$.

**בסיס האינדוקציה (וכיסוי מקרים התחלתיים):**

- אם $n = 12$: $12 = 4 \cdot 3 + 5 \cdot 0$ (כלומר $a = 3, b = 0$).
- אם $n = 13$: $13 = 4 \cdot 2 + 5 \cdot 1$ (כלומר $a = 2, b = 1$).
- אם $n = 14$: $14 = 4 \cdot 1 + 5 \cdot 2$ (כלומר $a = 1, b = 2$).
- אם $n = 15$: $15 = 4 \cdot 0 + 5 \cdot 3$ (כלומר $a = 0, b = 3$).

# פתרון: המשך

**צעד האינדוקציה (עבור $n \geq 16$):** אם $n \geq 16$, נתבונן במספר $n-4$. שמנו לב כי $12 \leq n-4 < n$ (כי $n \geq 16$, ולכן $n-4 \geq 12$, וברור שפחות מ-$n$).

לפי הנחת האינדוקציה, קיים ייצוג עבור $n-4$:

$$n-4 = 4a' + 5b'$$

כאשר $a', b' \in \mathbb{N}$.

כעת נוסיף 4 לשני האגפים:

$$n = (n-4)+4 = (4a'+5b')+4 = 4(a'+1)+5b'$$

נסמן $a = a'+1$ ו-$b = b'$. כיוון ש-$a' \in \mathbb{N}$, גם $a \in \mathbb{N}$. כמו כן $b \in \mathbb{N}$. קיבלנו ייצוג $n = 4a+5b$ כנדרש. ■

# שאלה: עוצמות

- קבעו והוכיחו לכל קבוצה אם היא מעוצמת $\aleph_0$, $2^{\aleph_0}$ או סופית. אם היא סופית רשמו את מספר האיברים בקבוצה.
  - $A = \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$
  - $B \subseteq \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ אוסף הפונקציות **העל** מהטבעיים לקבוצה $\{0,1\}$.
  - $C \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})^{\mathbb{Q}}$ אוסף הפונקציות **ההפיכות** מהרציונליים לקבוצת החזקה של הטבעיים.
- תהי $D \subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ אוסף הפונקציות **החח"ע** מהטבעיים לטבעיים.
  - מצאו פונקציה חח"ע $h : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to D$ והוכיחו שהיא אכן חח"ע.
  - הוכיחו ש-$|D| = \aleph$.

# פתרון: עוצמות (חלק 1)

**א. חישוב עוצמות:**

i. **הקבוצה $A = \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$:**

- מתקיים $|A| = |\mathbb{Q}|^{|\mathbb{N}|} = \aleph_0^{\aleph_0}$.
- מכיוון ש-$2 \leq \aleph_0 \leq 2^{\aleph_0}$, לפי חוקי חזקות:

$$2^{\aleph_0} \leq \aleph_0^{\aleph_0} \leq (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0}$$

- לפי משפט קנטור-ברנשטיין, $|A| = 2^{\aleph_0} = \aleph$.

ii. **הקבוצה $B$ (פונקציות על):**

- $B \subseteq \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, ולכן $|B| \leq 2^{\aleph_0}$.
- מצד שני, יש רק 2 פונקציות ש**אינן** על: הפונקציה הקבועה 0 והפונקציה הקבועה 1.
- לכן $|B| = 2^{\aleph_0} - 2 = 2^{\aleph_0} = \aleph$.
- (הערה: הורדת מספר סופי מקבוצה אינסופית לא משנה את עוצמתה).

iii. **הקבוצה $C$ (פונקציות הפיכות):**

- פונקציה הפיכה היא פונקציה חח"ע ועל.
- קיימת כזו רק אם התחום והטווח שווי עוצמה.
- התחום: $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$.
- הטווח: $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0} = \aleph$.
- העוצמות שונות ($\aleph \neq \aleph_0$), ולכן לא קיימות פונקציות הפיכות ביניהן.
- הקבוצה $C$ היא הקבוצה הריקה.
- $|C| = 0$ (קבוצה סופית).

# פתרון: עוצמות (חלק 2)

**ב. הפונקציה החח"ע והעוצמה של $D$:**

i. **בניית $h : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to D$:**

- לכל סדרה בינארית $f \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, נגדיר פונקציה $g_f \in D$ (פונקציה מ-$\mathbb{N}$ ל-$\mathbb{N}$ שהיא חח"ע).
- רעיון: נמפה את $n$ למספר שמקודד גם את $n$ וגם את הערך $f(n)$. למשל $g_f(n) = 2n + f(n)$.
- מכיוון ש-$f(n) \in \{0,1\}$, המספר $2n + f(n)$ הוא פשוט $2n$ או $2n+1$.
- **בדיקה ש-$g_f$ חח"ע:** נניח $g_f(n) = g_f(m)$.
  - אזי $2n + f(n) = 2m + f(m)$.
  - מאחר ש-$f(n), f(m) \in \{0,1\}$, הזוגיות של שני האגפים נקבעת ע"י $f(n)$ ו-$f(m)$. לכן $f(n) = f(m)$.
  - נחסר אותם ונקבל $2n = 2m \implies n = m$. לכן $g_f \in D$.
- **בדיקה ש-$h$ ($f \mapsto g_f$) חח"ע:**
  - נניח $h(f_1) = h(f_2)$, כלומר הפונקציות $g_{f_1}$ ו-$g_{f_2}$ זהות.
  - לכל $n$, $g_{f_1}(n) = g_{f_2}(n)$.
  - כלומר $2n + f_1(n) = 2n + f_2(n)$.
  - נחסר $2n$ ונקבל $f_1(n) = f_2(n)$ לכל $n$.
  - לכן $f_1 = f_2$.

ii. **הוכחת $|D| = \aleph$:**

- מצד אחד, $D \subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, ולכן $|D| \leq |\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| = \aleph_0^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \aleph$.
- מצד שני, בנינו פונקציה חח"ע מ-$\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ ל-$D$.
- לכן $|D| \geq |\{0,1\}^{\mathbb{N}}| = 2^{\aleph_0} = \aleph$.
- לפי משפט קנטור-ברנשטיין, $|D| = \aleph$.

# שאלה: קבוצות ניתנות לפיצול

**הגדרה:** תהי $A$ קבוצה. נאמר ש-$A$ **ניתנת לפיצול** אם קיימת חלוקה $Q$ של $A$ כך ש-$|Q| = 2$ ולכל $X \in Q$, $X \sim A$.

**סעיפים:**

- (א) הוכיחו ש-$\mathbb{N}$ ניתנת לפיצול.
- (ב) הוכיחו: אם $A$ אינסופית, אז $\mathcal{P}(A)$ ניתנת לפיצול.
- (ג) נניח ש-$A$ ניתנת לפיצול. הוכיחו:

1. $A$ אינסופית.
2. לכל קבוצה $B$, אם $B \sim A$ אז $B$ ניתנת לפיצול.
3. לכל $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, קיימת חלוקה $Q_n$ של $A$ כך ש-$|Q_n| = n$ וגם לכל $X \in Q_n$, $X \sim A$.
4. $\mathcal{P}(A) \sim \{B \mid B \in \mathcal{P}(A) \wedge B \sim A\}$.

# פתרון: קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף א'

**א. הוכחה ש-$\mathbb{N}$ ניתנת לפיצול:**

- אנחנו צריכים למצוא חלוקה של $\mathbb{N}$ לשתי קבוצות שוות עוצמה ל-$\mathbb{N}$.
- נגדיר את קבוצת הזוגיים $E = \{2k \mid k \in \mathbb{N}\}$ ואת קבוצת אי-הזוגיים $O = \{2k+1 \mid k \in \mathbb{N}\}$.
- אלו קבוצות זרות ואיחודן הוא $\mathbb{N}$, לכן זו חלוקה $Q = \{E, O\}$ ו-$|Q| = 2$.
- ההתאמה $f(n) = 2n$ מראה ש-$E \sim \mathbb{N}$. ההתאמה $g(n) = 2n+1$ מראה ש-$O \sim \mathbb{N}$.
- לכן $\mathbb{N}$ ניתנת לפיצול.

# פתרון: קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף ב'

**ב. אם $A$ אינסופית אז $\mathcal{P}(A)$ ניתנת לפיצול:**

- נסמן $X = \mathcal{P}(A)$. כיוון ש-$A$ אינסופית, יש בה איבר $a \in A$.
- נגדיר שתי קבוצות של תתי-קבוצות:
  - $S_1 = \{B \in \mathcal{P}(A) \mid a \in B\}$ (כל הקבוצות שמכילות את $a$).
  - $S_0 = \{B \in \mathcal{P}(A) \mid a \notin B\}$ (כל הקבוצות שלא מכילות את $a$).
- ברור ש-$S_1 \cap S_0 = \emptyset$ ו-$S_1 \cup S_0 = \mathcal{P}(A)$. לכן זו חלוקה.
- **עוצמת $S_0$:** זוהי בדיוק קבוצת החזקה של $A \setminus \{a\}$. מכיוון ש-$A$ אינסופית, $A \sim A \setminus \{a\}$, ולכן $\mathcal{P}(A) \sim \mathcal{P}(A \setminus \{a\}) = S_0$.
  - **הוכחה ש-$A \sim A \setminus \{a\}$:**
    - כיוון ש-$A$ אינסופית, יש בה תת-קבוצה בת מנייה $B = \{b_0, b_1, b_2, \dots\} \subseteq A$, וניתן להניח ש-$a = b_0$.
    - נגדיר פונקציה $h : A \to A \setminus \{a\}$ כך:
    - אם $x \notin B$, אזי $h(x) = x$.
    - אם $x = b_n \in B$, אזי $h(b_n) = b_{n+1}$.
    - הפונקציה $h$ היא חח"ע ועל (הזזה של האיברים ב-$B$ באחד, וזהות בשאר). לכן $|A| = |A \setminus \{a\}|$.
- **עוצמת $S_1$:** הפונקציה $f : S_0 \to S_1$ המוגדרת ע"י $f(B) = B \cup \{a\}$ היא הפיכה (חח"ע ועל). לכן $S_1 \sim S_0 \sim \mathcal{P}(A)$.

# פתרון: קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף ג.1

**ג.1. הוכחה ש-$A$ אינסופית:**

- נתון ש-$A$ ניתנת לפיצול, כלומר קיימת חלוקה $X, Y$ כך ש-$X \cup Y = A$, $X \cap Y = \emptyset$, ו-$X \sim A, Y \sim A$.
- נניח בשלילה ש-$A$ סופית. נסמן $|A| = n$.
- אזי $|X| = n$ ו-$|Y| = n$.
- היות והן זרות, $|A| = |X| + |Y| = n + n = 2n$.
- קיבלנו $n = 2n$, שפתרונו היחיד הוא $n = 0$.
- אך אם $A = \emptyset$, לא ניתן לחלק אותה ל-2 קבוצות (יש לה רק חלוקה ריקה או טריוויאלית שלא מקיימת את התנאי $|Q| = 2$ עם חלקים שקולים לריקה, דורש חלוקה לקבוצות לא ריקות).
- סתירה. לכן $A$ אינסופית.

# פתרון: קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף ג.2

**ג.2. שימור תחת שקילות:**

- יהי $B$ כך ש-$B \sim A$. תהי $f : B \to A$ הפיכה.
- תהי $\{A_1, A_2\}$ החלוקה של $A$ המעידה על הפיצול ($A_i \sim A$).
- נגדיר $B_1 = f^{-1}[A_1]$ ו-$B_2 = f^{-1}[A_2]$.
- תכונות המקור שומרות על חיתוך ואיחוד וחח"ע, לכן $B_1, B_2$ חלוקה של $B$.
- הצמצום של $f$ הוא הפיכה מ-$B_1$ ל-$A_1$, לכן $B_1 \sim A_1$.
- מטרנזיטיביות העוצמה: $B \sim A \sim A_1 \sim B_1$. כנ"ל $B \sim B_2$.
- לכן $B$ ניתנת לפיצול.

# פתרון: קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף ג.3

**ג.3. חלוקה ל-$n$ חלקים:**

- נוכיח באינדוקציה על $n$.
- **בסיס** ($n = 1$): החלוקה $\{A\}$ תקינה. **בסיס** ($n = 2$): נתון ש-$A$ ניתנת לפיצול.
- **צעד:** נניח נכונות ל-$n$. קיימת חלוקה $\{X_1, ..., X_n\}$ כאשר $X_i \sim A$.
- ניקח את הקבוצה $X_1$. מכיוון ש-$X_1 \sim A$ ו-$A$ ניתנת לפיצול, לפי סעיף ג.2 גם $X_1$ ניתנת לפיצול.
- לכן קיימת חלוקה $\{Y, Z\}$ של $X_1$ כך ש-$Y \sim X_1 \sim A$ ו-$Z \sim X_1 \sim A$.
- נגדיר חלוקה חדשה: $Q_{n+1} = \{Y, Z, X_2, ..., X_n\}$.
- יש בה $n + 1$ קבוצות, כולן זרות (כי $Y, Z \subset X_1$ שזרה לכל השאר), וכולן שקולות ל-$A$.

# פתרון: קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף ג.4

**ג.4. עוצמת תתי-הקבוצות השקולות ל-$A$:**

- תהי $\mathcal{S} = \{B \in \mathcal{P}(A) \mid B \sim A\}$.
- ברור ש-$\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(A)$, לכן $|\mathcal{S}| \leq |\mathcal{P}(A)|$.
- נראה את הכיוון השני:
- נתונה החלוקה $A = X \cup Y$ עם $X \sim A, Y \sim A$.
- לכל תת-קבוצה $Z \subseteq Y$, נגדיר התאמה $\psi(Z) = X \cup Z$.
- הקבוצה $X \cup Z$ מכילה את $X$ ולכן $|X \cup Z| \geq |X| = |A|$. חסומה ע"י $|A|$. לכן $X \cup Z \in \mathcal{S}$.
- ההתאמה $\psi$ חח"ע: נניח $X \cup Z_1 = X \cup Z_2$.
  - נחתוך את שני האגפים עם $Y$: $(X \cup Z_1) \cap Y = (X \cup Z_2) \cap Y$
  - נשתמש בפילוג: $(X \cap Y) \cup (Z_1 \cap Y) = (X \cap Y) \cup (Z_2 \cap Y)$
  - מכיוון ש-$X \cap Y = \emptyset$ ו-$Z_1, Z_2 \subseteq Y$ (ולכן $Z_i \cap Y = Z_i$), נקבל: $\emptyset \cup Z_1 = \emptyset \cup Z_2 \implies Z_1 = Z_2$
- לכן $|\mathcal{S}| \geq |\mathcal{P}(Y)| = |\mathcal{P}(A)|$ (כי $Y \sim A$).
- משפט קנטור-ברנשטיין מסיים את ההוכחה.

# שאלה: יחסים וסדר על פונקציות

**הגדרות:**

- נסמן $A(f,g) = \{n \mid n \in \mathbb{N} \wedge f(n) > g(n)\}$.
- נגדיר יחס $R$ על $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$: $R = \{\langle f,g\rangle \mid f,g \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \wedge A(f,g) \in Fin(\mathbb{N})\}$.
- נסמן $D(f,g) = \{n \mid n \in \mathbb{N} \wedge f(n) \neq g(n)\}$.
- נגדיר יחס $R^* = \{\langle f,g\rangle \mid f,g \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \wedge D(f,g) \in Fin(\mathbb{N})\}$.

**סעיפים:**

- **(א)** הוכיחו כי $R$ קדם-סדר מעל $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ וגם $R$ אינו יס"ח מעל $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ וגם $R$ אינו יחס שקילות.
- **(ב)** הוכיחו כי לכל $f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, מתקיים $R[\{f\}] \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- **(ד)** הוכיחו כי הקבוצה $\bigcup\{\mathbb{N}^A \mid A \in Fin(\mathbb{N})\}$ היא בת מנייה.
- **(ה)** הוכיחו כי לכל $f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, מתקיים $[f]_{R^*} \sim \mathbb{N}$.
- **(ו)** הוכיחו כי קבוצת המנה $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}/R^*$ אינה בת מנייה.
- **(ז)** הוכיחו כי לכל $f,g \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, $[g]_{R^*}$ אינה עוקב מיידי של $[f]_{R^*}$ לפי היחס $\underline{R}_{R^*}$.

# פתרון: סעיף א' - תכונות היחס $R$

**1. $R$ הוא קדם-סדר (רפלקסיבי וטרנזיטיבי):**

- **רפלקסיביות**: לכל $f$, $A(f,f) = \{n \mid f(n) > f(n)\} = \emptyset$. הקבוצה הריקה היא סופית, לכן $fRf$.
- **טרנזיטיביות**: נניח $fRg$ ו-$gRh$.
  - אזי הקבוצות $K_1 = \{n \mid f(n) > g(n)\}$ ו-$K_2 = \{n \mid g(n) > h(n)\}$ סופיות.
  - נשים לב ש: $(f(n) > g(n)) \vee (g(n) > h(n)) \implies f(n) > h(n)$.
    - הסבר: נניח בשלילה שגם $f(n) \leq g(n)$ וגם $g(n) \leq h(n)$.
  - מטרנזיטיביות הסדר בטבעיים נקבל $f(n) \leq h(n)$, וזו סתירה להנחה ש-$f(n) > h(n)$.
  - כלומר $A(f,h) \subseteq K_1 \cup K_2$.
  - איחוד קבוצות סופיות הוא סופי, לכן $A(f,h)$ סופית, ולכן $fRh$.

**2. $R$ אינו סימטרי (אינו יחס שקילות):**

- ניקח $f(n) = 1$ ו-$g(n) = 2$ לכל $n$.
- $f(n)$ תמיד קטן מ-$g(n)$ אז $A(f,g) = \emptyset$ (סופי) $\Rightarrow fRg$.
- $g(n)$ תמיד גדול מ-$f(n)$ אז $A(g,f) = \mathbb{N}$ (אינסופי) $\Rightarrow$ לא $gRf$.
- זה מראה שהיחס אינו סימטרי ולכן לא יחס שקילות

**3. $R$ אינו אנטי-סימטרי (לא יחס סדר חלקי)**

- נגדיר $f(n) = 1, g(n) = 1$ עבור $n > 0$, ו-$f(0) = 1, g(0) = 2$.
- $A(f,g) = \emptyset \implies fRg$.
- $A(g,f) = \{0\} \in Fin(\mathbb{N}) \implies gRf$.
- אבל $f \neq g$.

# פתרון: סעיף ב' - עוצמת $R[\{f\}]$

**הטענה:** לכל $f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, הקבוצה $R[\{f\}] = \{g \mid fRg\}$ שוות עוצמה ל-$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ (כלומר א).

**הוכחה:**

- כידוע $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0} = \aleph$ ו-$|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| = \aleph$.
- ברור ש-$R[\{f\}] \subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, לכן $|R[\{f\}]| \leq \aleph$.
- נראה ש-$|R[\{f\}]| \geq \aleph$.
- לכל $h \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, נגדיר $g_h = f + h$ (כלומר $g_h(n) = f(n) + h(n)$).
- לכל $n$, בפרט $g_h(n) \geq f(n)$, ולכן הקבוצה $\{n \mid f(n) > g_h(n)\}$ היא ריקה (וסופית).
- לכן לכל $h$, מתקיים $fRg_h$, כלומר $g_h \in R[\{f\}]$.
- ההתאמה $h \mapsto g_h$ היא חח"ע (כי אם $f + h_1 = f + h_2$ אז $h_1 = h_2$).
- לכן יש לפחות $|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| = \aleph$ פונקציות ב-$R[\{f\}]$.
- ממשפט קנטור-ברנשטיין, העוצמה היא א.

# פתרון: סעיף ד' - איחוד קבוצות פונקציות סופיות

**הטענה:** הקבוצה $S = \bigcup\{\mathbb{N}^A \mid A \in Fin(\mathbb{N})\}$ היא בת מנייה ($\aleph_0$).

**הוכחה:**

- הקבוצה $Fin(\mathbb{N})$ (כל תתי-הקבוצות הסופיות של הטבעיים) היא בת מנייה. (ידוע).
- נבדוק את העוצמה של כל איבר באיחוד, $\mathbb{N}^A$.
- אם $A$ קבוצה סופית, נאמר $|A| = k$, אזי העוצמה של $\mathbb{N}^A$ (קבוצת הפונקציות מ-$A$ ל-$\mathbb{N}$) היא $|\mathbb{N}|^{|A|} = \aleph_0^k = \aleph_0$.
- כלומר, כל קבוצה באיחוד היא בת מנייה.
- קיבלנו איחוד בן-מנייה של קבוצות בנות-מנייה.
- לפי משפט האיחוד ("איחוד בן מנייה של קבוצות בנות מנייה הוא בן מנייה"), העוצמה של $S$ היא $\aleph_0$.

# פתרון: סעיף ה' - עוצמת מחלקת השקילות $[f]_{R^*}$

**הטענה:** לכל $f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, מתקיים $[f]_{R^*} \sim \mathbb{N}$.

**הוכחה:**

- לפי הגדרה, $g \in [f]_{R^*} \iff D(f,g) \in Fin(\mathbb{N})$.
- כלומר, $g$ מתקבלת מ-$f$ ע"י שינוי ערכים במספר סופי של נקודות.
- נגדיר פונקציה מהקבוצה $S$ (מסעיף ד') ל-$[f]_{R^*}$.
- לכל פונקציה חלקית סופית $h \in \mathbb{N}^A$ (כאשר $A \in Fin(\mathbb{N})$), נגדיר $\hat{h} \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$:

$$\hat{h}(n) = \begin{cases} h(n) & n \in A \\ f(n) & n \notin A \end{cases}$$

- ברור ש-$\hat{h}$ שונה מ-$f$ רק בתוך $A$ (קבוצה סופית), לכן $\hat{h} \in [f]_{R^*}$.
- ההתאמה היא "על" $[f]_{R^*}$: כל $g$ שקולה ל-$f$ שונה ממנה בקבוצה סופית $A$, ונגדיר $h$ כצמצום של $g$ ל-$A$.
- ראינו ש-$|S| = \aleph_0$. לכן $\aleph_0 \leq |[f]_{R^*}|$.
- מצד שני, יש אינסוף פונקציות השונות מ-$f$ בנקודה אחת בלבד (למשל $f(0)+k$), לכן $|[f]_{R^*}| \geq \aleph_0$.
- סה"כ העוצמה היא $\aleph_0$.

# פתרון: סעיף ו' - עוצמת קבוצת המנה

**הטענה:** קבוצת המנה $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}/R^*$ אינה בת מנייה.

**הוכחה:**

- נסמן $X = \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$. העוצמה היא $|X| = \aleph$.
- קבוצת המנה מחלקת את $X$ למחלקות זרות שהאיחוד שלהן הוא $X$.

$$X = \bigcup_{C \in X/R^*} C$$

- הוכחנו בסעיף ה' שכל מחלקה $C$ היא בת מנייה ($|C| = \aleph_0$).
- נניח בשלילה שקבוצת המנה בת מנייה. אזי האיחוד הנ"ל הוא איחוד בן מנייה של קבוצות בנות מנייה.
- לכן העוצמה של האיחוד צריכה להיות $\aleph_0$.
- אבל העוצמה של האיחוד היא $|X| = \aleph$ (שהיא גדולה מ-$\aleph_0$).
- סתירה.
- **מסקנה:** קבוצת המנה אינה בת מנייה (למעשה עוצמתה $\aleph$).

# פתרון: סעיף ז' - צפיפות היחס

**הטענה:** לכל $[g], [f]$ כך ש-$[f] < [g]$ (ביחס המושרה), $[g]$ אינה עוקב מיידי של $[f]$. **משמעות:** קיים $h$ כך ש-$[f] < [h] < [g]$.

- תהי $P = \{n \in \mathbb{N} \mid g(n) > f(n)\}$. נתון ש-$P$ אינסופית.
- נחלק את $P$ לשתי קבוצות אינסופיות זרות $P_1, P_2$ (למשל, זוגיים ואי זוגיים בתוך $P$).
- נגדיר פונקציה $h$:

$$h(n) = \begin{cases} g(n) & n \in P_1 \\ f(n) & n \notin P_1 \end{cases}$$

- **נראה ש-$[f] < [h]$:**
  - $f(n) \leq h(n)$ לכל $n$ (כי ב-$P_1$, $f < g = h$, ובחוץ $f = h$). לכן $[f] \leq [h]$.
  - הקבוצה $\{n \mid h(n) > f(n)\}$ היא $P_1$ (אינסופית), לכן לא מתקיים $hRf$. כלומר $[f] \neq [h]$.
- **נראה ש-$[h] < [g]$:**
  - $h(n) \leq g(n)$ לכל $n$ (ב-$P_1$ שווה, בחוץ $h = f \leq g$). לכן $[h] \leq [g]$.
  - הקבוצה $\{n \mid g(n) > h(n)\}$ היא $P_2$ (אינסופית), לכן לא $[h] \leq [g]$.
- סה"כ $[f] < [h] < [g]$. לא קיים עוקב מיידי.

# שאלה: הרכבת פונקציות

- תהיינה $g : A \to B, f : B \to C$ פונקציות.
  - הוכיחו שאם $f \circ g$ חח"ע, אז $g$ חח"ע.
  - הוכיחו שאם $f \circ g$ על, אז $f$ היא על.
- תהי $f : A \to B$ פונקציה.
  - נגדיר ש-$f$ **מצטמצמת משמאל** אם לכל קבוצה $C$ ולכל שתי פונקציות $g, h : C \to A$, אם $f \circ g = f \circ h$ אזי $g = h$.
  - הוכיחו ש-$f$ מצטמצמת משמאל אם ורק אם $f$ חח"ע.

# פתרון: הרכבת פונקציות

**א. תכונות בסיסיות:**

i. **נתון:** $f \circ g$ חח"ע.

- **צ"ל:** $g$ חח"ע.
- **הוכחה:** יהיו $x_1, x_2 \in A$ כך ש-$g(x_1) = g(x_2)$.
- נפעיל את $f$ על שני האגפים: $f(g(x_1)) = f(g(x_2))$.
- לפי הגדרת ההרכבה: $(f \circ g)(x_1) = (f \circ g)(x_2)$.
- היות ו-$f \circ g$ חח"ע, נובע ש-$x_1 = x_2$.
- לכן $g$ חח"ע.

ii. **נתון:** $f \circ g$ על.

- **צ"ל:** $f$ על.
- **הוכחה:** יהי $c \in C$.
- היות ו-$f \circ g$ על, קיים $a \in A$ כך ש-$(f \circ g)(a) = c$.
- לפי הגדרת ההרכבה: $f(g(a)) = c$.
- נסמן $b = g(a) \in B$. קיבלנו $f(b) = c$.
- לכן לכל $c \in C$ קיים מקור ב-$B$, כלומר $f$ על.

**ב. צמצום משמאל $\iff$ חח"ע:**

$\Rightarrow$ **כיוון ראשון:** נניח $f$ חח"ע.

- נניח $f \circ g = f \circ h$.
- יהי $c \in C$ כלשהו. אזי $f(g(c)) = f(h(c))$.
- מכיוון ש-$f$ חח"ע, נובע ש-$g(c) = h(c)$.
- זה נכון לכל $c$, לכן $g = h$.

$\Leftarrow$ **כיוון שני:** נניח $f$ מצטמצמת משמאל.

- נוכיח ש-$f$ חח"ע.
- יהיו $x, y \in A$ כך ש-$f(x) = f(y)$.
- נגדיר קבוצה $C = \{k\}$ (יחידון), ופונקציות $g, h : C \to A$ ע"י $g(k) = x, h(k) = y$
- מתקיים: $(f \circ g)(k) = f(x) = f(y) = (f \circ h)(k)$.
- לכן $f \circ g = f \circ h$.
- לפי הנתון (צמצום משמאל), נובע $g = h$.
- לכן בפרט $g(k) = h(k)$, כלומר $x = y$.
- הוכחנו שאם $f(x) = f(y)$ אז $x = y$, כלומר $f$ חח"ע.