מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות

הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: פרופ. גרא וייס

קבוצות: מושגי יסוד

- **עצמים מתמטיים:** העולם המתמטי כולל טיפוסים שונים של עצמים:
  - מספרים: טבעיים ($\mathbb{N}$), שלמים ($\mathbb{Z}$), רציונליים ($\mathbb{Q}$), ממשיים ($\mathbb{R}$).
  - עצמים גיאומטריים: נקודות, ישרים, וכו'.
- **קבוצות:**
  - נסמן קבוצות באמצעות סוגריים מסולסלים.
  - דוגמה: $A = \{7, 12, 3\}$.
  - קבוצה יכולה להכיל איברים מטיפוסים שונים, וגם קבוצות אחרות.
- **שייכות וסימונים:**
  - $a \in A$: האיבר a שייך לקבוצה A.
  - $b \notin A$: האיבר b אינו שייך לקבוצה A.
- **כמת על קבוצה:** $\forall x \in A\,(\alpha)$ פירושו $\forall x\,(x \in A \to \alpha)$, ו-$\exists x \in A\,(\alpha)$ פירושו $\exists x\,(x \in A \wedge \alpha)$.

- **הנחת יסוד:** הביטוי $x \in A$ הוא בעל משמעות רק אם A היא קבוצה. מכאן ואילך, כשנכתוב $a \in A$, נניח תמיד ש-A היא קבוצה.
- **דוגמה:**
  - עבור $S = \{\pi, \{-3\}\}$
    - $\pi \in S$
    - $\{-3\} \in S$
    - $-3 \notin S$
- **כימות על קבוצות:**
  - ניתן להשתמש בכמתים על איברי קבוצה (סטודנטים S, קורסים C, ו-$R(s,c)$: "s רשום ל-c"):

$$\forall s \in S\,(\exists c \in C\,(R(s,c)))$$

  - הביטוי $\forall x \in A\,(\alpha(x))$ נקרא:
  - "לכל איבר x בקבוצה A, הטענה $\alpha(x)$ מתקיימת".

הגדרת קבוצה באמצעות תנאי

- בדרך כלל, קבוצות מוגדרות באמצעות תנאי שאיבריהן מקיימים, ולא על ידי מניית כל האיברים.
- **דוגמה:** אם S קבוצת הסטודנטים בקורס ו-$Q(x)$ היא "x עבר את הבוחן", אז קבוצת העוברים היא:

$$\{x \mid x \in S \wedge Q(x)\}$$

- **הגדרה כללית:**
  - אם $\mathcal{P}(x)$ הוא תנאי על משתנה x, ניתן להגדיר קבוצה A על ידי:

$$A = \{x \mid \mathcal{P}(x)\}$$

  - זוהי קבוצת כל האיברים x שעבורם התנאי $\mathcal{P}(x)$ מתקיים. כלומר: $x \in A \iff \mathcal{P}(x)$.
  - שם המשתנה אינו חשוב: $\{x \mid \mathcal{P}(x)\} = \{y \mid \mathcal{P}(y)\}$.

בהמשך, בעקבות הפרדוקס של ראסל, נצטרך לסייג את הכלליות שבהגדרה זו.

- **תנאים שונים, אותה קבוצה:**
  - תנאים שונים יכולים להגדיר את אותה הקבוצה. לדוגמה, אם $P(x)$ היא "x הגיש את העבודה", שתי ההגדרות הבאות מתארות את אותה קבוצה:
    - $\{x \mid x \in S \wedge (Q(x) \to P(x))\} = \{x \mid x \in S \wedge (\neg Q(x) \vee P(x))\}$

הפרדוקס של ראסל

- **הפרדוקס:** נגדיר את הקבוצה R להיות קבוצת כל הקבוצות שאינן איבר של עצמן: $R = \{A \mid A \notin A\}$
- **השאלה:** האם R איבר של עצמה? כלומר, האם $R \in R$?
- **הסתירה:**

1. **אם $R \in R$:**
   - אז R חייבת לקיים את התנאי להשתייכות ל-R, שהוא $R \notin R$.
   - קיבלנו $R \in R$ וגם $R \notin R$ - **סתירה**.
2. **אם $R \notin R$:**
   - אז R מקיימת את התנאי להשתייכות ל-R, ולכן $R \in R$.
   - קיבלנו $R \notin R$ וגם $R \in R$ - **סתירה**.



- **מסקנה:** לא כל אוסף של איברים המוגדר על ידי תנאי הוא "קבוצה" במובן המתמטי.
- **חשיבות הפרדוקס עבורנו:** תמיד עדיף להגדיר תת-קבוצות של קבוצה נתונה, ולהיזהר מהגדרות המכמתות על "אוסף כל הקבוצות".

Comprehension מול Replacement: משתנים קשורים

- **הפרדה** (Comprehension): בוחרים איברים מתוך קבוצה נתונה:

$$\{\, x \in A \mid \varphi(x) \,\}$$

- המשתנה הקשור x מופיע **משמאל** ל-"$\mid$".
- A ופרמטרים נוספים ב-φ הם משתנים **חופשיים**.
- דוגמה: ב-$\{\, x \in S \mid R(x, c) \,\}$ המשתנה x קשור, ו-c חופשי.
- **שייכות**: $y \in \{\, x \in A \mid \varphi(x) \,\} \iff y \in A \wedge \varphi(y)$
- **שינוי שם של משתנה קשור אינו משנה את הקבוצה**: $\{\, x \in A \mid \varphi(x) \,\} = \{\, z \in A \mid \varphi(z) \,\}$, $\{\, f(x) \mid x \in A \,\} = \{\, f(z) \mid z \in A \,\}$.

- **תבנית** (Replacement): מפעילים תבנית על כל איברי קבוצה:

$$\{\, f(x) \mid x \in A \,\}$$

- המשתנים הקשורים מופיעים **מימין** ל-"$\mid$".
- אפשר גם כמה משתנים קשורים.
- **שייכות**: $y \in \{\, f(x) \mid x \in A \,\} \iff \exists x \in A\,(y = f(x))$


יחס השוויון בין קבוצות

- **סימן השוויון (=):** מסמן זהות בין שני עצמים מתמטיים. $A = B$ מציין ש-A ו-B הם אותו אובייקט.
- **שוויון קבוצות:**
  - לכל שתי קבוצות A, B: הן שוות אם ורק אם יש להן בדיוק את אותם האיברים.
  - **הגדרה פורמלית:**

$$A = B \iff \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

- **אי-שוויון קבוצות:**
  - לכל שתי קבוצות A, B: הן שונות אם ורק אם קיים איבר שנמצא באחת מהן אך לא בשנייה.
  - **הגדרה פורמלית (שלילת הגדרת השוויון):**


$$A \neq B \iff \exists x((x \in A \land x \notin B) \lor (x \notin A \land x \in B))$$



אותם איברים — אותה קבוצה

הבהרה: משמעות השוויון

- הבהרה כללית על שוויון במתמטיקה:
  - כאשר אומרים ששני עצמים שווים (נניח $a = b$), הכוונה שהם אותו עצם ממש.
  - למשל, אם a ו-b הם מספרים, אז $a = b$ פירושו ש-a ו-b אותו מספר בדיוק.
  - באותו אופן, אם A ו-B הן קבוצות, אז "A שווה ל-B" (כלומר $A = B$) פירושו ש-A ו-B היא אותה הקבוצה.
- **תכונות השוויון:**
  - **רפלקסיביות:** לכל קבוצה A, מתקיים $A = A$.
  - **סימטריות:** לכל שתי קבוצות A, B, אם $A = B$, אז $B = A$.
  - **טרנזיטיביות:** לכל שלוש קבוצות A, B, C, אם $A = B$ וגם $B = C$, אז $A = C$.



דוגמה: אותה קבוצה בהגדרה לפי תבנית ולפי הפרדה


- נניח ש-S קבוצת הסטודנטים בקורס, Y קבוצת השנים, ו-$g(x)$ היא שנת הלידה של הסטודנט x (תמיד $g(x) \in Y$).
- נגדיר שתי קבוצות:
  - לפי **תבנית**: $A = \{ g(x) \mid x \in S \}$
  - לפי **הפרדה**: $B = \{ y \in Y \mid \exists x \in S \, (y = g(x)) \}$
  - נטען: $A = B$.
- **שלב 1, נפרט לפי ההגדרות:**
  - שוויון קבוצות: $A = B \iff \forall y \, (y \in A \leftrightarrow y \in B)$.
  - לפי הגדרת A: $y \in A \iff \exists x \in S \, (y = g(x))$.
  - לפי הגדרת B: $y \in B \iff y \in Y \wedge \exists x \in S \, (y = g(x))$.
- **שלב 2:** צריך להוכיח טענת "לכל", ולכן יהי y איבר כלשהו, ונוכיח $y \in A \leftrightarrow y \in B$, בשני כיוונים.
- **שלב 3:**
  - ($\Rightarrow$) נניח $y \in A$. אז קיים $x \in S$ כך ש-$y = g(x)$. מכאן $y = g(x) \in Y$, ולכן $y \in Y \wedge \exists x \in S \, (y = g(x))$, כלומר $y \in B$.
  - ($\Leftarrow$) נניח $y \in B$. אז, לפי ההגדרה, $\exists x \in S \, (y = g(x))$, כלומר $y \in A$.
- **מסקנה:** y היה שרירותי, ולכן $\forall y \, (y \in A \leftrightarrow y \in B)$, כלומר $A = B$.

יחס ההכלה

- לכל שתי קבוצות S, T, נאמר ש-S **מוכלת** ב-T, ונסמן זאת $S \subseteq T$, אם כל איבר של S הוא גם איבר של T.
- **הגדרה פורמלית:**

$$S \subseteq T \iff \forall x(x \in S \to x \in T)$$

- **ביטויים נרדפים:**
  - S מוכלת ב-T
  - S חלקית ל-T
  - S תת-קבוצה של T
- **הערה על מינוח:**
  - לעיתים משתמשים בביטוי "T מכילה את S" כדי לציין $S \subseteq T$.
  - אנו נימנע מכך, כי ניתן להבין זאת בטעות כ-$S \in T$, וזה עלול לבלבל.




שלילת יחס ההכלה

- **הגדרה:** לכל שתי קבוצות A, B, נאמר ש-A אינה מוכלת ב-B, ונסמן $A \not\subseteq B$, אם קיים איבר ב-A שאינו נמצא ב-B.

$$A \not\subseteq B \iff \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$$

- **פיתוח מההגדרה:**
  - $A \not\subseteq B$ היא שלילה של $A \subseteq B$, כלומר $\neg\forall x\,(x \in A \to x \in B)$.
  - לפי שלילת כמת כולל: $\exists x\,(\neg(x \in A \to x \in B))$.
  - לפי שלילת גרירה: $\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$.



$x \in A$, אבל $x \notin B$

לכן $A \not\subseteq B$

- **דוגמה:** עבור $A = \{\{3,4\}, 2, 3\}$
  - $\{2,3\} \subseteq A$ (כי $2 \in A$ וגם $3 \in A$).
  - $\{3,4\} \not\subseteq A$ (כי $4 \in \{3,4\}$ אבל $4 \notin A$).
  - $\{3,4\} \in A$ (כי הקבוצה $\{3,4\}$ היא איבר ב-A).
  - $\{2,3\} \notin A$ (כי הקבוצה $\{2,3\}$ אינה איבר ב-A).

טרנזיטיביות ההכלה

- **הטענה:** לכל שלוש קבוצות A, B, C, אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq C$, אז $A \subseteq C$.

$$(A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \to A \subseteq C$$

הוכחה:

1. תהיינה A, B, C קבוצות המקיימות $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq C$.
2. כדי להוכיח $A \subseteq C$, עלינו להראות שכל איבר ב־A הוא גם איבר ב־C.
3. יהי x איבר כלשהו ב־A, כלומר $x \in A$.
4. מהנתון $A \subseteq B$, נובע כי $x \in B$.
5. מהנתון $B \subseteq C$, נובע כי $x \in C$.
6. הראינו שאם $x \in A$ אז $x \in C$, ולכן $A \subseteq C$ כנדרש.

כדי להוכיח גרירה, מניחים את צד שמאל וצריך להוכיח את צד ימין.

כדי להוכיח „לכל", לוקחים איבר כלשהו.

שימוש בנתון מסוג גרירה (או הכלה): כשיש בידינו את צד שמאל, מסיקים גם את צד ימין.

מכיוון ש־x כלשהו, הוכחנו את הגרירה לכל איבר, ולכן את ההכלה.

שוויון והכלה דו-כיוונית

- **הטענה:** לכל שתי קבוצות A, B (לאו דווקא שונות), מתקיים $A = B$ אם ורק אם A מוכלת ב-B וגם B מוכלת ב-A.
- **ניסוח פורמלית:**

$$\forall A, B(A = B \iff (A \subseteq B \land B \subseteq A))$$


- **הוכחה:**
  - הטענה היא שקילות לוגית, ולכן נוכיח שני כיוונים:
    - **כיוון ראשון ($\Rightarrow$):**
      - נניח $A = B$.
      - לפי הגדרת שוויון קבוצות, $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$.
      - מכאן נובע $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$, כלומר $A \subseteq B$.
      - וגם $\forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$, כלומר $B \subseteq A$.
      - לכן, $A \subseteq B \land B \subseteq A$.
    - **כיוון שני ($\Leftarrow$):**
      - נניח $A \subseteq B \land B \subseteq A$.
      - מההנחה $A \subseteq B$, לפי הגדרת הכלה, נובע $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$.
      - מההנחה $B \subseteq A$, לפי הגדרת הכלה, נובע $\forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$.
      - משתי הגרירות יחד, נקבל $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$.
      - לפי הגדרת שוויון קבוצות, זה שקול ל-$A = B$.

הקבוצה הריקה

- **הקבוצה הריקה:** נגדיר קבוצה, שנסמנה $\emptyset$, שאין לה איברים כלל.

$$\forall x(x \notin \emptyset)$$

- **טענה:** לכל קבוצה A מתקיים $\emptyset \subseteq A$.
  - **הוכחה (בדרך השלילה):**
    1. נניח שקיימת קבוצה X_0 כך ש-$\emptyset \not\subseteq X_0$.
    2. לפי שלילת ההכלה, זה אומר שקיים איבר x כך ש-$x \in \emptyset \wedge x \notin X_0$.
    3. אבל קיום $x \in \emptyset$ סותר את הגדרת הקבוצה הריקה. **סתירה**.
    4. לכן, ההנחה שגויה, ו-$\emptyset$ מוכלת בכל קבוצה.
  - **יחידות הקבוצה הריקה:**
    - לכל שתי קבוצות R, S, אם שתיהן ריקות, אז $R \subseteq S$ וגם $S \subseteq R$.
    - מהכלה דו-כיוונית נובע $R = S$. לכן, יש רק קבוצה ריקה אחת.



אין בקבוצה אף איבר

קבוצות המספרים - סימונים


- סימונים מקובלים:

תיאור הקבוצה	סימון מקוצר	סימון מפורט
קבוצת המספרים הטבעיים	$\mathbb{N}$	$\{0, 1, 2, 3, \ldots\}$
קבוצת המספרים השלמים	$\mathbb{Z}$	$\{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$
קבוצת המספרים הרציונליים	$\mathbb{Q}$	$\{\frac{m}{n} \mid n \neq 0,\ m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{Z}\}$
קבוצת המספרים הממשיים	$\mathbb{R}$	$\{\lim_{n\to\infty} q_n \mid q_0, q_1, \ldots \in \mathbb{Q}\}$

- הערת מוסכמות: יש שמתחילים את $\mathbb{N}$ ב-1; כאן נשתמש ב-0.

מערכת לתרגול עצמי של מה שלמדנו בשיעור

- **קישור:** easylean.cs.bgu.ac.il/#lesson2
- השיעור השני במערכת עוקב אחרי ההרצאה, בארבע יחידות: קבוצות והכלה (יחידה 8, כולל הגדרה בהפרדה ובתבנית), פעולות על קבוצות (יחידה 9), קבוצת הַחֶזְקָה ופעולות אונריות (יחידה 10), וחלוקות (יחידה 11).
- הוכחת הכלה: "יהי $x \in A$ ... ולכן $x \in B$"; שוויון: שתי הכלות; שייכות לקבוצה שמוגדרת בפעולה: "לפי ההגדרה".
- בכל שלב בונים את ההוכחה בעצמכם, ומקבלים בדיקה מיידית ורמזים.



תרגיל: הוכיחו שכל קבוצה מוכלת בעצמה

טענה: לכל קבוצה A מתקיים $A \subseteq A$.

הוכחה:

1. תהי A קבוצה כלשהי. ← כדי להוכיח „לכל קבוצה", לוקחים קבוצה כלשהי.
2. כדי להוכיח $A \subseteq A$, עלינו להראות ש: $\forall x(x \in A \to x \in A)$. ← לפי הגדרת ההכלה.
3. יהי x איבר כלשהו. ← כדי להוכיח „לכל", לוקחים איבר כלשהו.
4. נניח ש-$x \in A$. ← כדי להוכיח גרירה, מניחים את צד שמאל.
5. מההנחה נובע ישירות ש-$x \in A$ (זהו משפט טאוטולוגי: $p \to p$). ← שימוש בהנחה: מה שצריך להוכיח כבר בידינו.
6. הראינו שאם $x \in A$ אז $x \in A$, ולכן $A \subseteq A$. ∎ ← מכיוון ש-x כלשהו, הוכחנו את הגרירה לכל איבר, ולכן את ההכלה.

הוכיחו: $\emptyset \neq \{\emptyset\}$

הוכחה:

1. כדי להוכיח אי-שוויון, נמצא איבר השייך לאחת הקבוצות אך לא לשנייה. → לפי הגדרת אי-שוויון: קיים איבר שנמצא בקבוצה אחת בלבד.
2. האיבר $\emptyset$ מקיים: $\emptyset \in \{\emptyset\}$ (האיבר היחיד בקבוצה הימנית). → בוחרים את האיבר המבדיל.
3. לעומת זאת, $\emptyset \notin \emptyset$ (הקבוצה הריקה אינה מכילה איברים). → לפי הגדרת הקבוצה הריקה.
4. מצאנו איבר כזה, ולכן הקבוצות שונות. → זה מה שהגדרת אי-השוויון דורשת.

הוכיחו: $\{\{\emptyset\}\} \neq \{\emptyset\}$ — הוכחה א' (בדרך השלילה)

הוכחה:

1. נניח בשלילה ש-$\{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset\}$. → הוכחה בשלילה: מניחים את ההפך ממה שרוצים להוכיח.
2. שתי הקבוצות הן **יחידונים** (קבוצות שיש בהן איבר אחד בלבד). → מושג חדש: יחידון.
3. שוויון ביניהן גורר שוויון בין איבריהן היחידים. → לפי הגדרת השוויון: אותם איברים בדיוק.
4. מכאן $\emptyset = \{\emptyset\}$, וזו סתירה למה שהוכחנו בתרגיל הקודם. → סתירה: טענה שכבר הוכחנו שאינה נכונה.
5. לכן ההנחה שגויה, ו-$\{\{\emptyset\}\} \neq \{\emptyset\}$. ∎ → מסקנה: שלילת ההנחה.

הוכיחו: $\{\{\emptyset\}\} \neq \{\emptyset\}$ — הוכחה ב' (ישירה)

הוכחה:

1. נמצא איבר השייך לאחת הקבוצות אך לא לשנייה. ← לפי הגדרת אי-שוויון.
2. האיבר $\emptyset$ שייך לקבוצה השמאלית: $\emptyset \in \{\emptyset\}$. ← האיבר המבדיל.
3. הוא אינו שייך לימנית: איברה היחיד הוא $\emptyset$, ו-$\emptyset \neq \{\emptyset\}$. ← שימוש בתרגיל הקודם.
4. מצאנו איבר המבדיל בין הקבוצות, ולכן הן שונות. ∎ ← זה מה שהגדרת אי-השוויון דורשת.

הוכיחו: $\{\{\emptyset\}, \emptyset\} \supsetneq \{\emptyset\}$

הוכחה:

1. הכלה ממש פירושה הכלה וגם אי-שוויון, ולכן נוכיח כל אחד מהם. — הגדרת הכלה ממש.
2. **הכלה:** יהי $x \in \{\emptyset\}$, כלומר $x = \emptyset$. — הוכחת הכלה: לוקחים איבר כלשהו.
3. האיבר $\emptyset$ נמצא גם בקבוצה הימנית, ולכן יש הכלה. — מראים ש-x שייך לקבוצה הימנית.
4. **אי-שוויון:** $\{\emptyset\}$ נמצא בקבוצה הימנית, אך לא בשמאלית. — האיבר המבדיל. איברה היחיד של השמאלית הוא $\emptyset$.
5. לכן הקבוצות אינן שוות, וההכלה היא ממש. ∎ — הכלה ועוד אי-שוויון: הכלה ממש.

אפיון הכלה ממש — הכיוון ($\Rightarrow$)

טענה: לכל שתי קבוצות A, B, מתקיים $A \subsetneq B \iff (A \subseteq B \wedge \exists b \in B\ (b \notin A))$.

הוכחה:

1. נניח $A \subsetneq B$. אז $A \subseteq B$ וגם $A \neq B$. — הגדרת הכלה ממש.
2. לפי הגדרת אי-שוויון, אחת משתי האפשרויות מתקיימת: — קיים איבר שנמצא בקבוצה אחת בלבד.
3. (א) קיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$; (ב) קיים $a \in A$ כך ש-$a \notin B$.
4. אפשרות (ב) אינה יכולה להתקיים, כי $A \subseteq B$. — ניגוד לנתון: כל איבר של A שייך ל-B.
5. לכן אפשרות (א) מתקיימת: קיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$. ∎ — זו המסקנה המבוקשת.

אפיון הכלה ממש — הכיוון ($\Leftarrow$)

טענה: לכל שתי קבוצות A, B, מתקיים $(A \subseteq B \wedge \exists b \in B\ (b \notin A)) \iff A \subsetneq B$.

הוכחה:

1. נניח $A \subseteq B$ וקיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$. ← הנתון.
2. האיבר b שייך ל-B ואינו שייך ל-A, ולכן $A \neq B$. ← לפי הגדרת אי-שוויון: איבר שנמצא באחת בלבד.
3. מ-$A \subseteq B$ ו-$A \neq B$ נובע $A \subsetneq B$. ∎ ← הגדרת הכלה ממש.

לא קיימת קבוצה A כך ש-$A \subsetneq A$

הוכחה:

1. נניח בשלילה שקיימת קבוצה A כך ש-$A \subsetneq A$. — הוכחה בשלילה.
2. לפי הגדרת הכלה ממש: $A \subsetneq A \iff (A \subseteq A) \wedge (A \neq A)$. — הגדרת הכלה ממש.
3. מההנחה נובע החלק השני: $A \neq A$. — שימוש ב"וגם": מקבלים את שני החלקים.
4. אבל $A = A$ תמיד מתקיים, וזו סתירה. — סתירה: טענה ושלילתה.
5. לכן ההנחה שגויה, ואין קבוצה A כך ש-$A \subsetneq A$. ∎ — מסקנה: שלילת ההנחה.

לכל קבוצה A: אם $A \neq \emptyset$ אז $\emptyset \subsetneq A$

הוכחה:

1. נניח $A \neq \emptyset$. — מניחים את צד שמאל של הגרירה.
2. לכל קבוצה A מתקיים $\emptyset \subseteq A$. — הוכחנו שהקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה.
3. מההנחה, גם $\emptyset \neq A$. — לפי סימטריית השוויון.
4. לכן $\emptyset \subseteq A$ ו-$\emptyset \neq A$, כלומר $\emptyset \subsetneq A$. ∎ — הגדרת הכלה ממש.

טרנזיטיביות של הכלה ממש

טענה: לכל שלוש קבוצות A, B, C, אם $A \subsetneq B$ וגם $B \subseteq C$, אז $A \subsetneq C$.

הוכחה:

1. נניח $A \subsetneq B$ ו-$B \subseteq C$. — מניחים את צד שמאל של הגרירה.
2. לפי הגדרת הכלה ממש: $A \subseteq B$, וקיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$. — הגדרת הכלה ממש.
3. מטרנזיטיביות ההכלה: $A \subseteq B$ ו-$B \subseteq C$ גוררים $A \subseteq C$. — טענה שהוכחנו קודם.
4. מ-$b \in B$ ו-$B \subseteq C$ נקבל $b \in C$, ובמקביל $b \notin A$. — שימוש בהכלה.
5. לכן קיים איבר ב-C שאינו ב-A, כלומר $A \neq C$. — הגדרת אי-שוויון.
6. סיכום: $A \subseteq C$ ו-$A \neq C$, כלומר $A \subsetneq C$. ∎ — הגדרת הכלה ממש.

פעולות על קבוצות

לכל שתי קבוצות A, B, הפעולות הבאות מוגדרות כך:

- **איחוד ($\cup$):** הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים לפחות לאחת מהקבוצות.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

- **חיתוך ($\cap$):** הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים לשתי הקבוצות.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

- **הפרש ($\setminus$):** הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים לקבוצה הראשונה אך לא לשנייה.

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$


- **הפרש סימטרי (Δ):** הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים בדיוק לאחת מהקבוצות.

$$A \Delta B = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)\}$$

דוגמה: $A = \{1, 2, \emptyset\}$, $B = \{1, \{2\}\}$, $C = \{3, \emptyset\}$

- **איחוד** ($\cup$): לוקחים את איברי קבוצה אחת ומוסיפים את איברי הקבוצה השנייה.
  - $A \cup B = \{1, 2, \emptyset, \{2\}\}$
  - $A \cup C = \{1, 2, \emptyset, 3\}$
- **חיתוך** ($\cap$): לוקחים את האיברים המשותפים לשתי הקבוצות.
  - $A \cap B = \{1\}$
  - $A \cap C = \{\emptyset\}$
  - $B \cap C = \emptyset$. כאשר החיתוך הוא הקבוצה הריקה, נאמר שהקבוצות **זרות**.

- **הפרש** ($\setminus$): לוקחים את איברי הקבוצה השמאלית ומוציאים את איברי הקבוצה הימנית.
  - שימו לב: בדרך כלל $A \setminus B \neq B \setminus A$.
  - $A \setminus B = \{2, \emptyset\}$
  - $B \setminus A = \{\{2\}\}$



תרגיל לדוגמה

- נניח ש-S היא קבוצת הסטודנטים בקורס, ושלכל $x \in S$: $Q(x)$ - "x עבר את הבוחן", $P(x)$ - "x הגיש את העבודה".
- הגדרות:
  - $A = \{\, x \in S \mid \neg Q(x) \,\}$ - הסטודנטים שלא עברו את הבוחן.
  - $B = \{\, x \in S \mid \neg P(x) \,\}$ - הסטודנטים שלא הגישו את העבודה.
  - $C = \{\, x \in S \mid \neg\big(Q(x) \wedge P(x)\big) \,\}$ - הסטודנטים שאין זה נכון שהם עברו את הבוחן וגם הגישו את העבודה.
- טענה: $A \cup B = C$.
- הוכחה:
  - ($\subseteq$) יהי $x \in A \cup B$. אז $x \in S$ ו-$\neg Q(x) \vee \neg P(x)$. לכן לא מתקיים $Q(x) \wedge P(x)$, ומכאן $x \in C$.
  - ($\supseteq$) יהי $x \in C$. אז $x \in S$ ו-$\neg\big(Q(x) \wedge P(x)\big)$, כלומר (דה מורגן) $\neg Q(x) \vee \neg P(x)$. לכן $x \in A$ או $x \in B$, ובפרט $x \in A \cup B$.
- סיכום: לכל $x \in S$ מתקיים $x \in C \iff x \in A \cup B$, ולכן $A \cup B = C$. ∎

זהויות של פעולות על קבוצות

לכל שלוש קבוצות A, B, C מתקיים:

אידמפוטנטיות:

- $A \cup A = A$
- $A \cap A = A$

פעולות עם הקבוצה הריקה:

- $A \cup \emptyset = A \setminus \emptyset = A$
- $A \cap \emptyset = A \setminus A = \emptyset$

חוק החילוף (קומוטטיביות):

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap B = B \cap A$

חוק הקיבוץ (אסוציאטיביות):

- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

חוק הפילוג (דיסטריבוטיביות):

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

חוקי דה מורגן:

- $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
- $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

נוכיח את **אסוציאטיביות האיחוד** ואת **כלל דה מורגן הראשון** כדוגמאות לדרכי הוכחה. שאר הזהויות **לתרגול עצמי**, גם במערכת התרגול. **בכל הזהויות מותר להשתמש בבוחן ובמבחן.**

זהות לדוגמה: אסוציאטיביות האיחוד

טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

נוכיח $(A \cup B) \cup C \subseteq A \cup (B \cup C)$:

1. יהי $x \in (A \cup B) \cup C$.
2. מהגדרת $\cup$: $x \in A \cup B$ או $x \in C$.

   מקרה ראשון: $x \in A \cup B$.
   לפי הגדרת $\cup$, מתקיים $x \in A$ או $x \in B$.
   - אם $x \in A$, אז $x \in A \cup (B \cup C)$.
   - אם $x \in B$, אז $x \in B \cup C$, ולכן $x \in A \cup (B \cup C)$.

   מקרה שני: $x \in C$.
   אז $x \in B \cup C$, ולכן $x \in A \cup (B \cup C)$.
3. בכל המקרים $x \in A \cup (B \cup C)$, ולכן ההכלה מתקיימת.

נוכיח $A \cup (B \cup C) \subseteq (A \cup B) \cup C$:

1. יהי $x \in A \cup (B \cup C)$.
2. מהגדרת $\cup$: $x \in A$ או $x \in B \cup C$.

   מקרה ראשון: $x \in A$.
   אז $x \in A \cup B$, ולכן $x \in (A \cup B) \cup C$.

   מקרה שני: $x \in B \cup C$.
   לפי הגדרת $\cup$, מתקיים $x \in B$ או $x \in C$.
   - אם $x \in B$, אז $x \in A \cup B$, ולכן $x \in (A \cup B) \cup C$.
   - אם $x \in C$, אז $x \in (A \cup B) \cup C$.
3. בכל המקרים $x \in (A \cup B) \cup C$, ולכן ההכלה מתקיימת.

משתי ההכלות, לפי המשפט על הכלה דו-כיוונית: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$. ∎

דוגמה למשפטים הקשורים להכלה והוכחתם

לכל שתי קבוצות A, B: $A \subseteq A \cup B$.

1. יהי $x \in A$.
2. אז $x \in A \vee x \in B$.
3. לכן, לפי הגדרת $\cup$, $x \in A \cup B$, כנדרש.

לכל שתי קבוצות A, B: $A \cap B \subseteq A$.

1. יהי $x \in A \cap B$.
2. לפי הגדרת $\cap$, $x \in A$ וגם $x \in B$.
3. לכן $A \cap B \subseteq A$.

לכל שלוש קבוצות A, B, X: $(X \subseteq A \wedge X \subseteq B) \iff X \subseteq A \cap B$.

כיוון ($\Rightarrow$)

1. נניח $X \subseteq A \cap B$.
2. הראינו $A \cap B \subseteq A$, ולכן $X \subseteq A$.
3. בדומה, $A \cap B \subseteq B$, ולכן $X \subseteq B$.

כיוון ($\Leftarrow$)

1. נניח $X \subseteq A$ וגם $X \subseteq B$.
2. יהי $x \in X$. אז $x \in A$ וגם $x \in B$.
3. לכן, לפי הגדרת $\cap$, $x \in A \cap B$, כנדרש.

משמעות: לכל שתי קבוצות A, B, החיתוך $A \cap B$ הוא הקבוצה הגדולה ביותר המוכלת גם ב־A וגם ב־B.

הכלה וריקות ההפרש

טענה: לכל שתי קבוצות A, B, מתקיים $A \subseteq B \iff A \setminus B = \emptyset$.

- ($\Rightarrow$) נניח $A \setminus B = \emptyset$.
  - יהי $x \in A$. נניח בשלילה ש-$x \notin B$.
  - אז $x \in A \wedge x \notin B$, כלומר $x \in A \setminus B = \emptyset$.
  - **סתירה** (לקבוצה הריקה אין איברים). לכן $x \in B$.
  - הראינו $A \subseteq B$.
- ($\Leftarrow$) נניח $A \subseteq B$.
  - נניח בשלילה שקיים $x \in A \setminus B$.
  - אז $x \in A$, ומ-$A \subseteq B$ נקבל $x \in B$.
  - אבל גם $x \notin B$ (הגדרת ההפרש) - **סתירה**.
  - לכן אין איבר ב-$A \setminus B$, כלומר $A \setminus B = \emptyset$.

התרגיל מדגים תבנית כללית להוכחה שקבוצה ריקה: כדי להוכיח $S = \emptyset$, מניחים שקיים איבר $x \in S$ ומגיעים לסתירה. מכאן שאין בקבוצה איברים, ולכן היא ריקה.

הגדרה שקולה: $A\Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

לכל שתי קבוצות A, B מתקיימת הזהות שבכותרת. בהוכחה, יהי x איבר כלשהו.

$$x \in A\Delta B \iff (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B) \quad \text{(הגדרת הפרש סימטרי)}$$

$$\iff \big((x \in A \wedge x \notin B) \vee x \notin A\big) \wedge \big((x \in A \wedge x \notin B) \vee x \in B\big) \quad \text{(דיסטריבוטיביות)}$$

$$\iff \big((x \in A) \vee (x \notin A)\big) \wedge \big((x \notin B) \vee (x \notin A)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) \wedge \big((x \notin B) \vee (x \in B)\big) \quad \text{(פיצול)}$$

$$\iff \big((x \notin B) \vee (x \notin A)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) \quad \text{(הסרת טאוטולוגיות)}$$

$$\iff \big((x \notin A) \vee (x \notin B)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) \quad \text{(קומוטטיביות)}$$

$$\iff \neg\big((x \in A) \wedge (x \in B)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) \quad \text{(דה־מורגן)}$$

$$\iff \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) \wedge \neg\big((x \in A) \wedge (x \in B)\big) \quad \text{(קומוטטיביות)}$$

$$\iff x \in (A \cup B) \wedge x \notin (A \cap B) \quad \text{(הגדרות איחוד וחיתוך)}$$

$$\iff x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B) \quad \text{(הגדרת הפרש)}$$

הגדרה שקולה: $A\Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

לכל שתי קבוצות A, B מתקיימת הזהות שבכותרת. בהוכחה, יהי x איבר כלשהו.


$$x \in A\Delta B \iff (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B) \quad \text{(הגדרת הפרש סימטרי)}$$

$$\iff \big(x \in A \wedge x \notin B\big) \vee \big(x \in B \wedge x \notin A\big) \quad \text{(חוק החילוף של וגם)}$$

$$\iff \big(x \in A \setminus B\big) \vee \big(x \in B \setminus A\big) \quad \text{(הגדרת הפרש)}$$

$$\iff x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \quad \text{(הגדרת איחוד)}$$

- **קיבלנו הגדרות שקולות של הפרש סימטרי:**
  - $A\Delta B = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)\}$
  - $A\Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
  - $A\Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
- ניתן להשתמש בכל אחת מההגדרות לפי הנוחות.



הוכחה באמצעות טבלת מצבים

כלל דה מורגן הראשון: לכל שלוש קבוצות A, B, C, מתקיים $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

ההוכחה מתבססת על בדיקת כל 8 המצבים האפשריים עבור שייכות של איבר x לקבוצות A, B, C:

$x \in A$	$x \in B$	$x \in C$	$x \in B \cap C$	$x \in A \setminus (B \cap C)$	$x \in A \setminus B$	$x \in A \setminus C$	$x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
T	T	T	T	F	F	F	F
T	T	F	F	T	F	T	T
T	F	T	F	T	T	F	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	F	F	F	F
F	T	F	F	F	F	F	F
F	F	T	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

מאחר והעמודות עבור $x \in A \setminus (B \cap C)$ ו-$x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ זהות, לפי הגדרת שוויון קבוצות, הקבוצות שוות.

טבלת המצבים: גם להכלה, לריקות ולדוגמה נגדית

טענה: לכל שלוש קבוצות A, B, C, מתקיים $A \setminus C \subseteq (A \setminus B) \cup (B \setminus C)$.

$x \in A$	$x \in B$	$x \in C$	$x \in A \setminus C$	$x \in A \setminus B$	$x \in B \setminus C$	$x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus C)$
T	T	T	F	F	F	F
T	T	F	T	F	T	T
T	F	T	F	T	F	T
T	F	F	T	T	F	T
F	T	T	F	F	F	F
F	T	F	F	F	T	T
F	F	T	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

- **הכלה $S \subseteq T$:** אין שורה שבה בעמודה של S יש T ובעמודה של T יש F. כאן זה מתקיים, ולכן ההכלה נכונה.
- **ריקות $S = \emptyset$:** בעמודה של S יש F **בכל** השורות.
- **אין שוויון:** בשורות 3 ו-6 יש F משמאל ו-T מימין. שורה כזו היא מתכון לדוגמה נגדית: לפי שורה 3 ניקח $x = 1$ עם $1 \in A$, $1 \notin B$, $1 \in C$, למשל $A = C = \{1\}$, $B = \emptyset$. אז $A \setminus C = \emptyset$ אבל $(A \setminus B) \cup (B \setminus C) = \{1\}$.

הוכחה באמצעות שקילויות לוגיות

כלל דה מורגן הראשון: לכל שלוש קבוצות A, B, C, מתקיים $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

הוכחה: יהי x איבר כלשהו.

$x \in A \setminus (B \cap C) \iff$	הגדרת ההפרש
$x \in A \wedge x \notin (B \cap C) \iff$	הגדרת החיתוך
$x \in A \wedge \neg(x \in B \wedge x \in C) \iff$	דה מורגן לפסוקים
$x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) \iff$	פילוג של „וגם" על „או"
$(x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) \iff$	הגדרת ההפרש
$x \in (A \setminus B) \vee x \in (A \setminus C) \iff$	הגדרת האיחוד
$x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$	

הראינו שלכל x, שייכות לאגף שמאל שקולה לשייכות לאגף ימין. לכן, לפי הגדרת שוויון קבוצות, הקבוצות שוות. ∎

הוכחה באמצעות הכלה דו-כיוונית

טענה: לכל שלוש קבוצות A, B, C, מתקיים $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

נוכיח $A \setminus (B \cap C) \subseteq (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$:

1. יהי $x \in A \setminus (B \cap C)$. מהגדרת ההפרש, $x \in A$ וגם $x \notin B \cap C$.
2. נבחין בשני מקרים:

   מקרה ראשון: $x \notin B$.
   מאחר ש-$x \in A$, נקבל $x \in A \setminus B$, ולכן x שייך לאגף ימין.

   מקרה שני: $x \in B$.
   אילו $x \in C$, היה מתקיים $x \in B \cap C$, בסתירה לנתון. לכן $x \notin C$. לכן $x \in A \setminus C$, ושוב x שייך לאגף ימין.
3. בכל מקרה x שייך לאגף ימין. לכן ההכלה מתקיימת.

נוכיח $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) \subseteq A \setminus (B \cap C)$:

1. יהי $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.
2. מהגדרת האיחוד, נבחין בשני מקרים:


   מקרה ראשון: $x \in A \setminus B$.
   מהגדרת ההפרש, $x \in A$ וגם $x \notin B$. לכן $x \notin B \cap C$, ומכאן $x \in A \setminus (B \cap C)$.

   מקרה שני: $x \in A \setminus C$.
   מהגדרת ההפרש, $x \in A$ וגם $x \notin C$. לכן $x \notin B \cap C$, ומכאן $x \in A \setminus (B \cap C)$.
3. בכל מקרה x שייך לאגף שמאל. לכן ההכלה מתקיימת.


משתי ההכלות, לפי המשפט על הכלה דו-כיוונית: $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$. ∎

הוכחה גרפית


אותו משפט, בדרך גרפית: לכל שלוש קבוצות A, B, C, מתקיים $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.




$A \setminus B$




$A \setminus C$




$(A \setminus B) \cup (A \setminus C)$



A



$B \cap C$




$A \setminus (B \cap C)$

קבוצת הַחֶזְקָה

הגדרה: קבוצת הַחֶזְקָה של A, המסומנת $\mathcal{P}(A)$, היא הקבוצה שאיבריה הם **כל תת־הקבוצות של A**.

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\} \quad \text{כלומר:} \quad X \in \mathcal{P}(A) \iff X \subseteq A.$$

$A = \{1, 2\}$



בוחרים אילו איברים לקחת

לכל איבר: לבחור או לא לבחור

תת־קבוצה של A
היא איבר של $\mathcal{P}(A)$

$\mathcal{P}(A)$

כל איבר כאן הוא קבוצה בפני עצמו

נאסוף את כל תתי־הקבוצות של A.

הפעלת האנימציה | השלב הבא | התחלה מחדש


קבוצת הַחֶזְקָה היא **פעולה אונרית**: הקלט הוא קבוצה אחת; הפלט הוא קבוצה של קבוצות.

דוגמאות לקבוצת חֶזְקָה

שאלה: מהן הקבוצות $\mathcal{P}(\emptyset)$ ו-$\mathcal{P}(\{\emptyset\})$?

תשובה:

1. $\mathcal{P}(\emptyset)$:
   - הקבוצה היחידה המוכלת ב-$\emptyset$ היא $\emptyset$ עצמה (כי $\emptyset \subseteq \emptyset$).
   - לכן: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$
2. $\mathcal{P}(\{\emptyset\})$:
   - הקבוצה $\{\emptyset\}$ היא יחידון.
   - תת-הקבוצות של $\{\emptyset\}$ הן:
     - הקבוצה הריקה: $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$
     - הקבוצה עצמה: $\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset\}$
   - לכן: $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$



קבוצת הַחֶזְקָה $\mathcal{P}(S)$ - כלי אינטראקטיבי

{1,2,3,4}

$|S| = 4$ $|\mathcal{P}(S)| = 16$

קבוצת הַחֶזְקָה:

{ }	{ 1 }	{ 2 }
{ 2, 1 }	{ 3 }	{ 3, 1 }
{ 3, 2 }	{ 3, 2, 1 }	{ 4 }
{ 4, 1 }	{ 4, 2 }	{ 4, 2, 1 }
{ 4, 3 }	{ 4, 3, 1 }	{ 4, 3, 2 }
{ 4, 3, 2, 1 }		

הכלה וקבוצת הַחֶזְקָה

טענה: לכל קבוצות A, B, מתקיים $A \subseteq B \iff \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.

כיוון ראשון ($\Rightarrow$)

נניח $A \subseteq B$. נוכיח $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.

1. תהי $X \in \mathcal{P}(A)$ כלשהי.
2. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $X \subseteq A$.

כדי להוכיח $X \subseteq B$:

1. יהי $x \in X$ כלשהו.
2. מן ההכלה $X \subseteq A$ נקבל $x \in A$.
3. מן ההנחה $A \subseteq B$ נקבל $x \in B$.

3. מאחר ש־x כלשהו, הראינו $X \subseteq B$.
4. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $X \in \mathcal{P}(B)$.
5. מאחר ש־X כלשהי, $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.

כיוון שני ($\Leftarrow$)

נניח $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. נוכיח $A \subseteq B$.

1. לפי רפלקסיביות ההכלה, $A \subseteq A$.
2. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $A \in \mathcal{P}(A)$.
3. מן ההנחה $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ נקבל $A \in \mathcal{P}(B)$.
4. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $A \subseteq B$, כנדרש.

הרעיון: משתמשים בהנחת ההכלה עבור האיבר A של קבוצת הַחֶזְקָה.

הוכחנו את שתי הגרירות, ולכן השקילות מתקיימת. ∎

האם גם שוויון נשמר?

שאלה: האם לכל קבוצות A, B מתקיים $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B) \iff A = B$?

כן. נשתמש במשפט מהשקף הקודם ובמשפט על הכלה דו-כיוונית.

כיוון ראשון ($\Rightarrow$)

נניח $A = B$. נוכיח $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$.

1. לפי המשפט על הכלה דו-כיוונית, $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$.
2. מן ההכלה $A \subseteq B$, לפי המשפט הקודם, $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.
3. מן ההכלה $B \subseteq A$, לפי המשפט הקודם, $\mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A)$.
4. משתי ההכלות, $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$.


כיוון שני ($\Leftarrow$)

נניח $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$. נוכיח $A = B$.

1. לפי המשפט על הכלה דו-כיוונית, $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ וגם $\mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A)$.
2. מן ההכלה הראשונה, לפי המשפט הקודם, $A \subseteq B$.
3. מן ההכלה השנייה, לפי המשפט הקודם, $B \subseteq A$.
4. משתי ההכלות, $A = B$.

הוכחנו את שתי הגרירות, ולכן השקילות מתקיימת. ∎

קבוצת הַחֶזְקָה של חיתוך



טענה: לכל שתי קבוצות A, B, מתקיים $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

נשתמש במשפט: לכל שלוש קבוצות A, B, X, מתקיים $(X \subseteq A \wedge X \subseteq B) \iff X \subseteq A \cap B$.

נוכיח $\mathcal{P}(A \cap B) \subseteq \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$:

1. תהי $X \in \mathcal{P}(A \cap B)$ כלשהי.
2. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $X \subseteq A \cap B$.
3. לפי המשפט על הכלה בחיתוך, $X \subseteq A$.
4. לפי אותו משפט, $X \subseteq B$.
5. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $X \in \mathcal{P}(A)$.
6. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $X \in \mathcal{P}(B)$.
7. מהגדרת החיתוך, $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
8. מאחר ש־X כלשהי, ההכלה מתקיימת.

נוכיח $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cap B)$:


1. תהי $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ כלשהי.
2. מהגדרת החיתוך, $X \in \mathcal{P}(A)$.
3. מהגדרת החיתוך, $X \in \mathcal{P}(B)$.
4. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $X \subseteq A$.
5. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $X \subseteq B$.
6. לפי המשפט על הכלה בחיתוך, $X \subseteq A \cap B$.
7. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $X \in \mathcal{P}(A \cap B)$.
8. מאחר ש־X כלשהי, ההכלה מתקיימת.

משתי ההכלות, לפי המשפט על הכלה דו־כיוונית, הקבוצות שוות. ∎

האם קבוצת הַחֶזְקָה שומרת גם על איחוד?


שאלה: האם לכל שתי קבוצות A, B מתקיים $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$?

- **הפרכה:** ניקח $A = \{1\}$, $B = \{2\}$. אז $A \cup B = \{1, 2\}$.
  - $\mathcal{P}(A \cup B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.
  - $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{1\}\} \cup \{\emptyset, \{2\}\} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}$.
  - קיבלנו ש-$\{1, 2\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$ אבל $\{1, 2\} \notin \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
  - לכן, $\mathcal{P}(A \cup B) \neq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
- בשקפים הבאים נאפיין בדיוק מתי השוויון מתקיים.





מתי קבוצת החֶזְקָה שומרת על איחוד?



$X \subseteq A \subseteq B$

$X \subseteq B$

טענה: לכל שתי קבוצות A, B, מתקיים $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ אם ורק אם $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$.

הכיוון "אם": נניח $A \subseteq B$ ונוכיח הכלה בשני הכיוונים.

- כיוון ראשון ($\subseteq$):
  - יהי $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$
  - מכיוון ש- $A \subseteq B$ מתקיים $A \cup B = B$
  - לכן $X \in \mathcal{P}(B)$.
  - לכן $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
- כיוון שני ($\supseteq$):
  - יהי $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
  - נחלק לשני מקרים
    - $X \in \mathcal{P}(A) \Rightarrow X \subseteq A \subseteq A \cup B \Rightarrow X \in \mathcal{P}(A \cup B)$.
    - $X \in \mathcal{P}(B) \Rightarrow X \subseteq B \subseteq A \cup B \Rightarrow X \in \mathcal{P}(A \cup B)$.
  - בכל מקרה: $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$.
  - שימו לב: בכיוון זה לא השתמשנו בהנחה $A \subseteq B$, ולכן תמיד $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$.

- משתי ההכלות מתקבל השוויון. מחילופיות האיחוד, ההוכחה תקפה גם בהנחה $B \subseteq A$. ∎

שימור איחוד: הכיוון "רק אם"

טענה: לכל שתי קבוצות A, B, אם $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$, אז $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$.

- **הוכחה (בדרך הקונטרה-פוזיטיב):** נניח ש-$A \not\subseteq B$ **וגם** $B \not\subseteq A$, ונראה ש-$\mathcal{P}(A \cup B) \neq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. (זו שלילת המסקנה: $\neg(A \subseteq B \vee B \subseteq A) \equiv A \not\subseteq B \wedge B \not\subseteq A$.)
  - מ-$A \not\subseteq B$: קיים $a \in A$ כך ש-$a \notin B$.
  - מ-$B \not\subseteq A$: קיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$.
  - $a, b \in A \cup B$, ולכן $\{a, b\} \subseteq A \cup B$, כלומר $\{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$.
  - $\{a, b\} \notin \mathcal{P}(A)$, כי $b \in \{a, b\}$ אבל $b \notin A$.
  - $\{a, b\} \notin \mathcal{P}(B)$, כי $a \in \{a, b\}$ אבל $a \notin B$.
  - לכן $\{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$ אבל $\{a, b\} \notin \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$, ומכאן $\mathcal{P}(A \cup B) \neq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. ∎
- **שימו לב:** זו בדיוק ההפרכה שראינו קודם ($A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $\{a, b\} = \{1, 2\}$), בגרסה כללית.

הרחבת איחוד וחיתוך לאוספים כלליים של קבוצות

- תהי X קבוצה שאבריה קבוצות, אז נגדיר את האיחוד האונרי של X להיות הקבוצה:

$$\bigcup X = \{a \mid \exists A \in X (a \in A)\}$$

- כלומר $a \in \bigcup X$ אם ורק אם יש ב-X איבר A כך ש-$a \in A$. במילים פשוטות, $\bigcup X$ הוא אוסף האיברים הנמצאים באיזושהי קבוצה של X.

- תהי X קבוצה לא ריקה שאבריה קבוצות, אז נגדיר את החיתוך האונרי של X להיות הקבוצה:

$$\bigcap X = \{a \mid \forall A \in X (a \in A)\}$$

- ההגדרה של חיתוך אונרי התקבלה מהגדרת איחוד אונרי על ידי החלפת הכמת הישי בכמת הכולל.
- $\bigcap X$ הוא אוסף האיברים המשותפים לכל הקבוצות של X.

- **דגש חשוב:** $\bigcup \emptyset = \emptyset$, אך $\bigcap \emptyset$ אינו מוגדר: כל עצם a מקיים באופן ריק $\forall A \in \emptyset \, (a \in A)$, ולכן $\bigcap \emptyset$ היה "קבוצת כל העצמים" - שאינה קבוצה (פרדוקס ראסל).

דוגמאות לאיחוד וחיתוך אונריים

- $\bigcup \emptyset = \emptyset$ (אך, כאמור, $\bigcap \emptyset$ אינו מוגדר).
- לכל קבוצה A מתקיים $\bigcup \{A\} = A$ ו-$\bigcap \{A\} = A$, ובפרט: $\bigcup \{\emptyset\} = \emptyset$ ו-$\bigcap \{\emptyset\} = \emptyset$.
- לכל שתי קבוצות A, B מתקיים: $\bigcup \{A, B\} = A \cup B$ ו-$\bigcap \{A, B\} = A \cap B$.
- עבור $X = \{ \{1,3\}, \{2,3,7\}, \{1,2,6,7\}, \{3\} \}$ נקבל: $\bigcap X = \emptyset$, $\bigcup X = \{1,2,3,6,7\}$.
- עבור $Y = \{ \{1,3,7\}, \{2,3,7\}, \{1,2,6,7\}, \{3,7\} \}$ נקבל: $\bigcap Y = \{7\}$, $\bigcup Y = \{1,2,3,6,7\}$.
- לכל קבוצה A מתקיים $\bigcap \mathcal{P}(A) \subseteq \bigcup \mathcal{P}(A)$.

איך מוכיחים שייכות לאיחוד/חיתוך אונרי, ומה נותנת הנחת שייכות

להוכיח $a \in \bigcup X$:

- מציגים **עד**: קבוצה מסוימת $A \in X$, ומראים ש-$a \in A$.

מההנחה $a \in \bigcup X$:

- מקבלים שקיימת $A \in X$ עם $a \in A$.
- אנחנו **נותנים לה שם**, אבל **לא בוחרים** אותה - אין לנו שליטה מי היא.

להוכיח $a \in \bigcap X$:

- לוקחים $A \in X$ **שרירותית**, ומראים ש-$a \in A$.

מההנחה $a \in \bigcap X$:

- מותר להציב: $a \in A$ לכל $A \in X$ **שנבחר** - כל אחת שנוח לנו.

- **שלילות:**
  - $a \notin \bigcup X \iff \forall A \in X\ (a \notin A)$
  - $a \notin \bigcap X \iff \exists A \in X\ (a \notin A)$

- **טעות נפוצה:** להחליף בין "קיים" ל"לכל". זכרו: $\bigcup$ הולך עם **קיים**, $\bigcap$ הולך עם **לכל**.

דוגמה: שימוש בתבניות

טענה: לכל אוסף קבוצות לא ריק X ולכל קבוצה $A \in X$, מתקיים $\bigcap X \subseteq A \subseteq \bigcup X$.

- $\bigcap X \subseteq A$:
  - יהי $a \in \bigcap X$.
  - מההנחה $a \in \bigcap X$ מותר להציב **כל** קבוצה ב-X שנבחר.
  - נבחר את $A \in X$, ונקבל $a \in A$.
- $A \subseteq \bigcup X$:
  - יהי $a \in A$.
  - כדי להוכיח $a \in \bigcup X$ צריך **עד**.
  - A עצמה היא העד: $A \in X$ ו-$a \in A$, ולכן $a \in \bigcup X$.

- שימו לב: בחלק הראשון **השתמשנו** בהנחת שייכות לחיתוך, ובחלק השני **הוכחנו** שייכות לאיחוד.
- **שתי הנחות שייכות לאיחוד נותנות שני עדים:** מ-$a \in \bigcup X$ ומ-$b \in \bigcup X$ מקבלים $A, B \in X$ עם $a \in A$ ו-$b \in B$. ייתכן ש-$A \neq B$, ולכן נותנים להן **שמות שונים**.

איחוד וחיתוך של אוסף שמוגדר בתבנית

- לעיתים קרובות מפעילים $\bigcup$ או $\bigcap$ על אוסף שמוגדר בתבנית, $\{\, f(X) \mid X \in F \,\}$.
- **שייכות לאיחוד:** "קיים" מתוך האיחוד, ו"קיים" מתוך התבנית, מתמזגים ל"קיים" אחד:

$$a \in \bigcup \{\, f(X) \mid X \in F \,\} \iff \exists X \in F \; (a \in f(X))$$

- **שייכות לחיתוך** (כאשר $F \neq \emptyset$):

$$a \in \bigcap \{\, f(X) \mid X \in F \,\} \iff \forall X \in F \; (a \in f(X))$$

- **דוגמה:** לכל קבוצה C ואוסף קבוצות F: $\bigcup \{\, X \cap C \mid X \in F \,\} = \left(\bigcup F\right) \cap C$.
  - ($\subseteq$) יהי a באגף שמאל. אז קיימת $X \in F$ עם $a \in X \cap C$. לכן $a \in X$, ומכאן $a \in \bigcup F$ (X היא העד). וגם $a \in C$.
  - ($\supseteq$) יהי $a \in \left(\bigcup F\right) \cap C$. אז $a \in C$, וקיימת $X \in F$ עם $a \in X$. לכן $a \in X \cap C$, ו-X היא העד לכך ש-a באגף שמאל. ∎

תרגיל לדוגמה

- הוכיחו או הפריכו:
  - לכל שתי קבוצות לא ריקות (של קבוצות) X, Y אם $X \subseteq Y$ אז $\bigcap X \subseteq \bigcap Y$.
- **הוכחה:**
  - נניח כי $X \subseteq Y$ ויהי a כלשהוא כך ש $a \in \bigcap Y$.
  - כדי להוכיח $a \in \bigcap X$, תהי $A \in X$ **שרירותית**.
  - מאחר ו-$X \subseteq Y$ הרי ש $A \in Y$.
  - מההנחה $a \in \bigcap Y$ מותר להציב כל קבוצה ב-Y, ונבחר את A: לכן $a \in A$.
  - מאחר ש-A שרירותית, $a \in \bigcap X$.
  - שימו לב: כשהאוסף **גדל**, החיתוך **קטן**. כיוון ההכלה מתהפך.

תרגיל לדוגמה

- הוכיחו או הפריכו:
  - לכל שתי קבוצות לא ריקות (של קבוצות) X, Y אם $X \subsetneq Y$ אז $\bigcap X \subsetneq \bigcap Y$.
- **הפרכה:**
  - כדי להפריך את הטענה יש להראות ששלילתה מתקיימת.
  - שלילת טענה כוללת, היא כזכור טענת קיום, לכן עלינו למצוא עדים לקיומה.
  - עדות לקיומה של השלילה, נקראת דוגמה נגדית.
  - שלילת הטענה המופיעה בתרגיל היא: קיימים שני אוספי קבוצות לא ריקים X, Y כך ש-$X \subsetneq Y$ וגם $\neg(\bigcap X \subsetneq \bigcap Y)$.
  - (שימו לב: $\neg(\bigcap Y \subsetneq \bigcap X) \equiv \neg(\bigcap Y \subseteq \bigcap X \wedge \bigcap Y \neq \bigcap X) \equiv \bigcap Y \not\subseteq \bigcap X \vee \bigcap Y = \bigcap X$)
  - דוגמה נגדית: $X = \{\{1\}\}, Y = \{\{1\}, \{1,2\}\}$.
  - כאן $X \subsetneq Y$ אבל $\bigcap X = \{1\} = \{1,2\} \cap \{1\} = \bigcap Y$.
- **טיפ:** כשמחפשים דוגמה נגדית, כדאי לנסות קודם מקרים קטנים וקיצוניים: $\emptyset$, יחידונים, קבוצות שמוכלות זו בזו.

חוק דה-מורגן הראשון לאיחוד וחיתוך אונריים

- **טענה:** לכל קבוצה U ולכל אוסף קבוצות **לא ריק** X (ייתכן אינסופי), מתקיים:

$$U \setminus \left(\bigcup X\right) = \bigcap \{ U \setminus A \mid A \in X \}$$

- לדוגמה, אם $X = \{A_1, A_2\}$ מקבלים את כלל דה-מורגן שכבר ראינו:

$$U \setminus (A_1 \cup A_2) = (U \setminus A_1) \cap (U \setminus A_2)$$

- הוכחה:

$$\begin{aligned} x \in U \setminus \left(\bigcup X\right) &\iff x \in U \wedge x \notin \bigcup X \\ &\iff x \in U \wedge \forall A \in X \ (x \notin A) \\ &\iff \forall A \in X \ (x \in U \setminus A) \\ &\iff x \in \bigcap \{ U \setminus A \mid A \in X \} \end{aligned}$$

טענה: קיום ויחידות של האיחוד האונרי

טענה: לכל קבוצה X של קבוצות, **קיימת** קבוצה **יחידה** U המקיימת:

1. $\forall S \in X (S \subseteq U)$ (כל קבוצה ב-X מוכלת ב-U)
2. $\forall T (\forall S \in X (S \subseteq T) \to U \subseteq T)$ (U היא הקבוצה המינימלית עם תכונה זו)

הוכחה:

- **קיום:** נגדיר $U = \bigcup X$.
  - תנאי 1: לכל $S \in X$, ברור ש-$S \subseteq \bigcup X = U$.
  - תנאי 2: תהי T קבוצה כך שלכל $S \in X$ מתקיים $S \subseteq T$.
    - יהי $a \in U = \bigcup X$.
    - אז קיימת $S \in X$ כך ש-$a \in S$.
    - מכיוון ש-$S \subseteq T$, נקבל $a \in T$.
    - לכן $U \subseteq T$.
- **יחידות:** נניח שקיימות שתי קבוצות U_1, U_2 המקיימות את שני התנאים.
  - מתנאי 1 עבור U_1: לכל $S \in X$ מתקיים $S \subseteq U_1$.
  - מתנאי 2 עבור U_2: $U_2 \subseteq U_1$.
  - באופן סימטרי: $U_1 \subseteq U_2$.
  - לכן $U_1 = U_2$.

מסקנה: הקבוצה $U = \bigcup X$ היא הקבוצה היחידה המקיימת את שני התנאים.

טענה: קיום ויחידות של החיתוך האונרי

טענה: לכל קבוצה לא ריקה X של קבוצות, קיימת קבוצה **יחידה** I המקיימת:

1. $\forall S \in X (I \subseteq S)$ (הקבוצה I מוכלת בכל קבוצה ב-X)
2. $\forall T (\forall S \in X (T \subseteq S) \to T \subseteq I)$ (I היא הקבוצה המקסימלית עם תכונה זו)

הוכחה:

- **קיום:** נגדיר $I = \bigcap X$.
  - תנאי 1: לכל $S \in X$, ברור ש-$\bigcap X = I \subseteq S$.
  - תנאי 2: תהי T קבוצה כך שלכל $S \in X$ מתקיים $T \subseteq S$.
    - יהי $a \in T$.
    - לכל $S \in X$ מתקיים $T \subseteq S$, ולכן $a \in S$.
    - מכיוון ש-a שייך לכל $S \in X$, לפי הגדרת החיתוך האונרי $a \in \bigcap X = I$.
    - לכן $T \subseteq I$.
- **יחידות:** נניח שקיימות שתי קבוצות I_1, I_2 המקיימות את שני התנאים.
  - מתנאי 1 עבור I_1: לכל $S \in X$ מתקיים $I_1 \subseteq S$.
  - מתנאי 2 עבור I_2: $I_1 \subseteq I_2$.
  - באופן סימטרי: $I_2 \subseteq I_1$.
  - לכן $I_1 = I_2$.

מסקנה: הקבוצה $I = \bigcap X$ היא הקבוצה היחידה המקיימת את שני התנאים.

איחוד אונרי של קבוצת הַחֶזְקָה

- טענה: לכל קבוצה A מתקיים:

$$\bigcup \mathcal{P}(A) = A$$

- הוכחה:
  - ($\subseteq$) יהי $x \in \bigcup \mathcal{P}(A)$. אז קיים $X \in \mathcal{P}(A)$ כך ש-$x \in X$. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה $X \subseteq A$, ולכן $x \in A$.
  - ($\supseteq$) יהי $x \in A$. היחידון $\{x\} \subseteq A$, ולכן $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$. מכאן $x \in \bigcup \mathcal{P}(A)$.
- סיכום: לכל x מתקיים $x \in A \iff x \in \bigcup \mathcal{P}(A)$, ולכן $\bigcup \mathcal{P}(A) = A$.

תנאים שקולים ל־$X = \mathcal{P}(A)$

לכל אוסף קבוצות X ולכל קבוצה A, התנאים הבאים שקולים:

1. $X = \mathcal{P}(A)$.
2. מתקיימים:
   - איחוד כל האיברים: $\bigcup X = A$.
   - מכיל את היחידונים: $\forall x \in A\ (\{x\} \in X)$.
   - סגור לאיחודים: לכל אוסף קבוצות $\mathcal{Y}$, אם $\mathcal{Y} \subseteq X$ אז $\bigcup \mathcal{Y} \in X$.
3. מתקיימים יחד:
   - $\forall S \in X\ (S \subseteq A)$
   - $A \in X$
   - סגור לירידה: לכל שתי קבוצות S, T, אם $T \in X$ ו־$S \subseteq T$ אז $S \in X$

- ($1 \Rightarrow 2$):
  - אם $X = \mathcal{P}(A)$ אז $\bigcup X = A$.
  - לכל $x \in A$, $\{x\} \subseteq A$ ולכן $\{x\} \in \mathcal{P}(A) = X$.
  - אם $\mathcal{Y} \subseteq X = \mathcal{P}(A)$ אז לכל $S \in \mathcal{Y}$ מתקיים $S \subseteq A$ ולכן $\bigcup \mathcal{Y} \subseteq A$ ומכאן $\bigcup \mathcal{Y} \in \mathcal{P}(A) = X$.
- ($2 \Rightarrow 3$):
  - לכל $S \in X$, $S \subseteq \bigcup X = A$.
  - עבור $\mathcal{Y} = \{\{x\} \mid x \in A\}$ מתקיים $\mathcal{Y} \subseteq X$ ולכן $\bigcup \mathcal{Y} = A \in X$.
  - אם $T \in X$ ו־$S \subseteq T$ אז $S \subseteq A$, ולכן $\{\{x\} \mid x \in S\} \in X$ ($S = \bigcup\{\{x\} \mid x \in S\}$ יחידונים + סגירות לאיחודים).
- ($3 \Rightarrow 1$):
  - לכל $S \in X$, $S \subseteq A$.
  - לכל $S \subseteq A$, $S \in X$ (כי $A \in X$, וסגירות לירידה).
  - לכן $X = \mathcal{P}(A)$.

חלוקה של קבוצה

- **הגדרה:** לכל שתי קבוצות A, S, נאמר ש-S היא **חלוקה** של A אם:

$$S \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad \wedge \quad \forall a \in A \; \exists! t \in S \; (a \in t)$$

- איברי S (ה"מחלקות") הם תת-קבוצות **לא ריקות** של A, וכל איבר של A שייך **למחלקה אחת בדיוק**.
- $\exists! t \in S \; (a \in t)$ פירושו: $\exists t \in S \left(a \in t \wedge \forall t' \in S \; (a \in t' \to t' = t)\right)$.
- **דוגמאות:**
  - תהי A קבוצת הסטודנטים בקורס, ויהי $P(x)$: "x עבר את הבוחן". אז $\{\{x \in A \mid P(x)\}, \{x \in A \mid \neg P(x)\}\}$ היא חלוקה של A לעוברים ולנכשלים (בתנאי ששתי המחלקות לא ריקות).
  - אם $A \neq \emptyset$ אז $\{A\}$ היא חלוקה של A.
  - $\{\{x\} \mid x \in A\}$ (תבנית על קבוצה) - חלוקה של A ליחידונים.
- **לא דוגמאות** (עבור $A = \{1, 2, 3\}$):
  - $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$ - חפיפה: 2 שייך לשתי מחלקות.
  - $\{\{1\}, \{2\}\}$ - האיבר 3 אינו שייך לאף מחלקה.
  - $\{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}\}$ - מכילה את $\emptyset$.

הגדרה שקולה של חלוקה

טענה: לכל שתי קבוצות S, A, האוסף S הוא חלוקה של A אם ורק אם מתקיימים שלושת התנאים: (1) $S \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ (2) $\bigcup S = A$ (3) $\forall x, y \in S \ (x \cap y = \emptyset \vee x = y)$

- ($\Rightarrow$) נניח ש-S חלוקה של A. תנאי (1) נתון.
  - (2), $\subseteq$: כל $t \in S$ מקיים $t \subseteq A$, ולכן $\bigcup S \subseteq A$.
  - (2), $\supseteq$: יהי $a \in A$. קיים $t \in S$ עם $a \in t$, ולכן $a \in \bigcup S$.
  - (3): יהיו $x, y \in S$ וננניח $x \cap y \neq \emptyset$. יהי $a \in x \cap y$. אז $a \in A$ ו-$a \in x$ שייך גם ל-y. מיחידות המחלקה של a: $x = y$.
- מסקנה: אפשר להשתמש בכל אחת משתי ההגדרות, לפי הנוחות.
- ($\Leftarrow$) נניח (1), (2), (3). תנאי (1) הוא החלק הראשון בהגדרה. יהי $a \in A$.
  - **קיום:** $a \in A = \bigcup S$, ולכן קיימת $t \in S$ עם $a \in t$.
  - **יחידות:** יהיו $t, t' \in S$ עם $a \in t$ ו-$a \in t'$. אז $a \in t \cap t'$, כלומר $t \cap t' \neq \emptyset$, ולפי (3) $t = t'$.

משפט: חלוקה המוכלת בחלוקה שווה לה

- **משפט:** לכל שלוש קבוצות A, S, T, אם S ו-T חלוקות של A ו-$S \subseteq T$, אז $S = T$.
- **הוכחה:** נתון $S \subseteq T$, ולכן נותר להוכיח $T \subseteq S$.
  - תהי $t \in T$. מכיוון ש-$T \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, מתקיים $t \neq \emptyset$, ולכן יש איבר $a \in t$.
  - מכיוון ש-$t \subseteq A$, מתקיים $a \in A$.
  - S חלוקה של A, ולכן קיימת $s \in S$ כך ש-$a \in s$.
  - מכיוון ש-$S \subseteq T$, מתקיים $s \in T$.
  - כעת $s, t \in T$ ושתיהן מכילות את a. מיחידות המחלקה של a **בחלוקה** T: $s = t$.
  - לכן $t = s \in S$. הראינו $T \subseteq S$, ומהכלה דו-כיוונית $S = T$. ∎
- **למה צריך את התנאי** $t \neq \emptyset$**?** בלעדיו הטענה נכשלת: עבור $A = \{1\}$, $S = \{\{1\}\}$ ו-$T = \{\{1\}, \emptyset\}$ מתקיים $S \subsetneq T$, ובכל זאת כל איבר של A שייך למחלקה אחת בדיוק גם ב-T.

תרגיל הבית

Cannot GET /logic-slides/01-sets/ex1.pdf