

# Intro. Estadística Computacional - Germán Miranda


## Práctico 0

### Ejercicio 1-

Parte a-

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, \quad f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot -x e^{-\frac{1}{2}x^2} = 0 \text{ si } x=0$$

$$f'(1) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}} < 0, \quad f'(-1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}} > 0$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$


### Ejercicio 2-

Parte a-

$$f(x|\mu) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+(x-\mu)^2}, \quad \text{para } \mu=0, \quad f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$$

$$f'(x) \Rightarrow \frac{1}{\pi} (x^2+1)^{-1} \Rightarrow \frac{1}{\pi} - (x^2+1)^{-2} \cdot 2x = -\frac{1}{\pi} \frac{2x}{(x^2+1)^2}$$

$$f'(0) = 0$$



$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Papirer

Ejercicio 4-

Parte a-

$$3A + 2C = 360$$

$$4A + B + C = 480$$

$$6B + 5C = 450$$

Podemos resolver el sistema despejando las incógnitas y sustituyendo.

$$3ra\ eq - 6B = 450 - 5C \Rightarrow B = \frac{450 - 5C}{6}$$

$$\text{Sustituyo en 2da eq - } 4A + \left( \frac{450 - 5C}{6} \right) + C = 480 \quad (1)$$

$$1ra\ eq - 2C = 360 - 3A \Rightarrow C = 180 - \frac{3}{2}A \quad (2)$$

$$\text{Sustituyo (2) en (1)} \Rightarrow 4A + \frac{75 - \frac{5}{6}(180 - \frac{3}{2}A)}{1} + (180 - \frac{3}{2}A) = 480$$

$$\text{Despejo A} \Rightarrow 4A + \frac{15}{12}A - \frac{3}{2}A + 255 - 150 = 480$$

$$A \left( \frac{48 + 15 - 18}{12} \right) = 375$$

$$A = \frac{375 \cdot 12}{45} = 100$$

sustituyo A en 1er eq -

$$300 + 2C = 360 \Rightarrow 2C = 60 \Rightarrow \boxed{C = 30}$$

sustituyo C en 3ra eq -

$$6B + 150 = 450 \Rightarrow 6B = 300 \Rightarrow \boxed{B = 50}$$

Papirer